



ننگرهار طب پوهنځی

د انسان عمومي کلينيکي امبريولوژي



پوهنيار ډاکټر عبدالله جان شينواری

۱۳۹۸

پلورل منع دی

د انسان عمومي کلينيکي
امبريولوژي

General Human Clinical
Embryology

پوهنيار ډاکټر عبدالله جان شينواری




Nangarhar Medical Faculty

Afghanic

Teaching Assist. Dr Abdullah Jan Shinwari

General Human Clinical Embryology



Funded by
Kinderhilfe-Afghanistan



ISBN 978-9936-620-66-7



9 789936 620667

Not For Sale

2020

د انسان عمومي کلینیکي امبریولوژي

پوهنیار ډاکټر عبدالله جان شینواری

افغانیک
Afghanic



Pashto PDF
2020



Nangarhar Medical Faculty
ننگرهار طب پوهنځی

Funded by
Kinderhilfe-Afghanistan

General Human Clinical Embryology

Teaching Assist. Dr Abdullah Jan Shinwari

Download:

www.ecampus-afghanistan.org


اقراً باسم ربك الذي خلق

د انسان عمومي كلينيكي امبريولوژي

پوهنيار ډاکټر عبدالله جان شينواری

دربيم چاپ

دغه کتاب په پي ډي ايف فارمت کې په مله سي ډي کې هم لوستلی شئ:



د انسان عمومي کلينيکي امبريولوژي	د کتاب نوم
پوهنيار ډاکټر عبدالله جان شينواری	ليکوال
ننگرهار پوهنتون، طب پوهنځی	خپرندوی
www.nu.edu.af	وېب پاڼه
۱۳۹۸، درېيم چاپ	د چاپ کال
۱۰۰۰	چاپ شمېر
۲۹۳	مسلسل نمبر
www.ecampus-afghanistan.org	ډاونلوډ
سهر مطبعه، کابل، افغانستان	چاپ ځای



دا کتاب د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې، په جرمني کې د Eroes کورنۍ يوې خيريه ټولنې لخوا تمويل شوی دی. اداري او تخنیکي چارې يې په آلمان کې د افغانیک لخوا ترسره شوي دي. د کتاب د محتوا او ليکنې مسؤليت د کتاب په ليکوال او اړونده پوهنځي پورې اړه لري. مرسته کوونکي او تطبيق کوونکي ټولنې په دې اړه مسؤليت نه لري.

د تدريسي کتابونو د چاپولو لپاره له مور سره اړيکه ونيسئ:
ډاکتر يحيی وردک، د لوړو زده کړو وزارت، کابل
تېليفون ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴، ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰
ایمېل textbooks@afghanic.de

د چاپ ټول حقوق له مؤلف سره خوندي دي.

ای اس بي ان ۷-۶۶-۶۲۰-۹۹۳۶-۹۷۸

د لوړو زده کړو وزارت پیغام



د بشر د تاریخ په مختلفو دورو کې کتاب د علم او پوهې په لاسته راوړلو، ساتلو او خپرولو کې ډیر مهم رول لوبولی دی. درسي کتاب د نصاب اساسي برخه جوړوي چې د زده کړې د کیفیت په لوړولو کې مهم ارزښت لري. له همدې امله د نړیوالو پیژندل شویو معیارونو، د وخت د غوښتنو او د ټولنې د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره باید نوي درسي مواد او کتابونه د محصلینو لپاره برابر او چاپ شي.

له ښاغلو استادانو او لیکوالانو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې دوامداره زیار یې ایستلی او د کلونو په اوږدو کې یې په خپلو اړوندو څانگو کې درسي کتابونه تالیف او ژباړلي دي، خپل ملي پور یې اداء کړی دی او د پوهې موتور یې په حرکت راوستی دی. له نورو ښاغلو استادانو او پوهانو څخه هم په درنښت غوښتنه کوم تر څو په خپلو اړوندو برخو کې نوي درسي کتابونه او درسي مواد برابر او چاپ کړي، چې له چاپ وروسته د گرانو محصلینو په واک کې ورکړل شي او د زده کړو د کیفیت په لوړولو او د علمي پروسې په پرمختګ کې یې ښکې گام اخیستی وي.

د لوړو زده کړو وزارت دا خپله دنده بولي چې د گرانو محصلینو د علمي سطحې د لوړولو لپاره د علومو په مختلفو رشتو کې معیاري او نوي درسي مواد برابر او چاپ کړي. په پای کې د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمیټې او زموږ همکار ډاکتر یحیی وردک څخه مننه کوم چې د دی کتاب د خپرولو لپاره یې زمینه برابره کړې ده.

هیله منده یم چې نوموړې گټوره پروسه دوام وکړي او پراختیا ومومي تر څو په نږدې راتلونکې کې د هر درسي مضمون لپاره لږ تر لږه یو معیاري درسي کتاب ولرو.

په درنښت

پوهنمل دیپلوم انجنیر عبدالنواب بالاکزی

د لوړو زده کړو سرپرست وزیر

کابل، ۱۳۹۸

د درسي کتابونو چاپول

قدرمنو استادانو او گرانو محصلينو!

د افغانستان په پوهنتونونو کې د درسي کتابونو کموالی او نشتوالی له لویو ستونزو څخه گڼل کېږي. یو زیات شمیر استادان او محصلین نویو معلوماتو ته لاس رسی نه لري، په زړه میتود تدریس کوي او له هغو کتابونو او چپترونو څخه گټه اخلي چې زړه دي او په بازار کې په ټیټ کیفیت فوتوکاپي کېږي.

تر اوسه پورې موږ د ننگرهار، خوست، کندهار، هرات، بلخ، البیروني، کابل، کابل طبي پوهنتون او کابل پولي تخنیک پوهنتون لپاره ۳۱۱ عنوانه مختلف درسي کتابونه د طب، ساینس، انجنیري، اقتصاد، ژورنالیزم او زراعت پوهنځیو (۹۶ طبي د آلمان د علمي همکاريو ټولنې DAAD، ۱۹۰ طبي او غیر طبي د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې Kinderhilfe-Afghanistan، ۷ کتابونه د آلماني او افغاني پوهنتونونو ټولنې DAUG، ۲ کتابونه په مزار شریف کې د آلمان فدرال جمهوري جنرال کنسولګري، ۳ کتابونه د Afghanistan-Schulen، ۱ کتاب د صافی بنسټ، ۲ کتابونه د سلواک اېډ، ۸ کتابونه د کانراډ اډناور بنسټ KAS، ۱ کتاب په آلمان کې د اناسیس کمپنۍ لخوا) په مالي مرسته چاپ کړي دي.

د یادوني وړ ده، چې نوموړي چاپ شوي کتابونه د هېواد ټولو اړونده پوهنتونونو او یو زیات شمېر ادارو او موسساتو ته په وړیا توګه وېشل شوي دي. ټول چاپ شوي کتابونه له www.afghanistan-ecampus.org ویب پاڼې څخه ډاډولود کولای شئ.

دا کړنې په داسې حال کې تر سره کېږي چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د (۲۰۱۰-۲۰۱۴) کلونو په ملي ستراتیژیک پلان کې راغلي دي چې:

"د لوړو زده کړو او د ښوونې د ښه کیفیت او زده کوونکو ته د نویو، کره او علمي معلوماتو د برابرولو لپاره اړینه ده چې په درې او پښتو ژبو د درسي کتابونو د لیکلو فرصت برابر شي د تعلیمي نصاب د ریفورم لپاره له انګریزي ژبې څخه درې او پښتو ژبو ته د کتابونو او درسي موادو ژباړل اړین دي، له دې امکاناتو څخه پرتله د پوهنتونونو محصلین او استادان نشي کولای عصري، نویو، تازه او کره معلوماتو ته لاس رسی پیدا کړي."

مونږ غواړو چې د درسي کتابونو په برابرولو سره د هېواد له پوهنتونونو سره مرسته وکړو او د چپتر او لکچر نوټ دوران ته د پای ټکی کېږدو. د دې لپاره دا اړینه ده چې د لوړو زده کړو د موسساتو لپاره هر کال څه نا څه ۱۰۰ عنوانه درسي کتابونه چاپ شي.

له ټولو محرمو استادانو څخه هيله کوو، چې په خپلو مسلکي برخو کې نوي کتابونه وليکي، وژباړي او يا هم خپل پخواني ليکل شوي کتابونه، لکچر نوټونه او چټرونه ايډېټ او د چاپ لپاره تيار کړي، زمونږ په واک کې يې راکړي چې په ښه کيفيت چاپ او وروسته يې د اړوند پوهنځيو، استادانو او محصلينو په واک کې ورکړو. همدارنگه د ياد شويو ټکو په اړوند خپل وړانديزونه او نظريات له مونږ سره شريک کړي، تر څو په گډه پدې برخه کې اغيزمن گامونه پورته کړو.

د مؤلفينو او خپروونکو له خوا پوره زيار ايستل شوی دی، ترڅو د کتابونو محتويات د نړيوالو علمي معيارونو په اساس برابر شي، خو بيا هم کيدای شي د کتاب په محتوی کې ځينې تېروتنې او ستونزې وليدل شي، نو له درنو لوستونکو څخه هيله مند يو تر څو خپل نظريات او نيوکې مؤلف او يا مونږ ته په ليکلې بڼه راوليږي، تر څو په راتلونکي چاپ کې اصلاح شي.

له افغان ماشومانو لپاره د جرمني کميټې او د هغې له مشر ډاکټر ايروس څخه ډېره مننه کوو چې د دغه کتاب د چاپ لگښت يې ورکړی دی، دوی تر دې مهاله د ننگرهار پوهنتون د ۱۹۰ عنوانه طبي او غيرطبي کتابونو د چاپ لگښت پر غاړه اخيستی دی.

د جې آي زېټ (GIZ) له دفتر او CIM (Center for International Migration & Development) څخه، چې زما لپاره يې له ۲۰۱۰ نه تر ۲۰۱۶ پورې په افغانستان کې د کار امکانات برابر کړي وو، هم د زړه له کومې مننه کوم.

د لوړو زده کړو له سرپرست وزير پوهنمل ديپلوم انجنير عبدالنواب بالاکرزی، مالي او اداري معين ډاکټر احمد سير مهجور، مالي رئيس احمد طارق صديقي، په لوړو زده کړو وزارت کې سلاکار ډاکټر گل رحيم صافي، د پوهنتونونو رئيسانو، د پوهنځيو رييسانو او استادانو څخه مننه کوم چې د کتابونو د چاپ لړۍ يې هڅولې او مرسته يې ورسره کړې ده. د دغه کتاب له مؤلف څخه ډېر موندوی يم او ستاينه يې کوم، چې خپل د کلونو-کلونو زيار يې په وړيا توگه گرانو محصلينو ته وړاندې کړ.

همدارنگه د دفتر له همکارانو هر يو حکمت الله عزيز او فهيم حبيبي څخه هم مننه کوم چې د کتابونو د چاپ په برخه کې يې نه سترې کيدونکې هلې ځلې کړې دي.

ډاکټر يحيی وردک، د لوړو زده کړو وزارت سلاکار

کابل، فبروري، ۲۰۲۰

د دفتر ټيليفون: ۰۷۵۶۱۰۴۶۴۰، ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴

ايميل: textbooks@afghanic.de

سريزه

څرنگه چې د انسان پيدايښت او جوړښت د نورو مخلوقات په شان يوه پيچلې او سخته پدیده چې يوازې ريښتنی خالق يعنې پاک خداى ج د هغه په پيدايښت او جوړښت پوه او قادر دى. انسان د پيدايښت څخه پدې هڅه کې دى، چې د ژونديو موجوداتو په ځانگړي ډول د انسان پيدايښت او جوړښت په هکله پوه تر لاسه کړي، چې د پاک خداى ج په مرسته يې ډېر هغه څه چې زموږ ژوند لپاره اړين دى تر سره کړيدي .

امبريالوژي علم د طب هغه برخه ده چې د انسان تکامل مخکې د ولادت او وروسته د ولادت څخه څېړي، مخکې د ولادت څخه د انسان تکامل په دوه برخو تقسيموي، يو عمومي امبريالوژي چې د انسان د تکامل د عمومي قوانينو او مسايلو څخه بحث کوي بل خصوصي يا ځانگړې امبريالوژي چې د انسان د غړو او سيستمونو تکامل تر څېړنې لاندې نيسي. همدانگه د طب په ډگر کې د امبريالوژي زده کړې يو ضرورت دى داسې چې د انسان بدن د غړو پيچلو جوړوښتونو پوهاوى، د خراب تکامل د فکتورونو پيژندلو او رامنځته شوو گډوډيو لرې کولو، پدې حقيقت پوهيدل چې څنگه يوه واحده حجره په يو پوره انسان بدليږي او جنين کې د انساجو جوړونکي حجرات (Stem Cells) د ولادت څخه وروسته د ځينو ناروغيو په تداوى کې کارول هغه څه دي چې د امبريالوژي علم د طب په ډگر کې لازم گرځوي. له بلې خوا عمومي کلينيکي امبريالوژي د طب پوهنځي په لمړي سمستر کې تدريس کېږي.

د انسان عمومي کلينيکي امبريالوژي تر عنوان لاندې کتاب کې مواد د طب پوهنځي درسي کړيکولم سره سم راغونډ شوي ، دا کتاب په څوارلسو څپرکو او ۱۴۴ صفحو کې د طب پوهنځي درسي ساعتونو سره په مطابقت کې ليکل شوی، د دې مضمون زده کړه د نورو مسلکي مضامينو په ځانگړي ډول ولادي مضمون سره اړيکي لري.

سر بيره پردې د ډيرو واضحو انځورونو څخه چې اړونده موضوع په ښه توگه روښانه کوي گټه اخيستل شوې، همدارنگه د هرې موضوع په پای کې د موضوع د ښه روښانتيا په خاطر د يو څو مهمو کلينيکي حالاتو نه هم يادونه شوېده ، چې و ليکم نوموړی کتاب تر څو د طب پوهنځي محصلين او ځوان ډاکټران ورڅخه گټه پورته کړي. دا علمي رساله په دوه برخوکې ترتيب شوې ، لمرې برخه يې د دريمې هفتې تکاملي تغيرات ، دوهمه برخه يې د څلورمې نه تر اتمې هفتې تکاملي تغيرات او دريمې برخه يې د نهمې هفتې څخه تر ولادت وخته تکاملي تغيرات دي همدارنگه د هرې برخې په اخير يو څو کلينيکي حالاتونه هم ذکر شويدي.

په پای کې د ټولو درنو لوستونکو څخه په درنښت هيله کوم چې د دغې علمي رسالې املايي ، انشايي اوځينو نورې نيمگړتياوې را په گوته کړي ، چې په راتلونکي کې يې له تکرار څخه مخنيوی وشي.

پوهنيار دوکتور عبدالله جان شينواری
د ننگرهار طب پوهنځی د علمي کادر غړی

سپارښتلیک

د اناتومي څانگې استاد ښاغلي پوهنيار د وكتور عبدالله ان شينواری دغه علمي اثر چې د انسان عمومي طبي امبریولوژي تر عنوان لاندې لیکل شوی زما له خوا د پیل څخه تر پایه په پوره غور او دقت سره ولوستل شو د نوموړې علمي لیکنې په هکله خپل نظر په لاندې ډول څرگندوم: نوموړي کتاب چې د انسان عمومي طبي امبریولوژي تر عنوان لاندې لیکل شوي دي لرونکي د ۱۶ فصلونو او ۱۴۴ مخونو دي چې په لومړي فصل کې د امبریولوژي پېژندنه، دوهم څپرکی کې د انسان د جنسي غړو اناتوموفزیالوژي، دریم څپرکی کې د جنسي حجراتو جوړښت، څلورم څپرکی کې د انسان تکامل، پنځم څپرکی کې القاح، شپږم څپرکی کې لمړۍ هفتې تکامل، اوم څپرکی کې د دوهمې هفتې تکامل، اتم څپرکی کې د دریمې هفتې تکامل، نهم څپرکی کې د څلورمې نه تر اتمې هفتې رشیم تکامل، لسم څپرکی کې د جنینې دورې عمومي توضیح، یوولسم څپرکی کې د جنینې دورې میاشتنی تغیرات، دولسم څپرکی پلاسنټا او جنینې عشاوې یې، دیارلسم څپرکی کې عبرگوني ماشومان او عشاوې یې، څوارلسم څپرکی کې ولادت او جنینې او نوي زیږیدلي ماشوم د وینې دوران، پنځلسم څپرکی کې Teratology او په شپاړلسم څپرکی کې د انسان جنیټیک او مخکې و دلادت څخه د ناروغیو تشخیص میتودونو موضوعات د لوړو زده کړو وزارت د کریکولم د مفاداتو په اساس د ورکړل شوو ریفرنس کتابونو څخه تهیه او ترتیب شوي دي.

دا کتاب د لوړو زده کړو وزارت د کریکولم کمیټې له خوا په نښه شوو کتابونو څخه ترجمه، تهیه او ترتیب شویده، چې د ژباړې او کتاب لیکنې ټول اصول په کې پام کې نیول شوي دي،

د پښتو ژبې په روان عبارت لیکل شوی چې دامکان تر بریده انگلیسي اولاتیني اصطلاحات دمعنا اومفهوم په ساتلو سره پښتوژبې ته ژباړل شوي دي. پیچلې جملې په کې نه ترسترگوکېږي . د کتاب په لیکلو کې د ښه پوهاوي په موخه یې شکلونو ته په لازمو ځایونو کې ځای ورکړی دی چې لازمه شرحه لري ، یاد کتاب دطب پوهنځي د دویم کال لمړی سمستر کې تدریس کېږي او دنوي کریکولم اومفرداتو مطابق لیکل شوي دي ..

په پای کې ویلای شم چې نوموړي استاد ددې کتاب په لیکلوکې ډېر زیار وېستلی دی، زه یې دیوبا ارزښته علمی اثر په توگه قبلوم اوستایم ، د چاپ اونشر لپاره یې سپارښتنه کوم اوپه راتلونکي کې ورته دخدای (ج) څخه دروغتیا اونورو بریاوو هیله کوم .

په درنښت

پوهاند دوکتور خلیل احمد بهسودوال

د هستوپتالوژي څانگې امر او د ننگرهار پوهنتون ریس

سپارښتلیک

د اناټومي څانگې استاد ښاغلي پوهنيار د وكتور عبدالله جان شينواری دغه علمي اثر چې د انسان عمومي طبي امبریولوژي تر عنوان لاندې لیکل شوی دی زما له خوا ټول په پوره غور اودقت سره ولوستل شو خپل نظر دنوموړې علمي لیکنې په هکله په لاندې ډول څرگندوم:

نوموړي کتاب چې د انسان عمومي طبي امبریولوژي تر عنوان لاندې لیکل شوي دي لرونکي د ۱۶ فصلونو او ۲۱۰ مخونو دي چې په لومړي فصل کې د امبریولوژي پېژندنه، دوهم څپرکی کې د انسان د جنسي غړو اناټوموفزیالوژي، دریم څپرکی کې د جنسي حجراتو جوړښت، څلورم څپرکی کې د انسان تکامل، پنځم څپرکی کې القاح، شپږم څپرکی کې لمړۍ هفتې تکامل، اوم څپرکی کې د دوهمې هفتې تکامل، اتم څپرکی کې د دریمې هفتې تکامل، نهم څپرکی کې د څلورمې نه تر اتمې هفتې رشیم تکامل، لسم څپرکی کې د جنینې دورې عمومي توضیح، یوولسم څپرکی کې د جنینې دورې میاشتنی تغیرات، دولسم څپرکی پلاسنټا او جنیني عشاوې یې، دیارلسم څپرکی کې عبرگوني ماشومان او عشاوې یې، څوارلسم څپرکی کې ولادت او جنیني او نوي زیږیدلي ماشوم د وینې دوران، پنځلسم څپرکی کې Teratology او په شپاړلسم څپرکی کې د انسان جنیټیک او مخکې و دلادت څخه د ناروغیو تشخیص میتودونو موضوعات د لوړو زده کړو وزارت د کریکولم د مفاداتو په اساس د ورکړل شوو ریفرنس کتابونو څخه تهیه او ترتیب شوي دي.

دا کتاب د لوړو زده کړو وزارت د کریکولم کمیټې له خوا په نښه شوو کتابونو څخه ترجمه، تهیه او ترتیب شویده، چې د ژباړې او کتاب لیکنې ټول اصول په کې پام کې نیول شوي دي، د پښتو ژبې په روان عبارت لیکل شوی چې دامکان تر بریده انگلیسي اولاتیني اصطلاحات دمعا اومفهوم په ساتلو سره پښتو ژبې ته ژباړل شوي دي. پیچلې جملې په کې نه ترسترگوکېږي. د کتاب په لیکلو کې د ښه پوهاوي په موخه یې شکلونو ته په لازمو ځایونو کې ځای ورکړی دی چې لازمه شرحه لري، یاد کتاب د طب پوهنځي د دویم کال دویم سمستر کې تدریس کېږي او دنوي کریکولم اومفرداتو مطابق لیکل شوي دي.

په پای کې ویلای شم چې نوموړو استادانو ددې کتاب په لیکلو کې ډېر زیار وېستلی دی، زه یې دیوبا ارزښته علمی اثر په توگه قبلوم اوستایم، د چاپ اونشر لپاره یې سپارښتنه کوم اوپه راتلونکي کې ورته دخدای (ج) څخه دروغتیا اونورو بریاوو هیله کوم.

په درنښت

پوهنوال دوکتور محمد ناصر نصرتي

د اناټومي څانگې امر

لیکچر

لومړۍ څپرکۍ

د انسان عمومي طبي امبریولوژي

- ١ تعریف
- ٢ د امبریالوژي تاریخ په اوږدو کې
- ٧ د امبریالوژي برخې
- ٨ Location on Embryo د امبریولوژي یارشمې موقعیت

دویم څپرکۍ

د انسان تولد او تناسل سیستم اناټومو فزیالوژي

- ٩ بنځینه تناسلي سیستم
- ٩ Ovaries تخمدانونه
- ١٠ Uterian Tubes, Fallopian Tube نفیرونه
- ١٠ Uterus رحم
- ١٢ Vagina یا مهبل
- ١٤ Male Reproductive System د نارینه تناسلي سیستم
- ١٤ Testis یا حصى

درېیم څپرکۍ

د جنسي حجرو جوړېدل Gametogenesis

- ٢٠ Spermatogenesis یا سپرمونو جوړېدل
- ٢٣ Oogenesis د تخمې جوړېدل
- ٢٤ Maturation of Oocytes د تخمې پخېدل
- ٢٦ Ovulation د تخمې ازادېدل یا

۲۶	Corpus Luteum	زیر جسم
۲۷	Reproductive Cycle	
۳۰	Clinical Correction	کلینیکی تړاو

خلورم خپرکی

د انسان تکامل یا Development of the Human

۳۳		تکاملې دورې
۳۳		Prenatal Development
۳۶		Post – natal Development
۳۸		Puberty Period یا د بلوغت دوره
۳۹		Adulthood یا د کهلوت دوره

پنځم خپرکی

Fertiliation یا القاح

۴۱	Phases of Fertiliaztion	د القاح مرحلې
۴۲	Zona Pellucida	دویمه د نه د تېرېدو مرحله
۴۴	Zona Pellucida	وظایف
۴۵		کلینیکی تړاو

شپږم خپرکی

د لومړۍ هفتې تکاملي تغیرات

۴۷	په دریمه او خلورمه ورځ کې د رشیم تکامل
۴۹	په پنځمه، شپږمه او اوومه ورځ د رشیم تکامل
۵۱	کلینیکی تړاو
۵۲	Abnormal Zygote

اووم خپرکی

د دویمې هفتې تکاملي تغیرات

۵۳	 اتمه ورځ
۵۴	 نهمه ورځ
۵۵	 یولسمه او دولسمه ورځ
۵۷	 دیارلسمه ورځ
۵۹	 Yolk Sac او اهمیت یې
۵۹	 کلینکي تړاو

اتم خپرکی

د دریمې هفتې تکاملي تغیرات

۶۱	 Gastrulation
۶۳	 Notochord جوړېدل
۶۴	 Neural Tube
۶۵	 Allantois
۶۵	 Intra Embryonic Mesoderm تقسیمات
۶۶	 Intra Embryonic Coelom
۶۷	 د زړه او رگونو لومړني جوړښتونو جوړېدل
۷۰	 Teratogenesis گسترولیشن سره تړلي

نهم خپرکی

۷۲	 رشم د تکامل مرحلې
۷۲	 Head Folding
۷۴	 Tail Folding
۷۷	 د سومایټ تفریق پذیری
۸۰	 Birth defects ولادي نقیصې یا
۸۱	 Stem Cells کارول د ناروغیو په تداوی کې

لسم څپرکی

د نهمې هفتې پیل نه تر ولادت وخت پورې د جنین تکامل (د جنین تکاملې دورې میاشتنی تغیرات)

- ۸۲ جنین تفریق پذیری
- ۷۶ د جنین میاشتنی تغیرات
- ۹۰ Premature babies او Post mature, Time of birth د تولد متوقع عمر تعینوال

یولسم څپرکی

د جنین دورې مهم تکاملي تغیرات

- ۹۲ ۱- ۹ نه تر ۱۲ هفتې جنین مهم تکاملي تغیرات
- ۹۳ ۲- ۳ نه تر ۱۶ هفتې پورې د جنین عمده تکاملې تغیرات
- ۹۴ ۳- ۱۷ هفتې نه تر ۲۰ هفتې پورې د جنین عمده تکاملي تغیرات
- ۹۵ ۴- ۲۱ هفتې نه تر ۲۵ هفتې پورې د جنین عمده تکاملي تغیرات
- ۹۷ ۵- ۲۶ نه تر ۲۹ هفتې پورې د جنین تکاملي تغیرات
- ۹۸ ۶- ۳۰ نه تر ۳۴ مې هفتې پورې د جنین عمده تکاملي تغیرات
- ۹۹ ۷- ۳۵ نه تر ۳۸ مې هفتې پورې د جنین تکاملي تغیرات
- ۱۰۰ Post Maturity Syndrome یا د چوځوالي وروسته سندروم
- ۱۰۰ هغه فکتورونه چې وده اغیزه کوي
- ۱۰۱ سیگریټ ځکول

دولسم څپرکی

کورین، امیون، Decidua او پلاسنتا

- ۱۰۲ کوریون یا Chorionic Palate
- ۱۰۳ Chorionic Cavity
- ۱۰۳ امیون او امینیوتیک مایع
- ۱۰۴ د امینیوتیک مایع اهمیت او وظیفه

۱۰۵	 د پلاسنتا تکامل
۱۰۷	 Maternal Part of Placenta
۱۰۹	 Placental Membrane
۱۱۱	 Umbilical Cord یا خبل سروي
۱۱۲	 کلینیک تړاو

ديارلسم څپرکی

غبرگونټوب يا د دوگانگي Twinning

Fetal Membrane او د جنيني غشاوې

۱۱۴	 Dizygotic Twins
۱۱۴	 Monozygotic Twins
۱۱۷	 Fetal Membranes in Twin د دوه گونو ماشومانو جنيني غشاوې
۱۱۸	 Twin Defects د دوگانگيو نقيصه

څوارلسم څپرکی

Parturition يا زېږون

۱۲۱	 زېږون يا ولادت په درېو مرحلو تر سره کېږي
۱۲۴	 Preterm Birth مخکې د وخت څخه ولادت
۱۲۶	 Neonatal Circulation د ولادت په وخت کې دوراني تغيرات يا

پنځلسم څپرکی

Teratology

۱۲۹	 تعريف
۱۳۰	 Teratology اساسات
۱۳۱	 Teratogens د موادو ډولونه
۱۳۳	 Prenatal دوره کې يې زړه بدونکي تغيرات

شپاړسم څپرکی
جنیتیک او د انسان تکامل

۱۳۵	 کروموزوم جوړښت او جینونه
۱۳۶	 د انسان تکامل مالیکولي بیالوژي
۱۳۷	 Gene Expression د جین څرگندېدل
۱۳۸	 لومړۍ مرحله ترانسکریپشن
۱۳۸	 دویمه مرحله ترانسلیشن
۱۳۹	 Prentatal Diagnosis یا مخکې د ولادت څخه تشخیص
۱۴۱	 Referecnce

لمړۍ څپرکۍ

د انسان عمومي طبي امبریولوژي

هغه پروسه چې د هغې په نتیجه کې انسان د یوې واحدې حجرې څخه تکامل او انکشاف کوي ، فوق العاده حیرانونکې او خدایي معجزه ده چې ممکن دا ډول عجیبه، حیرانونکې او تر ټولو پیچلې پروسه تراوسه په نړۍ کې نه وي ترسره شوې. ددې پروسې میکانیزم یا جوړښت باندې پوهاوی یو محصل یا ډاکټر لپاره چې د انسان جوړښت ، کړنو ، د روح او بدن روغتیا او سلامتیا سره سر و کار لري ډیر ضرور دی. په همدې وجه د یو طب زده کونکي لپاره ددې ترڅنگ چې د طب نورې برخې لکه اناتومي ، هستولوژي ، پتالوژي ، فزیالوژي او داسې نور زده کوي د امبریولوژي زده کول یو ضروري امر پیژندل شوی دی.

تعریف :

امبریالوژي له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوېده، چې Embryo په مانا د رشیم او Logos په مانا علم ده ، خو امبریالوژي په اصطلاح کې په پراخه مفهوم سره د Progenesis (دجنسي حجرو تشکیل او تکامل)، Embryonic Period Development (رشیمي دورې تکامل) Fetal Period Development (جنیني دورې تکامل) او Post natal Period Development (دولادت څخه وروسته دورې تکامل) څخه بحث کوي.

امبریالوژي بل نوم Developmental Biology هم دی یعنې د بیالوژي یوه څانګه ده چې د ژوندیو موجوداتو د جوړیدو ، لمړنۍ ودې او تکامل څخه بحث کوي. یا د یوژوندي موجود منشا، وده، تکامل او وظایف د القاح څخ ترولادت وخت پورې مطالعه امبریولوژي بلل کیږي. امبریالوژي نسبت رشیم (لمړیو اتو هفتو کې) کتنې ته کیږي ، خو د امبریالوژي کلمه په عمومي ډول مخکې د ولادت څخه د رشیم او جنین تکامل لپاره کارول کیږي .

Developmental anatomy د انسان ساختماني تغیرات د القاح څخه تر بلوغت پورې په بر کې نیسي ، چې پدې کې Embryology ، Fetology او Postnatal Development شامل دي.

طبي امبریولوژي (Medical Embryology) د انساني رشیم او جنین د انکشاف ، د ولادي ګډوډیو عواملو او ټولو هغو فکتورونو څخه چې په امبریوجنیزیس باندې تاثیر کوي او ددې انومالیو تر او له کلینیک سره ښايي بحث کوي.

د لاندې دلایلو په اساس امبریولوژي په طب کې لوستل کېږي.

۱- د امبریالوژي په واسطه دا روښانه کېږي چې څنګه یوه واحده حجره په یو نوي زیږیدلي ماشوم تکامل کوي.

۲- انسان د بدن د ډیرو پیچلو اناتوميک جوړښتونو د حقایقو په پوهاوي کې کومک کوي.

۳- امبریالوژي مو دهغه ماشومانو په هکله چې د ځینو غړو د نیمګړتیاو یا ګډوډیو (خراب تکامل) سره تولد کېږي دنوموړو نیمګړتیاو او ګډوډیو په وضاحت کې کومک کوي.

۴- امبریالوژي د خراب تکامل (Malformation) د رامنځته کیدونکو فکتورونو په

پیژندلو او رامنځته شوو ګډوډیو په لرې کولو کې مرسته کوي

۵- په جنین کې د انساجو تولیدونکو حجراتو ته Stem cells وایي چې سټیم سیلز د ولادت څخه وروسته د ځینو ناروغیو په تداوی کې کارول کیدلی شي .

هرکس د ژوند لمړې نهه میاشتې (۲۶۶ ورځې یا ۳۸ هفتې) د مور په رحم کې تیروي ، د یوحجروي جوړښت څخه تریو ژوندي موجود چې ډیرې حجرې لري تکامل کوي ، ګڼ شمیر انساج ، اعضاوې او سیستمونه منځ ته راوړي.

د امبریالوژي تاریخ په اوږدو کې

د امبریالوژي پرمختګ او انکشافات د تاریخ په مختلفو دورو کې په لاندې ډول توضیح

شوی.

۱- د انسان امبریالوژي د تاریخ په لرغوني دوره کې

په ډیر لرغوني وخت کې (نژدې ۳۰۰۰ کاله مخکې د میلاد څخه) مصریان د مرغانو هګیو شاربیلو (Incubate) په میتودونو پوهیدل خوددې کار کومه ثبت شوې نتیجه ترې نه ده پاتې شوی.

Akhnaton چې د لمر عبادت یې کاوه هغه پدې عقیده وو چې د لمر خدای (اټن)

په ښځو کې هګۍ جوړوي ، په نارینه کې تخمونه منځته راوړي او ماشوم ته د ښځې په بدن کې

ژوند ورکوي . پخوانیو مصریانو دا عقیده وه چې د تولد په وخت کې ماشوم ته د پلاستېلا دلارې روح داخلېږي.

هندکې په لرغوني امبریولوژي باندې یوه سانسکریټ رساله چې فکر کېږي ۱۴۱۶ کاله مخکې له میلاده لیکل شویده موجوده ده ، د هندوانو دا نسخه Garbha Upanishad په نوم یادېږي او د انسان امبریولوژي په هکله یې داسې لیکلي دي.

د وینې او مني دیوځای کیدو څخه رشیم وجود منځته راځي . د امیدوارې داخیستو لپاره په مناسب وخت کې د کوروالي څخه وروسته هغه په Kalada (یو ورځنی رشیم) بدلېږي ، د اوه شپو پاتې کیدونه وروسته کڅوړه (Vesicle) بدلېږي ، دوه اونۍ وروسته په گرده کتله اوږي، یوه میاشت وروسته په یوه کلکه کتله بدلېږي ، دوه میاشتې وروسته یې سر منځته راځي او په دریمه میاشت کې یې اطرافو برخې را ښکاره کیږي .

یوناني عالمانو د امبریولوژي علم په باره کې ډیرې مهمې مرستې او لاسته راوړنې تر سره کړيدي . لمرنۍ ریکارډ شوې امبریالوژیکه مطالعه د هایپوکرات (مشهور یوناني عالم دی چې ۴۶۰ – ۳۷۷ کاله مخې د میلاد څخه ژوند کاوه) په کتاب کې چې د طبابت پلار بلل کیږي ذکر شوېده . هغه دا واضح کړیده چې څنګه د انسان رشیم تکامل کوي.

هایپوکرات وايي د چرګو شل یازیاتې هګې راواخلي او ددوه یازیاتو چرګو لاندې یې کیږدې چې ترڅو هغه په منظم ډول د چرګانو پواسطه وشاربل شي . ددوهمې ورځې څخه وروسته هر ورځ یوه یوه هګې د چرګې نه راواخلي ، ماته یې کړی او معاینه یې کړی ، پدې ډول یې دهرې ورځې تغیرات مطالعه کړي . بلاخره دې نتیجې ته به ورسېږي کوم چې یې زه وایم داسې چې د انسان داخل الرحمي تکامل ددې (مرغانو رشمي تکامل) سره ورته دی .

Aristotle of Stagira (۳۸۴ – ۳۲۲ کاله مخکې د میلاد څخه) یوناني فیلسوف او عالم دی ، دامبریالوژي یوه رساله د چرګانو او نورو رشیمونو تکامل په باره کې لیکلې ده . ارسطو د امبریالوژي موسس بلل کیږي ، هغه دا نظر چې وایې رشیم د بې شکله کتلې نه تکامل کوي نور هم تقویه که او داسې یې تشریح کړ ، چې یوبل سره په نامکمل ډول نښتي تخمونه د روح پواسطه د وجود ټولې برخې تغذي کیږي . هغه په فکر رشیم دښځې حیض له وینې نه چې د نارینه Semine پواسطه فعالیږي منځته راځي .

Claudius Galen (۱۳۰ - ۲۰۱ مخکې د میلاد څخه) په روم کې یوناني طبي عالم دی، د جنین په جوړېدو باندې یې یو کتاب لیکلی او د جنین تکامل، تغذي او جوړښت یې پکې تشرېح کړېدی. د جنین جوړښت په هکله یې ځینې ساختمانونه یاد کړيدي لکه النټوز، امنیون او پلاسنتا چې اوس هم په همدې نومونو یادېږي.

په Talmud کې د رشیم د جوړېدو په هکله معلومات شته. یهودي ډاکټر Samuel-el-Yehudi چې په دوهمه میلادي پېړۍ کې یې ژوند کاوه د رشیم د جوړېدو په هکله یې رشیم د بې شکله غونډې شوې کتلې څخه تر ماشوم پورې په شپږو مرحلو کې تشرېح کړ. همدارنگه د تلمود پوهانو داسې عقیده وه چې هډوکي، وترونه، نوکان، په سر کې د هډوکو مغز او د سترگو سپین له پلارنه منشا اخلي او پوستکي، غوښه، وینه، ویښتان، له مور څخه منشا اخلي دا نظریې د ارسطو او گالین د تدریس په بنیاد وې.

۲ - امبریالوژي د تاریخ په منځنۍ دوره کې (۶۰۰ - ۱۵۰۰م کلونو ترمنځ):

څرنگه چې په منځني عصر کې د ساینس پرمختګ ورو و، همدارنگه د امبریالوژي په اړه هم لږ څه تر سره شويدي چې دا مالومات په لاندې ډول دي.

د اسلام په مقدس کتاب قران پاک کې (اوومه میلادی پېړۍ) یادونه شوې چې انسانان دنارینه او ښځینه افزاتو له یوځای کیدو څخه رامنځته کېږي. د نطفې (کوچنۍ څاڅکۍ) څخه د انسان د جوړښت په اړه څو ځایه یادونه شوېده. همدارنگه پدې مقدس کتاب کې دا هم ذکر شوي چې منځته راغلی جوړښت (ارګانیزم) شپږ ورځې وروسته په زیلانځه (رحم) کې ځای په ځای کېږي اوداهم ویل شويدي چې په پیل کې رشیم د ژورې سره ورته والی لري او وروسته دژوول شوو موادو په څیر شکل غوره کوي. Constantinus Africanus of Salerno (۱۰۸۷ - ۱۰۲۰ م کلونو) د De Humana Natura په نوم لنډ کتاب لیکلی او داسې یو نظریه چې پخوا وختونو کې چا نه پیژندله وړاندې کړېده داسې چې د جنین ترکیب او پرلپسې انکشاف یې د ستورو او د حمل په دوران کې هرې میاشت سره په تړاو تشرېح کړی. دمنځني عصر عالمانو د ارسطو له نظریې (رشیم د تحيضي وینې او Semine له یوځای کیدو څخه جوړېږي) څخه ډیر کم انحراف کاوه.

۳ - امبریالوژي د تاریخ په نوې دوره یا Renaissance کې (ساینس نهضت عصر)

Leonardo da Vinci (۱۴۵۲ - ۱۵۱۹ م کلونو) جنین لرونکي رحم مقطع صحیح انځور یې وړاندې کړ. هغه د Prenatal growth اندازه کولو لپاره د امبریالوژي مقداري طریقه وړاندې کړه.

امبریولوژیک انقلاب په ۱۶۵۱ م کال کې د William Harvey's کتاب ، De Generations Animantium په لیکلوسره شروع شو. هغه عقیده درلوده چې نارینه تخمونه یا سپرمونه وروسته لدې چې زنانه رحم ته داخل شي دهگې په څیر ماده بدلیږي چې جنین ورڅخه انکشاف کوي.

Girolamo Fabricius ۱۵۳۷ - ۱۶۱۹ م کلونو: دوه لویې امبریالوژي رسالې د De Formato Foetu (The Formed Fetus) په نوم لیکلي چې د رشیمونو او جنینونو د تکامل د مختلفو مرحلو ډیر انځورونه لري.

لمړنی مایکروسکوف ډیر ساده وو خو ډیرو نوو ساحو کتلو ته یې لاره هواره کړه . په ۱۶۷۲م کال کې Regnier de Graaf د سوی په رحم کې کوچني چمبرونه مطالعه کړ او دا خبره یې ختمه کړه چې رشیم د رحم پواسطه افرازیږي ، بلکې دایې واضح کړه چې دیوبل ارگان پواسطه چې تخمدان نومېږي منځته راځي . بې له شکه دغه واړه چمبرونه چې Graaf تشریح کړي وو Blastocysts وو . همدارنګه نوموړي عالم دتخمدان کڅوړه لرونکي فولیکلونه (Vesicular Ovarian follicles) چې اوس هم ورته Graafian Follicles دي هم توضیح کړه. په لیډن (د هالینډ یو ښار) کې د طب یو ځوان محصل Johan Ham van Arnheim او Anton van Leeuwenhoek په ۱۶۷۷م کال کې د یو پرمختللي مایکروسکوپ په مرسته لمړی ځل لپاره د انسان سپرمونه ولیدل مګر، هغوي په القاح کې د سپرم په رول غلط پوه شوي وه . هغوي فکر کاوه چې په سپرم کې له مخکې جوړ شوی کوچنی انسان موجود وي چې دښځې په تناسلي سیستم کانال کې له پاتې کیدو وروسته غټیږي .

Caspar Friedrich Wolff په ۱۷۵۹ م کال کې دا نظریې چې جنین برخې له گلوبول (کوچني کروي جسمونو) څخه تکامل کوي او د مالپیګي دا نظر چې غیرالقاح شوې هگې هم رشیم

لري غلطې ثابتې کړې . نوموړي عالم د رشيم د طبقو مفکوره وړاندې کړه (چې اوس Embryonic disc بلل کېږي) چې له هغې رشيم تکامل کوي . دده نظريې د Epigenesis theory قاعده جوړه کړه . دا نظريه وايي چې انکشاف د ځانگړو حجرو له ودې او تفریق پذيری نه رامنځته کېږي دا مهم کشفیات لمری ځل لپاره د والف په علمي مقاله (Theoria Generationis) کې راڅرگند شو .

Lazaro Spallanzani په ۱۷۷۵ م کال کې د سپرم په هکله هغه نظريه چې په سپرم کې له وړاندې کوچنی مخلوق قرار لري پای ته ورسوله او دا يې وښوده چې سپرم او تخمه د يو نوي موجود تکامل لپاره اړين دي . هغه له خپلو تجربو څخه ، په سپيو کې دمصنوعي القاح په گډون دې نتيجه ته ورسيدل چې سپرم القاح کوونکی عامل دی چې د انکشاف پروسه شروع کوي .

Heinrich Christian Pander پواسطه په ۱۸۱۷ م کال کې د رشيم درې طبقې چې Blastoderm يې بللې کشف کړې Etienne Saint Hilaire . او دهغه زوي Isidore Saint Hilaire پواسطه په ۱۸۱۸ م کال کې لمری ځل لپاره غيرنورمال تکاملي تظاهرات وپيژندل شو چې اوس همدا اېنارمل تکاملي تظاهرات Teratology تر عنوان لاندې مطالعه کېږي .

Karl Ernst von Baer په ۱۸۲۷ م کال کې نژدې ۱۵۰ کاله سپرم د کشف نه وروسته د سپيو په تخمدان کې Ovarian follicle وپيژندل او توضيح يې کړل . همدارنگه په Uterine tube کې يې د زايگوت تقسيمات (Cleaving) او په رحم کې يې Blastocysts هم مشاهده کړل . هغه درشيم له طبقو څخه د انساجو او غړو منشا په هکله تيوري چې پوځواد مالپيگي اوپانډر لخوا توضيح شوې وه يوڅه نوره هم تقويه کړه . کارل وان بير پام وړ او پراخه ونډې ددې لامل شوې چې د عصري امبريالوژي پلار وگڼل شي .

Wilhem His ۱۸۳۱ – ۱۹۰۴ م کال (د سويس اناتوميست او امبريالوجست وو ، د انساجو او درشيم د بيا جوړښت لپاره د تثبيت ، مقطع او تلوين اصلاح شوي تخنيکونه رامنځته کړل .

Wilhem Roux (۱۸۵۰ – ۱۹۲۴ م کال) په ذوخيائينو کې د انکشاف په فزيولوژي باندې د تخليلي تجربوي مطالعو مخکښ شو چې وروسته د Hans Spemann ۱۸۶۹ – ۱۹۴۱ م کال له خوا نوره هم تعقيب شوه . د لمری انډکشن د پديدې د کشف لپاره چې څنگه يو نسج د بل برخليک ټاکي سپيمان په ۱۹۳۵ م کال کې د نوبل جايزه تر لاسه کړه . د څو لسيزو په تيريدو

سره ، ساینس پوهانو هغه مواد بیل کړه چې له یو نسج څخه بل ته انتقالیږي او دهغه انډکشن سبب گرځي.

Robert G Edwards د انساني تکثر په تاریخ کې یو د زیاتو انقلابي پرمختیاوو مخکښ شو. له رحمې باندې القاح کولو (In Vitro Fertilization) په هکله څېړنه لمرۍ ځل د لويس براون په پواسطه په ۱۹۷۸م کال کې ترسره شوه چې لمرنۍ Test Tube Babies د زیږیدو لامل شو . له هغې راوروسته ، په نړۍ کې په ملیونونو شنډو جوړو د نوې تکثري تکنالوژۍ له برکته زیږیدو معجزه تجربه کړه .

د امبریالوژي برخې

امبریالوژي ډیرې څانګې لري چې ځینې یې په لاندې ډول دي .

امبریالوژي له دوه اساسي برخو څخه جوړه شویده چې یوه عمومي امبریالوژي (General Embryology) چې د انسان د تکامل د عمومي قوانینو او مسایلو څخه بحث کوي بل یې خصوصي امبریالوژي (Systemic Embryology) ده چې د انسان د اعضاو او سیستمونو جوړښت او تکامل څخه بحث کوي . دلته هم د درسي کریکولم مطابق د عمومي امبریالوژي څخه بحث شوی دی .

۱ : **Descriptive Embryology** - د امبریالوژي هغه څانګه ده چې رشیم ، جنین او ددوي اجزاوې داناتومي او کرونولوجي په سلسله مطالعه کوي یعنې مرحلې یې تعریفوي او د تکامل پرمختګ تشریح کوي.

۲ : **Comparative Embryology** - د امبریالوژي هغه څانګه ده چې د ژوندیو موجوداتو په مختلفو نوعو کې په مقایسوي ډول رشیم او جنین د Taxonomy او نور اهدافولپاره مطالعه کوي.

۳ : **Experimental or Causal Embryology** - دهغه فکتورونو څېړنه او د تکامل سره تړاو چې په رشیم کې تجربوي پروسیجروپه نتیجه کې لاسته راغلي وي تجربوي یا سببي امبریالوژي بلل کیږي . یا په تجربوي حیواناتو کې د ژوندیو موجوداتو تکاملي تګیراتو مطالعه د مختلفو هغه فکتورونو سره چې درشیم په تکامل تاثیرات لری تجربوي امبریالوژي بلل کیږي .

۴ : **Embryo pathology** - د اېنارمل رشیم مطالعه امبریوپاتالوژي څخه عبارت دی.

د امبریولوژي یارشیم موقعیت: (Location on Embryo)

تخمه او سپرم دواړه د Uterian tube په امپولا برخه کې سره یوځای کیږي (دالقاح عمل سرته رسوی)، زایګوټ یا یو خجروي رشیم جوړوي، په دوهمه او دریمه ورځ په همدې ټیوب کې وي، ددریمې ورځې په اخیږیا دڅلورمې ورځې په شروع کې رحم جوف ته رسیږي. پدې وخت کې رشیم د شاتوت دانې په شان منظره غوره کوي چې Marula بلل کیږي، په څلورمه او پنځمه ورځ درحم جوف کې وي، درحم افرازات مړولا منځ ته ننوزي او په بلاستوسیست بدلیږي، په شپږمه ورځ رحم دجسم له جدار سره په تماس راځي، درحم اندومیتريوم په وظیفوي طبقه (Functional layer) کې په غرس کیدو شروع کوي او تر دولسمې یا دیارلسمې ورځې پورې په اندومیتريو وظیفوي طبقه کې په مکمل ډول غرس کیږي. په همدې وظیفوي طبقه کې خپل تکامل ته دوام ورکوي. درحم په وظیفوي طبقه کې رشیم بیرونې طبقه چې تروفوبلاست ده وده کوي رشیم ودې او تکامل لپاره ضروري مواد درحم وظیفوي طبقې دوینې جریان څخه برابروي داسې چې دپلاسنټاجوړیدل شروع کیږي او وروسته په دریمه څلورمه میاشت کې تکمیلېږي. درشیم داخلي حجرات د اتمې هفتې تر اخر پورې ورو ورو غټیږي، رحم جوف طرف ته تبارز کوي د رحم له وظیفوي طبقې څخه راوړي او د اتمې هفتې تراخړه رشیم په شکل اواندازه کې تغیرات راځي چې انسان قیافه غوره کوي او په جنین بدلیږي.

دویم څپرکی

د انسان تولد او تناسل سیستم اناټوموفزیالوژي

د انسان بدن یوازینی سیستم چې په نارینه او ښځینه و کې د غړو له نظره سره پوره توپیر لري تولد او تناسل سیستم څخه عبارت دی ، نو ځکه په نارینه او ښځینه و کې تولد او تناسل سیستمونو غړو اناټوموفزیالوژي جدا جدا توضیح کوو.

الف – ښځینه تناسلي سیستم یا: Female Reproductive System

i- د ښځینه تناسلي سیستم داخلي غړي

۱ - تخمدانونه: (Ovaries)

تخمدانونه د ښځو تناسلي سیستم دوه بادامي شکله بیضوي غړي دي چې د رحم په دواړه خواو او د حوصلې په وحشي جدار کې قرار لري .
تخمدانونه مختلطې جنسي غدې (اگزوکراین او اندوکراین وظایف لري) دي .
اگزوکراین محصول یې د Ovum یا تخمې د انکشاف او تکامل څخه عبارت دی او اندوکراین وظیفه یې د Progesterone او Estrogen هارمونونو افراز دی ، نوموړي هارمونونه د دوهمي جنسي خواصو انکشاف او تنظیم او د رشیم او جنین د ودې او انکشاف مسولیت په غاړه لري.
د تخمدان په مقطع کې دوه برخې لري چې په لاندې ډول دي.

الف – Medulla Ovary: د تخمدان دا برخه یوه متراکم منظم نسج نه جوړه شویده چې په هغه کې د وینې او لمفاوي رگونه او اعصاب او همدارنګه یو تعداد ملسا عضلات لیدل کیږي چې د تخمدان سرې یا Hilus سره ارتباط لري.

ب – Cortex ovary: دا برخه د Tunica Albuginea لاندې قرارلري چې د Stroma او یو تعداد فولیکولونو څخه جوړه ده . سټروما د شبکوي الیافو او یو تعداد دوک ماننده حجراتو څخه چې د فیبروبلاست او ملسا حجراتو ځانګړتیاوې لري جوړه شوې ، همدارنګه د تخمدان په قشر کې یو تعداد فولیکولونه د تکامل په مختلفو مراحلو کې لیدل کیږي

۲ — نفیرونه (Uterian Tubes, Fallopian Tube)

دوه عدده تیوب ډوله جوړښتونه دي چې د تخمدان او رحم په منځ کې قرار لري . نفیرونه تقریبا ۱۰ سانتي متره اوږدولې او ۱ سانتي متر قطر لري . ددې تیوب د مخاطي طبقې د حجراتو د Cilia او د تیوب د جدار د عضلاتو د تقلص په مرسته القاح شوې تخمه رحم ته انتقالیږي . نفیرونه څلور برخې لري . چې په ترتیب سره د تخمدان څخه رحم جوف ته په لاندې ډول دي .

۱: Infundibulum ۲: Ampulla ۳: Isthmus ۴: Intermural part


Infundibulum برخه د گوتو په شان برامدگۍ (Fimbria) لري چې تخمدان شاوخوا ته قرار لري . نفیرونه تخمې له تخمدان څخه رحم ته او سپرمونه رحم نه نفیرونو امپولا برخو ته انتقالوي او همدارنگه القاح عمل هم په نفیرونو کې صورت نیسي .

۳ — رحم : (Uterus) یو پنډ جدارلرونکې عضوه ده چې د حوصلې په جوف کې د نفیرونو او Vagina ترمنځ قرار لري داسې چې قدام ته یې مثانه او خلف ته یې ریکتوم قرار لري . د رحم اوږدوالی ۷cm ، عرض یې ۵cm او ضخامت یې ۳-۲ cm پورې دی . رحم جوف په درې برخو Fundus ، Body او Cervix تقسیم شوی او د رحم جدار له درې طبقو څه جوړېږي . چې په لاندې ډول دي .

الف - : Perimetrium نری طبقه ده چې رحم د باندې نه پوښوي .

ب - : Myometrium د ملسا عضلا تو یوه ضخیمه طبقه ده چې د عضلي الیافو په منځ کې کافي اندازه منظم نسج او رگونه قرار لري . دا عضلي حجرات د حاملگۍ په وخت کې Hypertrophy (د عضلي حجراتو اندازې زیاتوالی) او Hyperplasia (د عضلي حجراتو تعداد زیاتوالی) کوي .

ج - : Endometrium د رحم داخلي یا مخاطي طبقه ده ، مایومیتریوم سره نښتې ده او دیوه ساده استوانه یي اپیتل پواسطه پوښل شوی . ددې اپیتل په داخلیدو سره لاندینی منظم نسج کې د اندومتریوم غدوات رامنځته کیږي چې ددې غداواتو ترمنځ فاصله کې منظم نسج یا Stroma قرار لري ، په دې کې علاوه د منظم نسج څخه رگونه او یو تعداد لوکوسایټونه هم لیدل کیږي .



۲ - ۱ انځور : د ښځينه تناسلي سيستم داخلي غړي.

زنانه و په ولادي دوره يا Reproductive Cycle (هغه دوره ده چې زنانه پکې د ماشوم د راوړلو وړتيا لري) کې انډميټريوم طبقه په مايکروسکوپيک ډول په درېو کوچنيو طبقو تقسيمېږي چې په ترتيب سره د عضلي طبقې څخه درحم جوف طرف ته په لاندې ډول دي .


Basal layer - ۱ Spongy layer - ۲ Compact Layer - ۳

Compact او Spongy Layer ته په گډه Functional Layer (وظيفوي طبقه) هم وايي، ځکه چې د تحيض په دوران کې او د ماشوم تولد نه وروسته پارچه پارچه کېږي او له منځه ځي او هم د رشيم او جنين په وده کې مستقيم رول لري.

Basal Layer دا طبقه د تحيض په وخت کې نه غورزول کېږي، قاعدوي طبقه Spongy

او Compact layer د غورځيدو څخه وروسته دوباره ترميموي.

اندوميټريم د پوره انکشاف په وخت کې ۴-۵ ملي متره پنډوالی لري.



۲-۲ انځور : د رحم انډیومتریوم جوړښت انځور.


۴ - مهبل یا **Vagina** یو لیفي عضلي تیوب ډوله جوړښت دی چې د مخاط پواسطه پوښل شوی دی او درحم Cervix برخه د Vestibule سره نښلوي. د Vagina په اپیتل کې غذاوات نه لیدل کېږي او د Cervix دغذاواتو دمخاطي افرازاتو پواسطه لوند ساتل کېږي. Hymen یا بکارت پرده مهبل د مخاطي طبقې یو عرضاني رواتلی جوړښت دی چې د Vagina او Vestibule په منځ کې قرارلري او د مهبل سوری په نسبي ډول بنده ساتي. ii- د ښځینه تناسلي سیستم خارجي غړي : د فرج یا Vulva په نوم هم یادېږي ، لاندې برخو نه جوړ دی.

الف : **Clitoris** - د نارینه تناسلي الې (قضیب) یو ابتدایي او ناقصه شکل دی ، ددوه Corpus Cavernosum عضلي ساختمانونو څخه چې د Stratified Squamous Epithelium پواسطه پوښل شوی دی جوړ شوی ، ډیرې حسي اخځې لري ، چې په ښځو کې د جنسي حس (Sex Sense) وظیفه تامینوي.

ب – : *Labia Minora* د مخاطي طبقې التواگانې يا پردې دي او د Vestibule جنبې ديوالونه جوړوي.

ج – : *Labia Majora* د پوستکي التوات يا پردې دي چې *Labia Minora* د باندې خوا نه پوښوي.

د – : Vestibule د Vulva يوه نسبتاً پراخه برخه ده چې د Vagina باندینې فوچه پکې خلاصیږي. د Vestibule په جدار کې Clitoris ته نژدې یو تعداد غداوات Minor Vestibular Glands او Major Vestibular Glands يا Bartholine Glands وجود لري چې مخاطي مایع جوړوي او د بکارت غشا ته نژدې Vulva ته یې افرازوي.



۲ – ۳ انځور: د ښځینه تناسلي سیستم داخلي او خارجي تناسلي غړي.

ب : - د نارینه تناسلي سیستم Male Reproductive system

د نارینه تناسلي سیستم غړو موقعیت هم د ښځینه تناسلي غړو په شان خارجي او داخلي برخو تقسیم شوي دي.

○ **خارجي تناسلي غړي :**

● سکروتوم یا Scrotum : د سکروتوم مختویات عبارت دي له خصیې یا Testis ،
بربخ یا Epididym' او د Vas Deference ښکتنی برخې څخه

● قضیب یا Penis

○ **داخلي تناسلي غړي**

● Seminal Vesicles

● Prostate

● Bulb urethral Glands

خو په مجموع کې ویلی شو چې د نارینه تناسلي سیستم له Male Genital ducts ،
Testis ، Auxiliary Genital Glands او Penis نه جوړ دی ، چې هره برخې اناتوموفزیالوژي
په لاندې ډول توضیح کیږي.

الف – حصي یا Testis :

حصیې دوه عدده د نارینه جنسي غدې دي چې د سکروتوم په نوم جوړښت کې د
شرمگاه په ساخه کې قرار لري.

حصیې هم مختلطې یا Mixed غدې (اکزوکراین او اندوکراین) دي ، اکزوکراین تولید
یې د نارینه جنسي حجراتو یا Spermatozoids انکشاف او تکامل او اندوکراین افراز یې د
Testosterone هارمون څخه عبارت دی.

حصیې دجوړښت له نظره درې پوښونو څخه جوړې دي.

۱ – Tunica Vaginalis د خصیو باندینی نازکه طبقه ده چې د میزوتیل حجراتو

پواسطه پوښل شویده.


۲ – Tunica Albuginea د Vaginalis پوښ لاندې د متراکم منضم نسج یوه ډبله طبقه ده ، د خصیو شکل او چوکاټ یې جوړ کړی دی . پدې پوښ کې یو کم تعداد ملسا حجرات هم وجود لري .

۳ – Tunica Vasculosa د خصیو دریم یا داخلي پوښ دی چې د سست منضم نسج او شعریه عروقو دیوې شبکې څخه جوړ دی .

Tunica Albuginea د خصیو په خلف کې ډیليبري Mediastinum Testis جوړوي ، ددې میډیاسټینوم څخه یو تعداد حبابات یا پردې منشا اخلي د خصیو محیط طرف ته پرمختګ کوي او هره خصیې په ۲۵۰ عدد هرم شکله لوبولونو باندې ویشي ، چې دلوبول زروه یا څوکه یې میډیاسټینوم په طرف او قاعده یې د Testis محیط خوا ته قرار لري ، همدارنګه د خصیو لوبولونه یو بل سره د حبابونو ترمنځ کوچنیو سوړو پواسطه ارتباط لري . په هر لوبول کې ۱- ۴ منوي قناتونه یا Seminiferous Tubules ، شعریه عروق او Interstitial Cells of Leydig وجود لري .

په منوي قناتونو کې د Germinative Epithelium دوه ډوله حجرات لیدل کیږي .
۱ : Spermatogenic Cell - د بالغ نارینه منوي قناتونو په داخل کې Spermatogenic Epithelium په مختلفو تکاملي مرحلو کې لیدل کیږي ، په ترتیب سره د قاعدې څخه سطحې ته تفریق پدیري کوي او دمنوي قنات په منځ کې په Spermatozooids بدلیږي . د دې سلسلې لمړني حجرات Spermatogonia بلل کیږي .

۲ : Sertoli Cells – ددې حجراتو تعداد په Germinative Epithelium کې کم دی او د سپرماتوجنیک حجراتو په منځ کې قرار لري Sertoli Cells . د سپرماتو جنیک حجراتو په استناد او تغذیې کې کومک کوي او هم سپرماتوجنیک حجرات د مضر موادو څخه ساتي .
دمنوي قناتونو ترمنځ ځایونو کې Leydig Cells په نوم گروپي شکل حجرات موجود دي چې د نارینه تناسلي هارمون Testosterone جوړولو دنده لري ، په نارینه و کې د دوهمي تناسلي خواصو ، جنسي حرکتونو او تناسلي قناتونو او ضمیموي یا Auxiliary غدواتو فعالیتونه کنټرولوي او همدارنګه په منوي قناتونو کې Spermatogenesis هم تنبه کوي .



۲-۲ انځور : د Testis او Epididymis جوړښت او د Testes طبقې

- *The Male Genital Ducts* یو تعداد تیوب ماننده ساختمانونه دي چې د منوي مایع په خارجیدو کې کومک کوي ، په ترتیب سره په لاندې ډول دي.
 Tubuli Recti د لوبولونو سر برخونه شروع کیږي او د خصیو په میډیاستینوم کې Rate Testis په نوم شبکه جوړوي ، لدې شبکې نه نور قناتونه Ductus Efferent په نوم منشا اخلي او په Epididymis باندې خاتمه مومي ، له Epididymis څخه Ductus Deference یا Vas Deference شروع کوي او د شرمگاه ساحې څخه حوصلې جوف ته داخلېږي چې هلته د Seminal Vesicle له قناتونو سره یوځای کیږي او Ductus Ejaculatorous جوړوي چې دا قنات بلاخره کې په احلیل (Urethra) کې تخلیه کیږي.

د جنسي قناتونو په لمړیو برخو کې (Ductus Efferent ، Rate Testis ، Tubuli Recti) او دمڼوي قناتونو پواسطه جوړ شوي سپرمونه Maturation کیږي یعنې د حرکت وړتیا پیدا کوي او هم د څو ورځو پورې ذخیره کیږي. د جنسي قناتونو په وروستي برخې (Ejaculation) پواسطه انزال (Urethra او Ductus Ejaculatorous ، Vas deference) صورت نیسي .

• *The Auxiliary Genital Glands* دا غدوات په لاندې ډول دي.

یوتعداد غدوات د نارینه و په تناسلي سیستم کې وجود لري چې د انزال څخه وروسته د ښځینه و تناسلي سیستم کې سپرمونو لپاره محیط او انرژي برابرولو کې کومک کوي . نوموړي گروپ غدوات په لاندې ډول دي.


۱: Prostate Glands - پروستات دمټانې لاندې او د احلیل اولنې برخې گرد چاپیره قرار لري ، نرې شیدو په څیر مایع چې په هغې کې په پوره اندازه Acid phosphatase وجود لري احلیل ته افرازوي.

۲ : Seminal Vesicle - دا کڅوړه د Ductus Deferens د امپولا یو اضافي قسمت دی چې د پروستات د غدې په خلف کې قرار لري ، یوه ژیر رنگه مایع د Seminal Fluid په نوم افرازوي چې پدې مایع کې په کافي اندازه فرکتوز وجود لري کوم چې دسپرم په تغذي کې رول لري.

پورته دواړه گروپه غدوات معمولا د انزال په وخت کې احلیل ته خپل مایعات افرازوي. څرنگه چې پروستات ، Seminal Vesicles او د Ductus Deferens افرازات په احلیل کې د انزال په وخت کې سره گډیږي نو انزالیدونکې (خارجیدونکې) منوي مایع څر (Gray) رنگ غوره کوي.

۳ : Bulbo Urethral Glands - دا غدې د Cowper's gland په نوم هم یادېږي ، د نخود په اندازه دوه غده دي ، د Membranous احلیل شاته قرار لري . دا غدوات یوه روښانه چسپناکه ماده د Mucous په نوم افرازوي. د Mucous په نوم د جماع (Intercorse) په وخت کې احلیل ته افرازوي چې د جماع په وخت کې د Glans penis دښوي والي سبب ګرځي.

- Penis یا قضیب : د نارینه تناسلي اله ده چې د شرمگاه ساحې په قدامي قسمت کې موقعیت لري ، د قضیب په لاندینې برخ کې احلیل سیر لري او قضیب په Glans Penis کې یې خوله خلاصیږي.



۲ - ۳ انځور: د نارینه تناسلي سیستم داخلي او خارجي غړي.

درېم څپرکی

د جنسي حجرو جوړیدل (Gametogenesis)

د انسان تکامل یوه دوامداره پروسه ده چې د القاح څخه شروع کوي او تر مړینې پورې دوام کوي، القاح د نارینه او ښځینه گمیتونو (سپرم او تخمې) یو ځای کیدو سره صورت نیسي او زایگوټ جوړوي. گمیتونه چې د انسان جنسي یا تخمي حجرات دي د (PGCs) Primordial Germ Cells څخه منځته راځي.

لمړني تخمي حجرات PGCs بلل کېږي چې په دوهمه هفته کې د رشیم له Epiblast طبقې نه جوړېږي. او د رشیم او جنین په جنسي غدو (Gonads) کې ځای په ځای کېږي. دا PGCs په نارینه و کې Spermatogonia او په ښځینه و کې Oogonia بلل کېږي. لمړني تخمي حجرات د القاح کولو قابلیت نه لري، ددې لپاره چې د القاح وړتیا ومومي معمولا وروسته د بلوغ څخه یوه سلسله تغیراتو لاندې راځي چې ددې تغیراتو په نتیجه کې یې د کروموزومونو تعداد نیمایي کېږي او هم یې په شکل او اندازو کې تغیرات رامنځته کېږي. او پدې شکل سره د القاح وړتیا مومي، دا ډول تغیرات په په لمړني تخمي حجراتو کې Gametogenesis بلل کېږي. په گمیتوجینیزیس کې معمولا لاندې دوه پروسې شاملې دي.

۱ - مایوزیس (تنقیصي حجروي ویش) او

۲ - Cytodifferentiation (جنسي حجراتو شکل او اندازو کې بدلون) پروسې شاملې دي.

نو ویلای شو چې Gametogenesis د تغیراتو هغه لړۍ ده چې جنسي حجرات (گمیتونه) له لمړني حالت څخه (چې Diploid کروموزومونه لري) دوهمي یا پوښ حالت ته (چې Haploid کروموزومونه لري) تغیر کوي. د جنسي حجرو جوړیدل په نارینه و کې د Spermatogenesis او ښځینه و کې د Oogenesis په ډول تر سره کېږي چې په لاندې ډول واضح شوي دي.

۱ – Spermatogenesis یا سپرمونو جوړیدل

نوموړې عمل دنارینه حصیو په Seminiferous Tubules کې صورت نیسي. هغه تکاملي عملیه ده چې د هغې په نتیجه کې یوشمیر لمړني Diploid حجرات د Spermatogonia په نوم چې د منوي قناتونو په Germinative Epithelium قاعدوي برخه کې قرار لري په یوشمیر هاپلوید حجراتو باندې د سپرماتوزوا په نوم بدلېږي او منوي قناتونو جوف ته ازادیږي.

Spermatogenesis په نارینه و کې په بلوغت (Puberty) کې شروع کوي او عمر تر اخره دوام مومي (موثر Spermatogenesis معمولا د ۶۰ یا ۷۰ کلنې پورې وي). Spermatogenesis په درېو مرحلو کې تر سره کیږي چې په لاندې ډول دي.

الف : Spermatocytosis : دا د مایټوزیس تقسیماتو لړۍ دی چې لمړني سپرماتوګونیا و تعداد زیاتوي. په منظم ډول Spermatogonial Stem Cell د Seminiferous Tubules منځته حرکت کوي او تقسیمات کوي او Spermatogonia Type-A جوړوي چې دا په خپل وار سره مایټوزیس کوي په Spermatogonia Type-B بدلېږي دا هم د مایټوزیس پواسطه تقسیمېږي او بلاخره په Primary Spermatocytes تغیر کوي . پدې مرحله کې اولنیو سپرمونو تعداد زیاتیږي .

ب – Meiosis: پدې کې دوه خجروي تقسیمونه تر سره کیږي.

۱- په لمړني تنقیصی ویش کې Primary Spermatocyte اوږد Prophase (۲۲ ورځې) ته داخلېږي په تعقیب یې لمړنی مایوزیس په تیزې سره تکمیلوي او په دوه secondary spermatocytes چې د کروموزومونو تعداد یې نیمایي وي (۲۲+X and ۲۲+Y) بدلېږي.

۲- په دوهمې تنقیصی ویش کې Secondary spermatocytes په Haploid Spermatid بدلېږي.

ج - Spermiogenesis (Spermateleosis): دا هغه پروسه ده چې گرد Spermatid ورو ورو د شکل بدلون سره په سپرماتوزوا تغیر کوي ، دې پروسه کې په Spermatid کې لاندې بدلونونه منځ ته راځي. (۲ – ۴ انځور کې ښودل شويدي)


۱ - Acrosome جوړیدل : داسې چې گلجي باډي د سپرم سر دریمه برخه پوښي او هغه انزایمونه په ځان کې لري چې د تخمې کرونا حجراتو څخه سپرم تیریدلو باعث گرځي .

۲ - هسته ضخیمه کیږي . ۳ - د سپرم غاړه ۴ - سپرم لکي (منځنې ، اساسي او اخیرنی برخې) جوړیږي . ۴ - د سپرم سایتوپلازم اضافي برخه د Residual Bodies په شکل جدا کیږي او د Sertoli Cells پواسطه له منځه ځي .


Spermatogenesis عملیه د نخامیه غدې د LH (Luteinizing Hormone) او (FSH Follicle Stimulating Hormone) هارمونونو پواسطه کنټرولېږي ، داسې چې LH پواسطه Lyedig's Cell تنبه کیږي او لدې حجراتو څخه د Testosterone هارمون افراز زیاتوي چې نوموړی هارمون په Sertoli cells کې اندروجینیک اخذو سره یو ځای کیږي او په Spermatogonia کې د Spermatogenesis عملیه تنبه کوي . FSH . هارمون په Sertoli Cells باندې تاثیر کوي او د Testicular Fluid او داخل الحجروي اندروجن Receptor protein جوړیدل زیاتوي .

سپرماتوجنیزیس عملیه د Spermatogonia څخه تر Spermatozoa پورې ۶۴ - ۷۲ ورځو کې ترسره کیږي ، اوپه کاهل نارینه کې نژدې ۳۰۰ میلیونه سپرمونه هر ورځ جوړیږي .

په Seminiferous Tubules کې جوړ شوي سپرماتوزوا کم متحرک دي ددې تیوبولونو جدار ملسا عضلاتو تقلص پواسطه نوموړي سپرمونه Epididymis ته داخلېږي او هلته د پوره حرکت وړتیا پیدا کوي (Maturation) کوي .



۲- ۴ انځور: د Spermatogenesis مختلفې مرحلې ښايي.



۲- ۵ انځور : د سپرماتید بدلید ل په سپرماتوزو

۲- د تخمې جوړیدل (Oogenesis)

PGCs څخه په ښځینه و کې Oogonia جوړېږي او تخمدانونو کارټکس برخو کې ځای په ځای کیږي. د سپرماتوژنیزیس برخلاف اووژنیزیس مخکې له ولادت څخه شروع کوي، داسې چې مایټوزیس مرحله یې مخکې له ولادت څخه شروع کیږي او ترولادته پورې تکمیلېږي. په همدې وخت کې د اووګونیا ځینې حجرات غټېږي او مایوزیس ویش ته داخلېږي چې Primary Oocytes بلل کیږي.

هر Primary Oocyte په جداګانه ډول تخمدان د قشر د سطحې اپیتیل هموارو حجراتو (Follicular Cells) پواسطه پوښل کیږي چې د همدې هموارو حجراتو پواسطه لمړنۍ مایوزیس توقف کوي. Primary Oocytes د فولیکولر حجراتو سره یوځای Primordial Ovarian Follicles بلل کیږي یعنې په تخمدانونو کې ټولې تخمې د Primordial Ovarian Follicles په شکل بدلېږي (مخکې د ولادت څخه پدې شکل بدلېږي او همدا یې ذخیروي شکل دي). Primordial Ovarian Follicles تعداد د ولادت په وخت کې ۶۰۰۰۰ - ۸۰۰۰۰ وي، د ماشومتوب په دوره کې یې زیات تعداد استحاله کوي او له منځه ځي، د بلوغ تر وخته په دواړو تخمدانونو کې تر ۴۰۰۰۰ پورې پاتې کیږي، چې لدې جملې څخه یې د ښځو په تولد او

تناسل دوره کې (۱۵ کلنې څخه تر ۵۰ کلنۍ پورې) نژدې ۵۰۰ تخمې ازادیږي، او نورې ټولې یې له منځه ځي.

د تخمې پخیدل: (Maturation of Oocytes)

په ښځو کې تخمې پخیدل بلوغت کې شروع کوي او تر مینو فاز پورې دوام کوي . ولادت ته نژدې ټول Primary Oocytes د مایوزیس فروفیز په Diplotene مرحله کې ولاړې وي او میتافیز مرحلې ته نه داخلېږي وروسته د بلوغت څخه د ښځو په تخمدانونو کې هر میاشت له موجوده Primordial Ovarian Follicles څخه ۵ - ۲۰ پورې پوځوالي سلسلې ته داخلېږي چې لدې جملې څخه یوازې یوه تخمه د پخیدو اخري مرحلې پورې رسېږي او ازادیږي او پاتې ۴ - ۱۹ پورې له منځه ځي . د Primordial Ovarian Follicles دواړه برخې یعنې Follicular Cells حجرات او Primary Oocyte په یو وخت کې تکامل کوي چې په لاندې ډول د هرې برخې تکامل په جدا ډول تشریح شوی دی .

الف - Primary Oocyte تکامل : Primary oocyte خپل لمړی تنقیص ویش تکمیلوي چې په دوه نامساوي حجراتو ویشل کېږي ، هره یوه ۲۳ هاپلوید کروموزومونه لري ، غټه حجره چې د سیتوپلازم زیاته برخه تر لاسه کوي Secondary Oocyte په نوم او کوچنۍ حجره یې First Polar Body په نوم یادېږي . سمدستي Secondary Oocyte دوهم تنقیص ویش شروع کوي او تر Metaphase مرحلې پورې وړاندې ځي، چې په همدې شکل تخمه Uterine tube ته له تخمدان څخه ازادیږي که چیرته سپرم سره یوځای شوه او القاح ته داخله شوه خپل دوهم تنقیص ویش تکمیلوي ، او Secondary Oocyte په دوه نامساوي حجراتو Second Polar Body او Definitive Ovum باندې بدلیږي .

که ازاده شوې تخمه القاح نشي Secondary Oocyte دوهم تنقیص ویش نه بشپړوي او تخمه له ازادیدو وروسته ۲۴ — ۴۸ ساعتونو کې استحاله کوي ، له منځه ځي او په Definitive Ovum نه بدلیږي .

ب - د فولیکلر حجراتو تکامل : د فولیکولر حجراتو تکامل په درې مرحلو کې صورت

نیسي


۱ - Primary or Preantral stage: پدې مرحله کې Primordial Follicles په Primary Ovarian Follicle تغیرکوي داسې چې Primordial Ovarian Follicle گرد چاپیره هموار فولیکولر حجرات تکرر کوي او په Columnar حجراتو بدلیږي ، چې ددې بدلون واضح سبب معلوم ندی .

۲ - Antral or Secondary stage (Vesicular or Graafian) : دا تر ټولو اوږده مرحله ده ، او دنخامیه غدې FSH هارمون تر تاثیر لاندې ترسره کیږي. فولیکولر حجرات تکررکوي ، خو طبقې جوړوي چې هره طبقه یې Membranous Granulosa او حجرات یې Granulosa Cells بلل کیږي. همدارنگه د گرانولوزا حجراتو ترمنځ جوف منځته راځي او هم د تخمې او گرانولوزا حجراتو ترمنځ متاجنسه گلايکوپروتیني پرده د Zona Pellucida په نوم جوړیږي.

د گرانولوزا حجرات گرد چاپیره د باندې نه د تخمدان منضم نسج (Stromal Cells) پواسطه پوښل کیږي او د Theca Folliculi په نوم پوښ جوړوي. د فولیکل غټیدو سره Theca Cells هم په داخلي افرازي طبقې (Theca interna) او بیرونی فایبروزي طبقې (Theca Externa) (په شکل تنظیمیږي . پدې مرحله کې په زیاته اندازه استروجن هارمون له داخلي افرازي طبقې څخه جوړیږي.

۳ - Pre ovulatory stage : Pre ovulatory stage . ۳۷ ساعته مخکې د Ovulation څخه شروع کیږي. د فولیکل په پخیدو سره د استروجن هارمون افراز زیاتیږي چې ددې هارمون زیاتوالی د برعکس FSH سويه کموي او د LH سويې زیاتوالی سبب گرځي.

کله چې Secondary Follicle پوښ شي د LH surge (Luteinizing Hormone) پواسطه Pre ovulatory Growth phase تنبه کیږي داسې چې تخمه خپل لمړنی مایوزیس تقسیم تکمیلوي . همدارنگه درې ساعته مخکې د Ovulation څخه دوهم مایوزیس شروع کوي او میتافیزمرحلې ته رسیږي.



۲ - ۶ انځور : فولیکل په مختلفو مرحلو کې ښودل شوی دی.

د تخمې ازادیدل یا Ovulation

د تخمدان له Graafian follicle څخه د تخمې (Secondary Oocyte) ازادیدل له Ovulation څخه عبارت دی.


د تخمې ازادیدو څخه لږ وړاندې په وینه کې د LH (Luteinizing Hormone) غلظت ډیر لوړیږي چې LH surge بلل کیږي. د LH انزایم فعالیت زیاتوي چې د فولیکل گرد چاپیره دکولاجن فایبرونو هضم لامل ګرځي همدارنګه په ځایي ډول د Prostaglandin کچه لوړوي چې د تخمدان په جدار کې دملساعضلا توتقلصاتوباعث ګرځي. دپورته ټولو فکتورونو په نتیجه کې Graafian Ovarian Follicles ماتېږي او تخمه Uterine Tube ته ازادیږي. ۲ - ۷ انځور

ازاده شوې تخمه چې Secondary Oocyte ده ۱۲۰ میکرومتره قطرلري، هستوي غشاء نلري، د Zona Pellucida پواسطه پوښل شوې او ددې پوښ گرد چاپیره Corona Radiata حجرې قرارلري. خجروي غشاء (Vitelline membrane) او Zona Pellucida ترمنځ یوه واضح Peri Vitelline Space قرار لري.

زیر جسم (Corpus Luteum) :

کله چې Graafian Ovarian Follicle وچوي او تخمه ورڅخه ازاده شي، فولیکل جدار غونجیږي، د LH پواسطه یې حجرات په چټکۍ سره غټیږي او په سایتوپلازم کې یې زیر صباغ

(Pigment) ځای په ځای کیږي ، چې دې Pigment لرونکي حجراتو ته Luteal Cells او فولیکل ته یې Corpus Luteum (Yellow Body) ویل کیږي . د زیر جسم اساسي دنده د پروجسترون ازادول دي مگر یو څه استروجن هم افرازوي .



۲- ۷ انځور : تخمې ازادیدل او زیر جسم ښودل شویږي.

Reproductive Cycle

د ښځینه و د ماشوم راوړلو عمر معمولا د ۱۵- ۵۰ کلنو ترمنځ دی چې د ښځینه و د عمر دغه برخه Reproductive period بلل کیږي. د ښځینه و Reproductive period کې په تناسلي سیستم کې د ماشوم د راوړلو په منظور په نارمل ډول هره میاشت په منظم ډول یوه سلسله تغیرات رامنځته کیږي ، چې دا ډول دوراني تغیرات Reproductive cycle بلل کیږي . دا دوراني تغیرات په دوه ډوله دي چې به لاندې ډول توضیح شویږي.

الف - Ovarian Cycle - او هارمونونه:

Ovarian Cycle د تغیراتو هغه لړۍ چې د ښځوبلوغ سن ته په رسیدو سره هره میاشت په تخمدانونو کې د Ovarian Follicle په پخیدو شروع کیږي اود زیرجسم استحالي (Degeneration) سره پای ته رسیږي . دا سایکل په درې مرحلو کې تر سره کیږي.

۱- Follicular or Pre Ovulatory Phase : د تخمدان سایکل اوله نیمایي مرحله

ده چې پدې مرحله کې د نخامیه غدې د (FSH (Follicle Stimulating Hormone تاثیر لاندې Primary Follicle په Graafian Follicle بدلیږي او هم د Follicula څخه استروجن

هارمون افراز باعث گرځي چې د رحم په اندومیتريوم باندې Proliferative (ترمیمونکي) تاثیرات لري. د تخمدان سایکل دا دوره د وخته له نظره ثابته نده.

۲ — **Ovulation Phase** : د Ovarian Cycle په منځ کې یعنې تر څوارلسمې ورځې د Graafian Follicle او تخمدان جدار څیري کیږي او تخمه Uterine Tube ته ازادیږي چې همدې عمل ته Ovulation وایي.

۳ — **Luteal Phase or Post Ovulatory** : د تخمدان سایکل دوهمه نیمایي برخه ده چې د تخمې ازادیدو نه وروسته د Graafian Follicle پاتې برخې د نخامیه غدې (LH) Luteinizing Hormone تر تاثیر لاندې په زیر جسم (Corpus Luteum) تغیر کوي چې دې زیر جسم څخه په زیاته اندازه پروجسترون او کمه اندازه استروجن هارمونونه افرازیږي ، پروجسترون هارمون د رحم په اندومیتريوم افرازي تاثیر لري. د تخمدان سایکل دا مرحله د وخت له نظره ثابته ده یعنې ۱۴ ورځې دوام کوي. په هغه صورت کې چې ازاده شوې تخمه القاح نشي نوموړې دوره (Luteal Phase) ۱۴ ورځې دوام کوي او Corpus Luteum په Corpus Albican بدلیږي. دې ډول زیرجسم ته Menstrual Corpus Luteum وایي.

که ازاده شوې تخمه القاح شي Corpus Luteum د HCG هارمون تاثیر لاندې تر درې یا څلورو میاشتو پورې پاتې کیږي پدې صورت کې Luteal Phase هم درې یا څلور میاشتې دوام کوي او پدې وخت کې زیر جسم د Pregnancy Corpus Luteum په نوم یادېږي.

ب - تحیضي سایکل (Menstrual or Uterine Cycle) :

د تغیراتو هغه لړۍ چې په ښځوکې د بلوغت د دورې (Puberty Period) څخه وروسته د تخمدان سایکل تغیراتو سره یوځای په هره میاشت کې د رحم په اندومیتريوم کې صورت نیسي د Menstrual Cycle څخه عبارت دي Reproductive Period. د ښځود ژوند هغه دوره ده چې د ماشومانو تولد او تناسل پکې ترسره کولی شي. ددې دورې څرگنده خاصه (ځانگړنه) د مهبل څخه د وینې میاشتنی جریان (Menses) څخه عبارت دی ، په ښځو کې تحيض یا میاشتنۍ وینه بهیدنه لمړې په ۱۵ - ۱۲ کلنۍ شاوخوا کې شروع کوي ، لمړنۍ Menses ته Menarche وایي. دغه میاشتنۍ وینه بهیدنه (تحيض) ۴۵ - ۵۰ کلنۍ شاوخوا کې ودریږي چې دغه وخت Menopause څخه عبارت دی.

Menstrual Cycle په منځني ډول په هرو ۲۸ ورځو کې د Ovarian Cycle هارمونونو تر تاثیر لاندې صورت نیسي . Menstrual Cycle . لاندې درې مرحلې لري .

۱- Menstrual Phase or Menses (د حیض دوره) :


دې مرحلې ته Bleeding Phase هم وايي ، Menstrual cycle . د وينې بهیدو له اولې ورځې نه شروع کوي . لمړنې وینه لرونکې مرحله چې په منځنۍ ډول ۳ - ۵ ورځې دوام کوي د حیض یا Menses څخه عبارت دی . د تحيضي سایکل د ختمیدو نه ۲۴ ساعته وړاندې په وینه کې ناڅاپي ډول د استروجن او پروجسترون هارمونونو په سويه کې د پام وړ کموالی منځته راځي چې په اندوميټريوم کې د یوشمیر بدلونونو باعث گرځي داسې چې ددې هارمونونو نشتوالی د اندوميټريوم برخې Spiral Arteries شدید سپزم رامنځته کوي (په موضعي ډول د لیکوټرين او پروستاگلانډین زیاتیدل) ، د اندوميټريوم وظیفوي طبقه د اسکمیا له امله تخریبیږي اوله منځه ځي . په هر Menses کې ۳۰ - ۸۰ سي سي پورې وینه ضایع کیږي ، تحيضي وینه لرونکې مایع د Endometrial debris څخه تشکیل شوې . تحيضي وینه د رحم په جوف کې علقه کوي خو ډیر زر د اندوميټریل ډیبرس کې موجوده فایبرینولایسین پواسطه بیرته ماتېږي ، چې د مهبل څخه د خارجیدو نه وروسته دوباره نه علقه کیږي .

۲- Proliferative Phase یا ترمیمونکې مرحله .

د تحيضي سایکل دا مرحله د Pre Ovulatory Phase په نوم هم یادېږي د حیض (Menses) وینې ودریدو په تعقیب شروع کوي یعنې د Menstrual cycle له شپږمې ورځې څخه تر ۱۴ مې ورځې پورې دوام کوي . دا مرحله د Ovarian cycle له Follicular Phase سره په یو وخت کې صورت نیسي چې د تخمدان فولیکل پواسطه ازادیدونکي استروجن هورمون تر تاثیر لاندې په رحم کې ترمیمونکي تغیرات منځته راوړي .

۳- Secretory Phase یا افرازي مرحله :

دا مرحله د Post Ovulatory Phase په نوم هم یادېږي ځکه چې د تخمدان Ovarian cycle د Luteal Phase سره په یو وخت کې صورت نیسي . نوموړي مرحله د تحيضي سایکل له ۱۵ مې ورځې څخه تر ۲۸ مې ورځې پورې دوام کوي . د Corpus Luteum پواسطه پروجسترون او استروجن هارمونونه درحم په اندیومیټريوم باندې Secretory تاثیرات لري .



۲ - ۸ انځور Ovarian Cycle : او Menstrual Cycle او د هغوي تغيرات ښودل

شویدی

کلینیکي تړاو (Clinical Correlation) :

الف : د جنسي حجراتو د جوړیدو گډوډې یا سو تشکلات :

۱- د جنسي حجراتو د بڼې یا شکل سو تشکل : سپرمونه کیدای شي چې ډیر اوږده یا ډیر وړ (لنډ) وي، سپرم کیدای شي چې دوه جسمونه ، دوه سرونه یا دوه لکۍ ولري . تخمه ممکن لویه هسته یا دوه هستې ولري په یو فولیکل کیدای شي دوه تخمې وي .

۲ — د کروموزومونو گډوډې : جنسي حجرې کیدای شي چې د کروموزومونو جوړښت او اندازې له مخې غیر نورمال وي .

A — د لمړني تنقيصي ویش د Anaphase دوران کې یوه جوړه کروموزومونه د جداکیدو مرحله کې ممکن جدا نشي دواړه یو قطب ته لاړشي چې non-disjunction بلل کیږي. دا ډول گامېټ د ۲۳ کروموزومونو په ځای ۲۴ کروموزومونه لري. خو non-disjunction کروموزومونه ممکن په دوهم تنقيصي ویش کې منځته راشي.

که القاح داسې جنسي حجرې پواسطه رامنځته شي نو زایگوت به ۴۷ کروموزومونه ولري چې دیوې نورمالې جوړې په ځای به درې مشابه کروموزومونه ولري. دې حالت ته Trisomy وایي د دغه اضافي کروموزوم په وجه بېلابېلې گډوډې رامنځته کیږي. چې مثالونه یې په لاندې ډول دي.

I — د ۲۱ کروموزوم Trisomy چې د Mongolism یا Down's syndrome په نوم گډوډي منځته راوړي چې اخته ماشوم پراخه مخ، مایل epicanthus، palpebral fissures، کرښه لرونکې ښکتنۍ شونډه او پراخه یوې عرضاني گونځې لرونکي لاسونه لري همدارنگه دا ماشومان معمولا دماغو وروستی والی یا تاخر او زړه انومالی گانې لري.

II — د X یا Y کروموزومونو اضافي شتون ډول ډول سندرومونه منځته راوړلی شي چې د جنسي غړو تکامل اېنارملتي، دماغي تاخړاو غیرنورمالې ودې سره یوځای وي. ځینې یې پدې ډول دي.

a — XXX سندروم (اېنارمل ښځه): چې ځینې وخت ورته super females هم وایي خو Supper ورته یوازې د جنسي کروموزوم د زیاتوالي له وجې ویل کیږي، ددوي جنسي غړي ښه انکشاف نه کوي (infertile) وي تحیض یې کم او دماغي تاخړ لري.

b — XXY سندروم چې اېنارمل سړی چې Klinefelter's syndrome یا نرښځی هم بلل کیږي. په Klinefelter's syndrome اخته شخص نارینه وي خو خصیي (Testis) ښه تکامل نه کوي، عقیم (Infertility) وي او Gynecomastia (د ټیډو غټیدل) پکې موجوده وي.

په ټرایزومي کې ممکن له یوې جوړې څخه زیات کروموزومونه اغیزمن شي یعنې د یوې جوړې کروموزومونو په ځای ممکن له دریو زیات کروموزومونه موجودوي چې پدې ډول اخته کسانو کې ممکن XXXY، XXXXY، XXYY، XXXX ولري.

B — کله چې د یوې جنسي جوړې دواړه کروموزومونه په خجروي تقسیم کې یوې حجرې ته لاړشي (لکه مخکې چې تشریح شو) بله جنسي حجره په د ۲۳ کروموزومونو په ځای به ۲۲ کروموزومونه ولري . د ۲۲ کروموزومونو لرونکې جنسي حجرې پواسطه رامنځته شوی زایګوټ به یوازې ۴۵ کروموزومونه ولري . د یوې جوړې کروموزومونو په ځای به یوازې یو کروموزوم ولري چې دې حالت ته Monosomy وایي. دې ډول انومالي ښه پیژندل شوی مثال Turner's سندروم دی چې ښځه پکې یوازې یو X کروموزوم لري ، اخته کس تل ښځه وي ځکه چې Y کروموزوم نلري . انومالي یې عبارت دي له تخمدانونه نشتوالی ، دماغي تاخر ، اسکلیټي ګډوډې ، دغاړې په برخه کې د پوستکي ګونځي (Webbed neck) ، لنډ قد او پراخه سینه چې د نډیو څوکې یې سره لري وي.

۳ — د جینونو ګډوډې (د جین میټیشن) : د جین په ساختمان یا وظایفو کې تغیر د جین میوټیشن په نوم یادېږي . جینونه د جین نورمال انکشاف مسول دي خو کیدای شي چې د Gametogenesis په وخت کې د جین په ساختمان کې کوم تغیر رامنځته شي او د ولادي نقیصو سبب شي . په اوس وخت کې ډیرې ولادي نقیصې پیژندل شوي دي چې د سبب یې Gene mutation دی.

څلورم څپرکی

د انسان تکامل یا Development of the Human

د انسان تکامل یوه دوامداره پروسه ده چې د تخمې او سپرم د یو ځای کیدو (القاح) څخه شروع کیږي. انسان په تکامل کې حجروي ویش، د حجرو مهاجرت، د حجرو پروگرام شوې مړینه، تفریق پذیری، وده او د حجراتو په بیا تنظیمیدو شاملې دي چې القاح شوې تخمه (زایګوټ) په یو کثیرالحجروي انسان بدلولي. د انسان تکامل په تولد سره پای ته نه رسیږي، د تکامل مهم تغیرات د ولادت څخه وروسته صورت نیسي.

تکاملي دورې یا: Developmental Periods

د انسان تکامل په دوه برخو ویشل کیږي: Prenatal Period (مخکې د ولادت څخه) او Postnatal Period (وروسته د ولادت څخه). مهم تکاملي تغیرات چې مخکې د ولادت څخه منځته راځي په ۳ - ۱ انځور او جدول کې ښودل شوي دي. د نوموړې تقسیم اوقات څخه ښکاري چې چې پرمختللي تغیرات د رښیمي دورې دریمې نه تر اتمې هفتې دوران کې منځته راځي. په جنیني دوره کې د انساجو او غړو تفریق پذیری او وده صورت نیسي.

۱ - Prenatal Development

دا دوره د القاح د عملیې څخه شروع او د ماشوم تر تولد پورې دوام کوي. دا دوره د مور په غضویت کې تیرېږي او د رحمي ژوند په نوم هم یادېږي، نژدې ۲۶۶ ورځې دوام کوي چې د وروستني میاشتني عادت څخه حسابېږي. دا دوره لاندې مرحلې لري.

۱ - د رښیمي تکامل مرحلې: Stage of Embryonic Development

په شروع کې د رښیم تکامل په Stages یا مرحلو سره تشریح کیږي ځکه تر هغې چې واضح مارفولوجیکه منظره غوره کوي متغیرې دورې سرته رسوي. د رښیم تکامل لمرنۍ Stage


د القاح څخه شروع کېږي او په ۲۳ Stage چې د القاح څخه وروسته ۵۶ مه ورځ ده ختمیږي ، نوموړې مرحلې په (۴ - ۱ انځور) کې ښودل شويدي.

همدارنگه درشیمي مرحلې لمړۍ دوه هفتې یعنې د القاح څخه تر دوه طبقې رشیم جوړید پورې د Preorganogenesis په نوم هم یادېږي ، چې پدې مرحله کې القاح یا Fertilization او د زایګوټ تشکیل ، د زایګوټ پارچه کیدل یا Cleavage ، Murola او Blastula شکل او غرس کیدل یا Implantation شامل دي.

ددریمې هفتې شروع نه تر اتمې هفتې ختم پورې وخت Embryonic Period هم بلل کېږي . ددې دورې په ختم کې جوړ شوې موجود د انسان مشخصات پیدا کوي ، Gastrulation ، تکمیلېږي ، د رشیمي صفحو تفریق پدیري د غړو په جوړښت ، دانسجو تشکیل یا Histogenesis ، د غړو قسمي تشکیل او درشیم خارجي غشاو تشکیل صورت نیسي . د اتمې هفتې په اخر کې درشیم طول ۴۰ ملي مترو او وزن یې ۵ گرامو ته رسیږي..


۲ — Fetal Period : دا دوره د نهمې هفتې څخه شروع او د ماشوم تر تولد پورې دوام کوي ، تشکیل شوی موجود پدې دوره کې د جنین یا Fetus په نوم یادېږي . پدې دوره کې Histogenesis یا دانساجو جوړیدل دوام پیدا کوي ، Organogenesis او دسیستمونو تشکیل صورت نیسي او په اخر کې حاصل شوی موجود دیوه تکامل یافته انسان شکل ځانته غوره کوي


Eleventh Week to Full Term



۴ - ۱ انځوراو جدول : په لاندې جدول کې درشیمي تکاملي دورې تغیراتو Stages

ښودل شويدي





Post-natal Development: - ۲

د ولادت نه وروسته تکاملي دورې څخه بحث کوي. دا دوره کلونه وخت نیسي چې د ولادت څخه شروع او ترمرگ پورې دوام کوي چې لاندې مراحل لري.

1 - Infancy Period یا د شیدو خوړلو دوره : ماشوم د زیږیدو نه د لمړۍ کال تر

پایه پورې وخت د Infancy Period څخه عبارت دی. ماشوم د ژوند په لمړۍ کال کې تر ډیره یوازې د شیدو خوراک څخه خپل ضرورت پوره کوي او نشي کولای چې نورو غذايي مواد واخلي ، د ژوند په لمړیو شپږو میاشتو کې یوازې شیدې خوړلی شي او نورو غذايي مواد او خواړه نشي خوړلی ، خو په ورستیو شپږو میاشتو کې د نورو غذايي موادو خوړلو وړتیا پیدا کوي چې لمړۍ کال په اخر کې د شیدو څخه پرته نورو غذايي موادو د اخیستلو وړتیا مومي.

پدې وخت کې ماشوم د بدن وده تیزه وي ، ټول اوږدوالی یې دوه چنده زیاتېږي او وزن یې درې چنده زیاتېږي ، ډیر ماشومان د لمړۍ کال په اخر کې د شپږو نه تر اتو غاښونو درلودونکي وي.

د Infancy peroid لمړی څلور هفتو کې ماشوم نوی زیږیدلی یا نوزاد (Neonate or Newborn) بللل کیږي او دې وخت ته یې Neonatal Period وايي ، چې ولادت څخه وروسته تر ۲۸ ورځو پورې دوام کوي . د داخل الرحمي ژوند نه خارج الرحمي ژوند ته بدلون ډیرو بحراني تغیراتو ته اړتیا لري په ځانګړي ډول قلبي او تنفسي سیستمونو کې ډیر بدلونونه منځته راځي . په Neonatal period کې نوي زیږیدلي ماشومان ډیرې قوي ساتنې او حفاظت ته اړتیا لري او نورو شیدو خوړلو ماشومانو سره واضح توپیر لري په همدې وجه یې په روغتونونو کې د ساتنې او تداوي لپاره جدا وارډونه د Neonatology یا Nursury په نوم جوړ دي ، چې ډیر سهولتونه او ځانګړتیاوې لري.

۲ - Childhood یا د ماشومتوب (طفولیت) دوره : دا دوره د دوهم کال د شروع څخه تر بلوغت (Puberty Period) یا د یولسم کال ختم پورې دوام کوي یعنې د Infancy او Puberty ترمنځ دورې څخه عبارت دی . پدې دوره کې لمړني یا دشیدو غاښونه په شنه کیدو شروع کوي چې وروسته په دوهمي یا دایمي غاښونو بدلیږي . همدارنګه پدې وخت کې د هډوکو Ossification په فعال ډول تر سره کیږي . څومره چې دماشوم عمر زیاتېږي وده یې کمیږي . د تکامل دا دوره د ۱۳ میاشتې مخکې د Puberty Period پورې دوام کیږي . د ماشومتوب دوره درې مرحلې لري.

الف — Early Childhood : یا لمړنۍ د ماشومتوب : دا د دوهم کال شروع څخه څخه تر څلورکلنې ختم پورې وخت څخه عبارت دی .

ب — Pre School Childhood : دا د پنځم کال شروع څخه د شپږکلنۍ تر پای پورې دوام کوي.

ج — Late Childhood : دامرحله د اووم کال شروع څخه د یولس کلنۍ تر پای پورې دوام کوي.

۳ — Adolescence یا د ځوانۍ دوره : دا دوره د ۱۲ یا ۱۳ کلنۍ څخه شروع او د ۲۱ کلنۍ تر ختم پورې دوام کوي . یا په بل عبارت دا دوره د جنسي پوښوالي شروع کیدو څخه پیلېږي او د کاهل شخص د فزیکي ، دماغي او روحي پوښوالي پورې دوام کوي . ددې دورې په اخر کې عمومي وده کمیږي خو ځینې اعضاوې خپله وده جاري ساتي لکه ښځینه ثديې او د

نارینه و خارجي جنسي غړي. د ځوانې دورې لمړني درې کاله وخت چې ماشوم پکې د ماشومتوب نه بلوغ ته بدلیږي د Puberty period څخه عبارت دی، چې په لاندې ډول توضیح شویده.

Puberty Period یا دبلوغت دوره: پدې موده کې انسان تناسلي اعضاوې وده او انکشاف کوي او د تولد تناسل وړتیا پیدا کوي. دا دوره په نجونو کې ۱۲ نه تر ۱۵ کلنۍ پورې او په هلکانو کې ۱۳ نه تر ۱۶ کلنۍ پورې دوام کوي، ددې درې کلنو په جریان کې نجلۍ یا هلک بالغ کیږي. پدې دوره کې جنسي غړي او هم دوهمني جنسي خواص وده او تکامل کوي، او د ماشوم راوړلو یا تناسل وړتیا پیدا کوي.

● جنسي غړو وړتیا په نجونو او هلکانو کې په لاندې ډول ده

➤ په نجونو کې جنسي غړي وده او تکامل کوي او Reproductive Cycle شروع کوي، داسې چې تخمدانونو تکامل په نتیجه کې تخمې پخیدل شروع کوي (Ovarian Cycle) او د رحم تکامل په نتیجه کې اندومیتريوم وده کوي او تخیضي سایکل شروع کوي، چې د لمړنۍ حیض شروع کیدو سره (Menarche) په نجونو کې Puberty period پای ته رسیږي او نجلۍ بالغه یا Pubert بلل کیږي چې د ماشوم راوړلو وړتیا لري.

➤ په هلکانو کې جنسي غړي په ځانگړي ډول خصيې تکامل کوي او په منوي تیوبونو کې سپرمونو جوړیدلو پروسې شروع کیږي (Spermatogenesis)، چې د لمړنۍ سپرماتوزوا رامنځته کیدلو سره په هلکانو کې Puberty period پای مومي او هلک بالغ یا Pubert بلل کیږي، او د تولد او تناسل وړتیا پیدا کوي.

● دوهمني جنسي خواص (په دواړو جنسونو کې د Pubic ساحې ویښتانو شنه کیدل، د خارجي جنسي غړو وده او تکامل، په ښځو کې د ثدیو تکامل او په نارینه و کې د په مخ د ویښتانو زرغونیدل او د اواز په وصف کې بدلون) په رانېکاریدو شروع کوي او ددې خواصو په پوره کیدو پای ته رسیږي.


د ځوانې یا Adolescence دورې په لمړیو دریو کلنو کې (۱۱ او ۱۲ کلنۍ نه تر ۱۵ او ۱۶ کلنۍ پورې) جنسي غړو وده او تکامل سریع وي، خو په پاتې کلونو کې (۱۵ او ۱۶ کلنۍ نه تر

کلنۍ پورې) فزیکي، دماغي او جنسي وده او تکامل سریع کیږي او بلاخره ځوان په کاهل شخص بدلیږي.

۴- **Adulthood (Grown up)** یا دکهولت دوره: دا دوره له ۲۲ کلنۍ نه تر ۶۵ کلنۍ پورې دوام کوي. وده معمولا په Early Adulthood کې پوره کیږي، غړو پوځوالې او د هډوکو Ossification خپل اخري حد ته رسیږي تعظم او وده ۲۱-۲۶ کلنۍ په دوران کې بشپړیږي.

۷- **Senescence period** یا دزړښت دوره: دا د ۶۵ کلنۍ څخه پورته دورې ته ویل کیږي، چې پدې وخت کې د بدن زیاتره غړي اتروپي کوي فزیکي، دماغي او جنسي غړو اندازې او وظایف کمزوري کیږي او په نتیجه کې عمومي ضعیفوالی منځته راځي. د Prenatal Period وروستنی لس هفتې او د Postnatal Period لمړی څلورو هفتو پورې وخت د Perinatal Period په نوم یادېږي.

جنیني دوره او Postnatal Period په ۴ - ۳ انځور کې ښودل شويدي.



۴ - ۳ انځور د جنین او Postnatal Period تکامل په لاندې انځورونو کې ښودل

شويدي.

پنځم څپرکی

Fertilization یا القاح

د نارینه او زنانه گمیتونو یوځای کیدلو عمل ته Fertilization ویل کیږي چې په لاندې ډول یې تعریف کوو.

القاح یا Fertilization د هغه مالیکولي او حجروي پروسو څخه عبارت دی چې د سپرم او تخمې د تماس سره شروع کوي او د دواړو (سپرم او اوم) د کروموزومونو په گډیدو سره ختمیږي (کروموزومونه دزایگوت په لمړۍ ماتوټیک تقسیم په میتافیز کې سره یوځای کیږي).

• ازاده شوې تخمه د تخمدان څخه د Secondary Oocyte په شکل Uterine tube ته ازادیږي، تخمه غیر متخرکه ده، ساختمان له نظره د Zona Pellucida پوښ او Corona radiata حجراتو پواسطه پوښل شوې وي، نوموړې ازاده شوې تخمه تر دوه ورځو پورې د القاح قابلیت.

د تخمې ازادیدو په وخت کې د رحم Cervix برخې افرازات نری، علظت یې کم او لږه سلینیناکه وي، ددې افراز شوې مایع معاینه د سلاید له پاسه د Ovulation په پیژندلو کې کومک کوي.

• Semine د نارینه و جنسي اعضاو پواسطه جوړه شوې مایع ده چې په هر Ejaculation کې د قضیب له لارې زنانه و مهبل (Vagina) ته تخلیه کیږي. په هر Ejaculation کې ۲-۶ سي سي پورې Semen ازادیږي چې د جوړښت له نظره دوه برخو نه جوړه ده.

۱ - Semen ۱۰٪ برخه یې سپرمونه جوړوي چې په Uterine tube کې د تخمې د القاح لپاره لاندې شرایط باید ولري.

الف - تعداد یې ۱۲۰million/cc - ۶۰ وي.

ب - د مارفولوژي د نظره د ۷۰٪ زیات به یې نارمل وي.

ج. - ۷۰٪ څخه زیات به یې متحرک وي .

په تي لرونکو حیواناتو کې د سپرماتوزوا په ۸ - ۷ Ph او ۳۷ سانتي گریډ حرارت کې فعال او متحرک وي. پاڅه سپرمونه نارینه تناسلي سیستم خصیو په منوي قناتونو کې چې محیط یې تیزابي وي او د حرارت د رجه یې ۳۷ سانتي گریډ څخه کمه وي په غیر فعال شکل زیاد وخت لپاره پاتې کیږي.

Ejaculation څخه وروسته د سپرمونود ژوندي پاتې کیدو (Viability) او د القاح قابلیت (Fertility) په حیواناتو کې متغیر دی . د نرچرگ سپرماتوزوا د چرگانو په ځانگړو غړو کې تر څلویښتو ورځو پورې پاتې کیږي او په دوامداره توگه هگې القاح کوي . ښځینه شاتو مچې په ځانگړې غړي کې سپرماتوزوا ۲ - ۲،۵ کالو پورې په غیر فعال شکل پاتې کیږي چې د ضرورت په وخت کې فعالیږي او مونث جنسي حجرات القاح کوي. په ماخام ځکالو کې چې د مني په موسم کې سره یوځای کیږي ماخام ځکالي د ژمي په خوب ویده کیږي او سپرماتوزوا په غیرفعال شکل ساتي او د پسرلي په موسم کې ښځینه گمیتونه القاح کوي.

په انسانانو کې سپرومونه د ښځو تناسلي سیستم کې په ځانگړي ډول د رحم Cervix برخې په فولیونو کې ترڅلورو ورځو پورې پاتې کیږي چې په څلورمه ورځ هم د القاح کولو وړتیا لري.

۲ - ۹۰٪ یې Seminal vesicle او پروستات پواسطه افراز شوې مایع ده، چې مایع برخه یې مختلف مواد لري لکه فرکتوز ، Vasculase ، پروستاگلاندین ، پروتینونه او داسې نور کوم چې د ښځو په تناسلي سیستم کې د سپرمونو فعالیت لپاره مناسب محیط برابروي .

د القاح مرحلې (Phases of Fertilization) :

د القاح عمل په درې مرحلو کې صورت نیسي چې په لاندې ډول دي.

لمړی د Corona radiate نه د تیریدو مرحله:

په نارمل ډول د یوکاھل شخص د یو Ejaculation یواسطه ازاد شوي Semine کې ۲۰۰

۵۰۰ میلیونه سپرمونه موجود وي. Semen مایع دقضب د لارې د زنانه و د مهبل په Post

Fornix کې تخلیه کیږي ، سپرمونه چې متحرک دي د رحم Cervix له لارې لمړی رحم او بیا

Uterine tube امپولا برخې ته رسیږي (لمړني سپرمونه په پنځه دقیقو کې امپولا برخې ته

رسیرې خو دا سپرمونه د القاح قابلیت نلري (. مخکې لدې چې سپرم د Corona radiate څخه تیر شي لمړی باید د تیریدلو وړتیا پیدا کړي چې نوموړی عمل په لاندې ډول توضیح شوی دی .

Capacitation : په Semen مایع کې موجوده سپرمونه ددې مایع د گلایکو پروتینونو پواسطه پوښل شويدي چې د Ovum له Corona radiate څخه د تیریدو وړتیا نلري، دا گلایکوپروتینونه د رحم او Uterine tube افرازاتو پواسطه د سپرمونو له سر څخه وینځل کیږي او د Corona radiate څخه د تیریدو قابلیت پیدا کوي چې د سپرمونو دې عمل ته Capacitation وایې دا عمل اوه ساعته وخت نیسي.

دوهمه د Zona Pellucida نه د تیریدو مرحله :

Zona Pellucida څخه ظرفیت لرونکی سپرم د اکروزوم عکس العمل په نتیجه کې تیرېږي .

Acrosome reaction : کله چې سپرم د Uterine tube امپولا برخې ته ورسیري د Zona pellucid له Receptor side سره تماس په نتیجه کې نوموړی Reaction منځته راځي داسې چې . اکروزوم د سپرم حجروي غشا سره په نقطوي شکل سره نژدې کیږي او د اکروزوم او حجروي غشا ترمنځ متعدد سوري منځته راځي ، ددې سوريو لا رې د سپرم د سر برخې نه یو تعداد انزایمونه (Trypsin like substances ، Acrosame او Hyaluronidase) ازادیږي او زونا پرده په نقطوي شکل د تماس په نقطه کې تخریبوي چې په نتیجه کې سپرم د زونا پردې څخه تیرېږي او د Ovum حجروي غشا ته رسیري .

دریمه د سپرم او تخمې د حجروي غشاو او د کروموزومونو دیوځای کیدو مرحله:


د سپرم او تخمې حجروي غشاو دیوځای کیدو په نتیجه کې په تخمه کې Zona reaction تنبه کوي چې د سپرم داخلیدو ته زمینه برابروي او هم تخمې دوهم تنقیصي ویش تکمیلوي .

الف - Zona Reaction : د تخمې د حجروي غشا سره د سپرم د راس برخې تماس په تخمه کې یو تعداد تغیرات منځته راوړي داسې چې د تخمې په سائتوپلازم کې موجوده Cortical granules چې د تخمې له جدار سره نژدې قرار لري او لایوزوم انزایمونه لري د تخمې

حجروي غشا سره یوځای کیږي او د زونا متاجنسي غشا په طرف نوموړي انیزایمونه تخلیه کوي چې دا انیزایمونه د زونا پردې په ساختمان کې داسې بدلون منځته راوړي چې د نورو سپرمونو داخلیدو څخه مخنیوی کوي یعنې سپرمونو لپاره Receptor site بلاک کوي. همدارنګه د سپرم او تخمې حجروي غشاوې د تماس په برخه کې تخریبیږي او د دواړو سایتوپلازم یوبل سرله تماس پیدا کوي همدارنګه د دواړو حجروي غشاوې سره یوځای کیږي د سپرم د ټول محتویات د لکې Axial Filaments په شمول تخمې سایتوپلازم ته داخلېږي او د سپرم حجروي غشا باندې پاتې کیږي.

ب : د سپرم او تخمې حجروي غشاو تماس په نتیجه کې تخمه چې Secondary Oocyte ده او دوهم تنقیصي ویش یې په میتافیز کې ولاړ دی نوموړی تنقیصي ویش پوره کوي چې په نتیجه کې Secondary Oocyte په Secondary Polar body او Definitive Ovum بدلیږي. سپرمونه او Definitive Ovum دواړو کروموزومونه Haploid Number (۲۳ عدده دي) دي، هر کروموزوم یې د یو کروماتید په شکل قرار لري د هر یو ۲۳ عدده کروموزومونه د هستوي غشاپواسطه پوښل شوي وي چې Male and Female Pronucleus بلل کیږي، د Pronucleus هستوي غشاوې له منځه ځي، سینتریولونه او Spindles منځته راځي، کروموزومونه ددې Spindles په منځ کې ځای په ځای کیږي چې د هر کروموزوم کروماتیدونه ددې Spindles پواسطه جدا کیږي (پدې وخت کې دا حجره ۴۶ یا Diploid Numbers کروموزومونه لري).

تر دې وخته پوري تغیرات د Fertilization څخه عبارت دي، رامنځته شوې حجره له زایګوټ څخه عبارت ده.



۵- ۱ انځور : په لاندې انځور کې د القاح مختلفې مرحلې ښودل شويدي.

Zona pellucida وظايف :

Zona Pellucida یو گلايکو پروټيني ساختمان دی چې Ovum يې پوښلی دی او لاندې وظايف لري.

۱- دا پوښ د سپرم د Acrosomal reaction مسول دی چې Ovum ته سپرم داخلیدو کې مرسته کوي.

۲- Zona Pellucida په خپل جوړښت کې د انسان سپرم لپاره Receptor لري یوازې د انسان سپرم ته اجازه ورکوي چې له Ovum سره یوځای شي.

۳- Zona reaction د Zona Pellucida باعث گرځي پدې ډول سره Ovum د نورو سپرمونو داخلیدو څخه مخنیوي کوي.

۴- Zona Pellucida پواسطه د Blastomeric حجرات یو ځای ساتل کېږي . د Morola خارجي طبقې حجرات (Trophoblast) د تیوب او رحم ایپیتیلیم حجراتو سره د یو ځای کیدو ډیر میلان لري ترڅو خپل غذايي ضرورت پوره کړي دغه میلان دوه ناخالو) بدو عواقبو)

باعث گرځي یو هم د Marulla او Blastocyst د بې ځایه غرس کیدو باعث کیږي او بل نوموړې کتله د مور د انساجو سره کامل فرق لري د مورنۍ معافیتي سیستم پواسطه له منځه وړل کیږي. Zona پوښ د پورته دواړو ناخوالو نه مخنیوی کوي پدې ډول چې Blastocyst ترهغې له غرس کیدو څخه ساتي تر څو چې د رحم خپل مناسب ځای ته نه وي رسیدلي بل یې د مور له معافیتي سیستم عکس العمل څخه هم تر هغې ساتي چې Trophoblast حجرات ددې وړتیا پیدا کړي چې د مور معافیتي سیستم د زایګوټ په مقابل کې نهې کړي.

کلینکي تړاو:

د حاملکۍ نه دمخنیوي میتودونه : (Contraceptive Methods)

الف — Barrier میتود : پدې ډول میتود کې د ښځو تناسلي سیستم پورته برخو یانې رحم او Uterine Tube ته د سپرمونو انتقال څخه مخنیوی کیږي . پدې تخنیک کې دنارینه او ښځینه کنډمونه شامل دي چې کنډمونه د ربړ نه جوړ دي او هم سپرم وژونکي کیمیاوي مواد لري نارینه و کنډم پواسطه قضیب پوښل کیږي ، د ښځینه کنډم ښځو مهبل پوښوي . همدارنګه Barrier نور میتودونه چې دښځو په مهبل کې ځای په ځای کیږي Diaphragm ، Cervical Cap او Contraceptive Sponge څخه عبارت دي.

ب — Drug Methods : داواګانې چې Contraceptive په حیث استعمالیږي تابلیتونو او انجکشنو په ډول جوړ شويدي او داستروجن او یا پروجسترون انالوګونه لري .نوموړي انالوګونه د نخامیه غدې څخه د FSH او LH هارمونونو افراز متاثره کوي کوم چې Ovarian Cycle تر سره کیدو لپاره ضروري دي .

۱ - د استروجن او پروجسترون انالوګونه چې د تابلیت په شکل جوړشويدي او دخولې دلارې استعمالیږي هرپاکټ یې ۲۸ تابلیت لري چې ۲۱ تابلیت یې د استروجن او پرجسترون انالوګ دي او ۷ تابلیت یې اوسپنه او فولیک اسیدمستحضرات لري.نوموړي تابلیتونه په پاکټ کې داسې ترتیب شويدي چې د Menses د ختم څخه وروسته د هرې ورځې تابلیت په منظم ډول معلوم شويدي Contraceptive .تابلیتونه یوازې تخمدان سایکل مختلوي او Ovulation څخه مخنیوی کوي او Menstrual Cycle په منظم ډول دوام مومي یانې میاشتني عادت پکې منظم ډول منځته راځي .

۲ - زرقی ډول د Depo-Provera چې د Progestin اجزاوې دي په پوستکي او یا په غوښه کې زرق کیږي چې زیات وخت لپاره (نژدې پنځو کالو یا ۲۳ میاشتو پورې Ovulation) نهې کوي . په زرقی میتود کې زرق شوی انالوگ تر ډیره وخت په دوران کې په لوړ غلظت سره پاتې کیږي او په دوامداره توګه د نخامیه غدې څخه FSH او LH هارمونونه نهې کوي ، په نتیجه کې Ovarian او Menstrual Cycles دواړه نهې کوي یانې پدې میتود کې میاشتنی عادت یا تحیض صورت نه نیسي .

ج — Device میتود (Intrauterine device (IUD : درحم جوف کې ایښودل کیږي . میکانیزم یې واضح معلوم ندی خو کیدای شي چې په سپرم او تخمه باندې مستقیم تاثیر ولري او یا هم زایګوټ تکامل د غرس کیدو په مرحله (Perimplantation) کې نهې کړي . د — د جراحي میتود : د جراحي پواسطه په نارینه وکې Vas Deference (Vasectomy) غوټه کول (او په زنانه وکې Uterine Tube) Tubal ligation غوټه کول (د Contraceptive موثرې طریقې دي او دواړه پروسیجرې تر ډیره بیرته ګرځیدونکي (Reversible) دي .

Infertility یا شنډتوب :

دا هغه مشکل دی چې ۱۵ تر ۳۰ فیصده جوړې ورسره مخ دي یانې دغه ښځه او خاوند ماشومان زیږولی نشي . اسبابو له وجې په دوه ډوله ده یو نارینه عقامت یا شنډتوب چې د سپرم تعداد ، حرکت او نورو نیمګړتیاو له وجې منځته راځي . نارینه د هر Ejaculation نارمل اندازه ۲ – ۶ ملي لیتره ده چې په هر ملي لیتر کې یې سل میلیونه سپرم لري . نارینه که په هر ملي لیتر کې ۲۰ میلیونه یا په مجموعي ډول ۵۰ میلیونه سپرمونه ولري Fertile یا زیږیدونکي دي که لدې نه کمیږي نو Infertile یا شنډ دي . بل ښځینه عقامت یا شنډتوب دی چې دا ډیر اسباب لري لکه Ovarian tube بندیدل (د حوصلې په التهابي ناروغیو کې) ، د سپرم په مقابل کې انټي باډي موجودیت ، د Ovulation نه موجودیت او داسې نور .

Infertile جوړه که وغواړي چې ماشوم راوړي ددې ښه طریقه Invitro fertilization (IVF) ده او ښه مثال یې Test Tube babies دی چې ددې کتاب په اخره کې توضیح شویده .

شپږم څپرکی

د لمړۍ هفتې تکاملي تغيرات

په دریمه او څلورمه ورځ درشیم تکامل:

په دریمه او څلورمه ورځ زایګوټ په مایټوټیک تقسیماتو شروع کوي او د Uterine Tube څخه رحم جوف ته انتقالیږي، چې ددریمې او څلورمې ورځې عمده تغيرات کلیواژ تقسیمات، مورولا رامنځته کیدل او رشیم د Uterine tube څخه د رحم جوف ته داخلیدلو څخه عبارت دي او په لاندې ډول تشریح کیږي.

۱ - Cleavage phase یا د زایګوټ د تقسیماتو مرحله :

د القاح نه ۳۰ ساعته وروسته القاح شوې تخمه (زایګوټ) په پرله پسې توګه د Zona Pellucida په منځ کې په مایټوټیک تقسیماتو شروع کوي چې دا تقسیمات د Cleavage په نوم یادېږي او ۵ - ۶ ورځو پورې دوام کوي. ددې تقسیماتو په نتیجه کې منځته راغلي حجرات Blastomer (سریع تقسیمیدونکي یا چاودیدونکي حجرات) بلل کیږي. رشیم په پنځمه ورځ ۵۶ او په شپږمه ورځ نژدې ۱۰۷ بلاستومیرونو درلودونکی وي. په لمړني Cleavage کې زایګوټ په دوه حجرو، دوهمي Cleavage کې په څلورو حجرو، په دریمي Cleavage کې په اته حجرو او په څلورمې Cleavage کې په شپاړس حجرو تقسیمېږي. د منځته راغلو حجراتو جسامت په تدریج سره کمیږي په همدې ترتیب زایګوټ دزونا پوښ دننه د لمړنۍ حجرې نه په کوچنیو حجراتو تقسیمېږي.

۲ - Morula :

په دریمه ورځ زایګوټ د ۱۶ حجرو درلودونکی وي او د شاتوت دانې په شان منظره غوره کوي چې ورته Morula ویل کیږي. د Morula حجرات په دوه طبقو کې ځای په ځای کیږي


چې بیرونی طبقې حجرات یې Outer cell mass او بل د منځنۍ طبقې حجرات یې Inner cell mass دي .

Inner cell mass حجرات یو بل سره ډیر نژدې تماس پیدا کوي دوې تر منځ Gap Junction تاسس کوي چې لدې لارې نوموړي حجرات خپل معلومات تبادله کوي د مرولا حجراتو دا ډول نژدې تماس Compaction بلل کیږي.

Outer cells mass ته Trophoblast هم ویل کیږي چې د په راتلونکي کې تغذي برابرولو دنده پر غاړه لري او د پلاسنتا د جوړولو دنده پر غاړه لري. Inner Cells mass ته Embryoblast هم ویل کیږي چې د رشیم او جنین جوړولو دنده لري. ویلای شو چې ټروپوبلاست وظیفه د ماشوم تر ولادت پورې ده او د امبریوبلاست دنده د انسان جوړول دي یعنې ټول انسانان د امبریوبلاست څخه جوړ دي.

القاح شوې تخمه په ورو ډول سره په عین وخت کې چې کلیواژ تقسیمات کوي د Uterine Tube پواسطه رحم ته انتقالیږي چې په څلورمه ورځ رحم ته لیږدول کیږي. زایګوټ غیر متحرک دې خو دنفیرونونو Smooth muscle د تقلصاتو، سلیاو او د هغو افرازاتو په مرسته صورت نیسي چې په نفیر کې قرار لري. پدې وخت کې رشیم دنفیروزیررنګه افرازاتو پواسطه تغذي کیږي.

پدې انځور کې زایګوټ په ترتیب سره په دوه حجروي جسم ، څلور حجروي جسم ، اته حجروي جسم ، شپاړس حجروي جسم بدلیږي چې شپاړس حجروي جسم دشاتوت ددانې منظره لري نوموړې جسم Morula بلل کیږي.




په پنځمه ، شپږمه او اوومه ورځ درشیم تکامل:

په پنځمه ورځ رحم افرازات مرولا ته داخلېږي او په منځ کې یې تجمع کوي او بلاستوسیست جوړوي ، په شپږمه ورځ زونا پوښ د منځه ځي او درحم جسم له جدارسره په تماس کې راځي او رحم اندومیتريوم په Functional layer کې په غرس کیدو شروع کوي چې نوموړې غرس کیدنه (Implantation) په دولسمه یا دیارلسمه ورځ تکمیلېږي.

۱-Blastocyst: کله چې Morula رحم ته ورسېږي د رحم افرازات د Zona Pellucida څخه Morula ته داخلېږي د Morula په منځ کې ټولېږي او د یوې کڅوړې شکل غوره کوي چې دا کڅوړه یا جوف Blastocoele او او پدې وخت کې زایگوت دې Concept ته Blastocyste وایي. . بلاستوسیست دوه ورځې یعنې د القاح په څلورمه او پنځمه ورځ په رحم کې وي ، Zona Pellucida هم لري. ددې مایع په تجمع سره Inner mass cell یوه قطب ته ټیله کیږي او د Outer mass cell سره په تماس کې پاتې کیږي چې د Blastocyst دې قطب ته embryonic pole یا Animal pole او مخالف قطب ته یې Ab-embryonic Pole ویل کیږي. Inner cell mass د امبریو یا رشیم او جنین د جوړولو دنده لري او Outer cell mass په Trophoblast حجراتو تغیر کوي ، پلاسنتیا جوړوي چې د رشیم او جنین لپاره د ضروري موادو برابرولو وظیفه په غاړه لري.

د القاح په شپږمه ورځ Zona Pellucida له منځه ځي او بلاستوسیست trophoblast طبقه د رحم جسم سره په تماس کې راځي او غرس کیدنه (Implantation) شروع کیږي.




۵-۱ انځور: د زایگوت کلیواژ ، مرولا او همدارنگه د بلاستوسیست *Embryoblast* ، *Trophoblast* او *Blastocystic cavity* ښودل شويدي..

۲ - Implantation of Blastocyst (د بلاستوسیسټ غرس کیدنه) :

رحم د اندومیتريوم په Functional layer کې د Blastocyst ننوتل له Implantation څخه عبارت دي.

د بلوغت څخه وروسته د ښځو رحم اندومیتريوم طبقه وده کوي او په درې نورو طبقو ویشل کېږي چې داخلي طبقه یا Compact layer ده چې درحم جوف سره په تماس کې ده ، Spongy layer یا منځنۍ طبقه او Basal layer یا داخلي طبقه چې درحم مایومیتريوم یا عضلي طبقې سره نښتې ده. Compact layer او Spongy layer دواړه د رحم وظیفوي یا Function layer په نوم هم یادېږي ځکه چې نوموړې طبقې په منظم ډول په هره میاشت کې تخریبېږي او بیرته دوباره د اندومیتريوم قاعدوي طبقې پواسطه ترمیمېږي. همدارنګه Menstrual Cycle په افرازي مرحله کې د زیات افرازات لري او بلاستوسیسټ په همدې مرحله کې درحم په وظیفوي طبقه کې غرس کېږي او پلاسنټا هم د همدې طبقو سره په تماس کې جوړېږي.

غرس کیدنه معمولا د رحم جسم په قدامي یا خلفي جدار کې صورت نیسي د القاح په شپږمه ورځ شروع کوي او په دولسمه ورځ تکمیلېږي. Trophoblast حجرات په سطحه کې چنګ ډوله اخځې Selection په نوم لري چې د اندومیتريوم له Mucosal cell سره نښلي په تدریجي ډول دغه مخاطي حجرات تخریبېږي او Blastocyst د اندومیتريوم وظیفوي طبقې ته داخلېږي ، گرد چاپیره د اندومیتريوم وظیفوي طبقې (Compact and spongy layer) پواسطه احاطه کېږي.



۵-۲ انځور : پدې انځور کې د القاح څخه تر بلاستوسیسټ غرس کیدو پورې
نبودل شوي دي.

کلینکي تړاو:

Preimplantation Genetic Diagnosis یا مخکې له غرس کیدو څخه جنیټیکي

تشخیص:

مخکې د غرس کیدو څخه جنیټیکي تشخیص دریمه یا څلورمه ورځ په In vitro Fertilization کې اجرا کیدای شي. ځانگړو جنیټیکي گډوډیو پیژندنې لپاره یوه یا دوه بلاستومر حجرات له رشیم څخه اخیستل کیږي، دغه حجرات مخکې لدې نه چې رشیم رحم ته انتقال شي د جنیټیک له نظره مطالعه کیږي. همدارنگه د همدې بلاستومر څخه جنس هم تغینیدلای شي.

:Abnormal Zygote

د غیر نورما زایګوټ جوړښت واضح تعداد معلوم ندې ځکه چې مخکې لدې نه چې
 ښځه پوه شي چې هغه حامله ده د القاح د دویمې نه تر دریمې هفتې پورې له منځه ځي . تر
 ۵۰٪ پورې حامله ښځو حمل د Spontaneous Abortion پواسطه له منځه ځي چې نیمايي د
 اېنارمل کروموزومونو له امله وي. دغه ډول رشیم ضیاع په طبعي ډول د ولادې نقيصو
 نیمګړتیاو کمول دي. نژدې ۲-۳ ٪ Infant ماشومان ولادې نقيصو درلودونکي وي.
 د PCR(Polymerase chain reaction) معاینه په IVF حالاتو کې د رشیم د جنټیکي
 نقيصو لپاره ترسره کېږي. رشیم نه بلاستومر اخیستل کېږي او DNA یې معاینه کوي. که
 چیرته کروموزومي نیمګړتیاوې ولري د ماشوم په پاتې کیدو یا له منځه تلو باندې تصمیم نیول
 کېږي.

اووم خپرکی

د دوهمې هفتې تکاملي تغيرات

رشیم د دوهمې هفتې تکاملي تغيرات دهرې ورځې جدا جدا توضیح کيږي چې په لاندې ډول دي.

اتمه ورځ:

په اتمه ورځ د تکامل بلاستوسیسټ په قسمي ډول د انډومیتريوم سټروما کې غرس کيږي.

د امبریوبلاست شاوخوا ټروفوبلاست حجرات په دوه طبقو ویشل کيږي .


الف : داخلي طبقه چې یو هستوي حجرات یا Mononuclear cell دي چې Cytotropoblast بلل کيږي.

ب : بله خارجي څو هستوي حجرات یا Multinucleated cell دي چې Syncytiotropoblast بلل کيږي . مایټوټیک تقسیمات په ساینټوټروفوبلاست کې صورت نیسي مگر په Syncytiotropoblast کې منځته نه راځي . نو ساینټوټروفوبلاست تقسیميږ د Syncytiotropoblast په طرف مهاجرت کوي چې د Syncytiotropoblast حجرات خپله جداگانه حجروي غشاوي دلاسه ورکوي او یو بل سره یوځای کيږي (۷ - ۱ / نځور).

Inner cell mass یا امبریوبلاست هم تفریق پذیری کوي او دوه طبقې جوړوي چې الف : یوه د کوچنیو مکعبی حجراتو طبقه ده چې د بلاستوسیسټ جوف سره وصل ده د هایپوبلاست طبقه ده . (۷ - ۱ / نځور).

ب : بله د استوانه یي حجراتو طبقه ده چې د امنیوټیک جوف سره وصل ده د اپي بلاست طبقه ده . نوموړې دواړه طبقې یو بل سره هموارېسک جوړوي . په عین وخت کې د اپي بلاست طبقې سره یو جوف منځته راځي . دغه جوف غټیږي او امنیوټیک جوف منځته راوړي . د ساینټوټروفوبلاست طبقې سره نژدې د اپي بلاست طبقې نژدې حجرات امنیوبلاست بلل کيږي


چې دواړه په شریکه امنیوتیک جوف پوښوي. د اندومیتريوم سټروما برخه چې غرس شوي رشیم ته نژدې قرار لري اذیمایي او ډیره وعایي کیږي. نوموړي غذاوات گلايکوجن او مخاط لرونکي مواد افرازوي (۷-۱/نځور).



۷-۱ انځور: د ۵.۷ ورځو بلاستوسیسټ: په قسمي ډول د اندومیتريوم په سټروما کې داخل شوی دی. تروفوبلاست یوه داخلي طبقه د یوه هستوي حجراتو او یوه خارجي طبقه چې غیرواضح څنډې لري د ساینسیشوم تروفوبلاست درلودونکې ده. امبریوبلاست د اپي بلاست او هایپوبلاست طبقې لرونکی دی. امنیوتیک جوف دیو کوچني درز په شکل ښکاري

نهمه ورځ:

بلاستوسیت په ژور ډول سره په اندومیتريوم کې غرس کیږي، د بلاستوسیسټ پواسطه سوری شوې برخه د اندومیتريوم د فایبرین کولاجن پواسطه بندېږي (۷-۲/نځور). د تروفوبلاست حجراتو کې د مشاهدې وړ تکاملي تغیرات منځته راځي خصوصاً په رشيمي قطب کې ډیر واضح وي، چیرته چې په ساینسیشوم کې واکيولونه جوړېږي، دا واکيولونه یوبل سره یوځای کیږي او لوي کڅوړې یا لکونا جوړوي، دغه مرحله د تروفوبلاست د Lacunar stage په نوم یادېږي (۱-۲/نځور).



۷-۲ انځور: نهه ورځنی بلاستوسیسټ دی. په ساینس‌پوهنه کې یې زیات تعداد لوی لکونوې ښکاري. هموارحجرات *Exocoelomic membrane* جوړوي. دوه طبقې رښیمې ټیکلې چې یوه یې د استواني حجراتو اپي بلاست طبقه او بله یې د مکعبی حجراتو هایپوبلاست طبقه ده. اندومیتريوم سطحې اصلي نقيصه چې دغرس کیدو پواسطه منځته راځي د فایبرین الیافو پواسطه تړل شوی ده.


په عین وخت امبریونیک قطب کې هموار حجرات چې د هایپوبلاست حجراتو نه منشا اخلي یوه نرې غشا د *Exocoelomic (Heuser's) Membrane* جوړوي چې د سایتوتروفوبلاست داخلي سطحه پوښوي. دا غشا د هایپوبلاست سره یوځای د *Exocoelomic cavity* یا د *Primitive yolk sac* پوښ جوړوي.

یولسمه او دولسمه ورځ:

د تکامل په یولسمه او دولسمه ورځ بلاستوسیسټ پوره ډول د اندومیتريوم په سټروما کې ننوزي، اود سطحې اپیتلیوم پواسطه اندومیتريوم سورې شوې برخه په مکمل ډول پوښل

کيږي. پدې وخت کې بلاستوسيسټ د رحم په جدار کې رحم جوف ته کمه اندازه پرسوب پيدا کوي. تروفوبلاست په Syncytium کې Lacunar space پواسطه چې په خپلو کې سره نښتې وي مشخص کيږي، دغه ډول د لکونو یوځای والی په رشيمي قطب کې ښه واضح وي. په همدې وخت کې Syncytium trophoblast اندومیتريوم ستروما کې ننوزي او د مور اندومیتريوم Capillaries (کوچني د وينې رگونه) تخریب لامل گرځي. دغه کپلريو جدار نری کيږي چې د وينې فشار په وجه پرسپري چې دا پرسیدلې کڅوړه ډوله کپلري Sinusoids بلل کيږي. د Syncytium لکونوې Sinusoids سره تماس پيدا کوي او د Sinusoids نه وينه Lacunar system ته داخلېږي. څرنگه چې تروفوبلاست حجرات په دوامداره توگه د اندومیتريوم Sinusoids تخریبوي او مورنې وينه د تروفوبلاست Lacunar system ته جريان پيدا کوي، دا جريان Uteroplacental circulation بلل کيږي.

په عين وخت کې د Cytotrophblast طبقې د داخلي سطحې او Exocoelomic cavity يا Chorionic cavity د خارجي سطحې تر منځ نوي حجرات تجمع کوي، دا حجرات د Yolk sac ديوال حجراتو نه منځته راځي، او د Extra embryonic mesoderm په نوم د منضم نسج منځته راوړي، چې دا دمنضم نسج کتله په خپل وار دوه برخو تقسیميږي، هغه برخه چې سائوتروفوبلاست او امنيون پوښوي Extra embryonic somatopleuric mesoderm دی او هغه چې د Yolk sac پوښي Extra embryonic Splanchnopleuric mesoderm دی. ددوه طبقې رشيمي ټيکلي وده نسبت تروفوبلاست ته ورو ده نو رشيمي ټيکلي ډیر کوچنی پاتې کيږي. (۰,۱ – ۰,۲mm) په همدې وخت کې چې درشيم تروفوبلاست او رشيمي ټيکلي وده کوي د رحم اندومیتريوم حجرات غټيږي او ډیره اندازه گلايکوجن او شحم پکې ځای په ځای کيږي، بين الحجروي مسافې يې هم له افرازاتو ډکيږي او اندومیتريوم نسج پرسوب پيدا کوي. دا تغيرات د Decidual reaction بلل کيږي. چې په شروع کې يوازې په غرس شوې ساحه کې منځته راځي خو ډیر زر په ټول اندومیتريوم کې صورت نیسي.



۷-۳ انځور: نژدې د دولسمې ورځې انسان بلاستوسیسټ . په امبریونیک قطب کې لکونوي د مور اندومیتريوم سټرومای له Sinusoids سره خلاص ارتباط لري *Extra embryonic mesoderm* تکثر کوي او *Exocoelomic membrane* او د تروفوبلاست ترمنځ ځای ډکوي.


دیارلسمه ورځ:

د تکامل په دیارلسمه دانډومیتريوم سطحې نقیصه چې د غرس کیدو پواسطه منځته راغلې وه جوړیږي . کله کله په همدې وخت کې د انډومیتريوم غرس شوې ځای څخه Lacunar space کې د وینې جریان زیاتولي له وجې خونریزي صورت نیسي . څرنگه چې دا وینه بهیدنه د Menstrual cycle اته ویشتمې ورځې سره نژدې منځته راځي نو کیدای شي چې د نورمال حیض یا Menstruation سره غلطه شي چې دا حالت د ولادت د ورځې تعین د غلطیدو باعث گرځي.

تروفوبلاست حجرات تکثر کوي او ساینسیشوم تروفوبلاست په طرف ګوتو په شان جوړښتونه (Villous structures) منځته راوړي چې د ساینسیشوم تروفوبلاست حجراتو پواسطه احاطه شوي وي . د تروفوبلاست حجراتو دغه ګوتو په شان ساختمانونه د ساینسیشوم تروفوبلاست سره یوځای د Primary Villi په نوم یادېږي.

په همدې وخت کې د هایپوبلاست حجراتو پواسطه نور اضافي حجرات تولیدیږي او د Exocoelomic membrane داخل طرف ته مهاجرت کوي. ددې حجراتو تکثر د Exocoelomic cavity سره یوځای نوی جوف جوړوي، دغه نوی جوف Secondary Yolk sac یا Definitive yolk sac بلل کیږي، دا Yolk sac د Primary Yolk sac په نسبت کوچنی دی. دوهیمي Yolk sac په رامنځته کیدو سره Exocoelomic Cavity کوچنی کیږي او د Exocoelomic cysts په شکل تظاهر کوي، کوم چې په کوریونیک جوف کې پیدا کیږي (۷-۴ انځور).

په همدې وخت کې Extra embryonic cavity پراخېږي او لویه د Chorionic cavity جوړوي. د Extra embryonic mesoderm هغه برخه چې د سائیتوتروفوبلاست داخلي مخ پوښوي (Extra Embryonic mesoderm Somatopleuric layer) او سائیتوتروفوبلاست په شریکه Chorionic plate بلل کیږي. Extra embryonic mesoderm دواړه صفحې یوازې د Connecting stalk (نښلونکي ډنډر) سره تماس لري. پدې نښلونکي ډنډر کې د وینې رگونو رامنځته کیدو سره امبلیکل کارډ جوړیږي (۷-۴ انځور).



۷-۴ انځور: دیارلس ورځنې د انسان بلاستوسیست. د تروفوبلاست لکونوې د بلاستوسیست په Embryonic pole او Ab Embryonic pole کې موجود وي او Utero placental circulation شروع شوی وي. Primary villi او Chorionic cavity موجود وي. Secondary Yolk sac په مکمل ډول د اندودرم پواسطه پوښل شوی وي.

Yolk Sac او اهمیت یې :

سره لدې چې زیږه کڅوړه یا Yolk Sac په انسانانو کې د موادو ذخیره کولو وظیفه نه لري خو دلاندې دلایلو په وجه یې موجودیت ضرور دی.

الف : دوهمې او دریمې هفتې په جریان کې چې د جنیني برخې پلاسنټا جریان تاسس نه وي کړی رشیم ته د غذایي موادو په انتقال کې رول لري.

ب : په لمړیو کې یې د دریمې هفتې پیل نه تر هغې چې ځیگر د وینې په جوړیدو پیل کوي ، رشیم وینه د زیږې کڅوړې پواسطه جوړیږي.

ج : د څلورمې هفتې په جریان کې د زیږې کڅوړې په شاتنې برخه کې د رشیم لمړنۍ کلمې (Intestine) په زیږه کڅوړه کې صورت نیسي.

د : لمړني تخمي حجرات (PGCs) په دریمه هفته کې د زیږې کڅوړې په جدار کې رانیکاره کیږي چې وروسته گونادونو ته انتقالیږي.

Yolk Sac د شپږمې هفتې په اخر کې له Mid Gut څخه جدا کیږي ولې په ۲٪ کاهلو کسانو کې د گیدې به داخل کې د ایلیم دایورتیکل په شکل (Meckel's Diverticulum) پاتې کیږي.

کلینکي تړاو :

Abnormal Implantation : اېنارمل غرس کیدنه ددوهمې هفتې خطا ده ځکه چې معمولاً غرس کیدنه په دوهم هفته کې صورت نیسي .

په نورمال ډول بلاستوسیست درحم جسم په خلفي یا قدامي جدار کې غرس کیږي . کله کله لدې ځایونو څخه په نورو برخو کې هم بلاستوسیست غرس کیږي.

لکه د رحم Cervix په داخلي سوري کې بلاستوسیست غرس کیدل چې Placenta previa یا Placenta bridges بلل کیږي چې دحاملگۍ په دوهمه برخه او د ولادت په وخت کې د شدید درد او د ژوند تهدیدونکې خونریزې باعث گرځي .

کله هم درحم جوف څخه د باندې غرس کیدنه صورت نیسي چې Extra Uterine or Ectopic pregnancy بلل کیږي دا د بطن جوف په هر برخه کې صورت نیولی شي لکه په تخمدان یا Uterine Tube کې، خو ۹۵٪ د Uterine tube په امپولا کې منځته راځي . په بطن

کې د رکتوم او رحم ترمنځ پریټوان کڅوړې پورې نښلي ، همدارنګه د کوچنیو کولمو په اومتیوم کې غرس کیږي ، کله کله په خپله په تخمدان کې بلاستوسیسټ غرس کیږي چې Primary Ovarian pregnancy بلل کیږي. Ectopic Pregnancy ډیری یې په دوهمه میاشت کې له منځه ځي او د شدیدې خونریزې او د گیدې درد باعث ګرځي (حاد بطن رامنځته کیدو سبب ګرځي).

Sysncytiotrophoblast حجرات HCG هارمون افرازوي ، د دوهمې هفتې په اخر کې کافي اندازې ته رسیږي چې د Radioimmunoassay پواسطه معلومیږي کوم چې د حاملګۍ په پیژندول کې کومک کوي.

د جینوم له نظره رشیم ۵۰٪ د پلار څخه وي ، نو په همدې وجه رشیم مورته بیګانه یا پردي وي چې د مور دفاعي سیستم پواسطه باید له منځه یوړل شي خو اوسني شواهد ښايي چې یوشمیر فکتورونه شته چې جنین ساتي چې پدې کې یو شمیر Immunosuppressive فکتورونه او پروتینونه شامل دي کوم چې د رشیم پواسطه جوړیږي او د مور معافیتي سیستم دځان په مقابل کې نهې کوي . که چیرته مور اتوآمیون ناروغۍ ولري لکه SLE چې پدې ناروغیو کې زیات مقدار انټي باډي ګانې جوړیږي د رشیم دا نهې کوونکي فکتورونه پدې میندو کې معافیتي سیستم نشي نهې کولی چې په نتیجه کې داسې میندو کې رشیم ردیږي او د معافیتي سیستم پواسطه له منځه وړل کیږي یعنې داسې میندې ماشوم ته وده نشي ورکولی .

اتم خپرکی

د دریمې هفتې تکاملي تغیرات

په دریمه هفته کې لاندې تکاملي تغیرات صورت نیسي .

- Gastrulation
- Notochord جوړیدل
- Neural Tube رامنځته کیدل (Neurolation)
- Allantois
- Intra Embryonic Coelum رامنځته کیدل او Intra Embryonic

Mesoderm تقسیمات

- د Tropoblasts تکامل (د Chorionic villi تکامل)
 - د زړه او رگونو لمړني شکل جوړیدل
- په دریمه هفته کې د رشمي ټیکلي (Embryonic Disc) Cephalic End چې د سر
برخې او Caudal End چې د لکې برخې نهایت واضح کیږي.

۱ – Gastrulation :


پدې هفته کې د امبریونیک ډسک دوه طبقې په درې طبقو بدلیږي چې د انسان بدن
ټولې برخې له همدې طبقو څخه منشا اخلي .

د تغیراتو هغه سلسله چې دوه طبقي امبریونیک ډسک په درې طبقي امبریونیک ډسک بدلوي د گسترولیشن څخه عبارت دی نوموړې تغیرات په لاندې ډول دي.

د اپیبلاست طبقي پورتنې برخه کې د امنیوټیک جوف په طرف خط ډوله اوږده برامدګي د امبریونیک ډسک له Caudal end نه Cephalic End په لورې منځته راځي او ددې برامدګي نهایې برخه یې گرد نوډ شکل غوره کوي ، چې خط ډوله برامدګي Primitive Streak او نهایې پراخه نوډ شکله برخه یې Primitive Node بلل کیږي. د Primitive Streak او Primitive Node منځنۍ برخې Degeneration کوي او ورلاندې هایپوبلاست طبقي پورې له منځه ځي او ددې برامدګي په منځ کې ژوروالی پیدا کوي چې دا ژوروالي په ترتیب سره Primitive groove او Primitive Pit لامل ګرځي. ددې Grove او Pit د څنډو حجراتو پواسطه Fibroblast Growth Factor-۱ جوړیږي، او ایپی بلاست طبقي په سطحه کې خپرېږي چې د اپیبلاست طبقي پورتنې برخې حجراتو Proliferation تنبه کوي او هم د ایپی بلاست حجراتو ترمنځ تماس کموالي (Detachment) سبب ګرځي چې په نتیجه کې د ایپی بلاست طبقي حجرات د Grove او Pit په طرف مهاجرت کوي او لدې لارې نوموړي حجرات ښکته هایپوبلاست طبقي په طرف حرکت کوي او د هایپوبلاست طبقي حجرات له منځه وړي او په غوض یې دا پیبلاست طبقي حجرات ځای په ځای کیږي چې د اندودرم په نوم نوې طبقه جوړوي. د اپیبلاست طبقي حجراتو مهاجرت دوام پیدا کوي چې د اندودرم له پاسه او اکتودرم لاندې یوه بله نوې طبقه د میزودرم په نوم جوړوي ، د اپیبلاست طبقي پاتې حجرات اکتودرم طبقه منځته راوړي چې پدې ډول گسترولیشن سرته رسیږي.

● Procordial Plate او Cloacal Membrane جوړیدل: اپیبلاست او هایپوبلاست طبقي حجرات د امبریونیک ډسک په Cephalic End کې یو بل سره کلک نښتي دي چې ددې طبقو په رامنځته کیدو سره اکتودرم او اندودرم هم پدې نقطه کې یوبل سره په تماس کې پاتې کیږي پدې برخه کې میزودرم موجود نه وي دا برخه Procordial Plate څخه عبارت ده.

په همدې ډول سره د امبریونیک ډسک Tail End کې هم اپیبلاست او هایپوبلاست طبقو حجرات یوبل سره کلک په تماس کې وي او ددوي ترمنځ هم میزودرم طبقي حجرات نه لیدل کیږي دا برخه دامبریونیک ډسک Cloacal Membrane بلل کیږي (۸-۱ انځور).



۱-۸ انځور : گسترولیشن او د اندودرم ، میزودرم او اکتودرم رامنځته کیدل .


۳ - Notochord جوړیدل :

د اکتودرم طبقې لاندې او اندودرم د پاسه د اپیبلاست طبقې حجراتو پواسطه په ترتیب سره لمړی Notochordial tube or Canal ، Notochordial Plate ، او Notochord منځته راځي . کله چې د اپیبلاست طبقې حجرات د Primitive Node له لارې د Prochordial Plate په لورې د اکتودرم لاندې مهاجرت کوي د Primitive Node نه تر Prochordial Plate پورې ټیوب یا کانال ډوله ساختمان جوړوي چې Notochordial Tube څخه عبارت دی، ددې ټیوب سطحه د اندودرم سره، چټ یې له اکتودرم او په دواړو خواو کې د میزودرم سره په تماس کې وي. د اندودرم دا برخه چې د ټیوب سطحې سره په تماس کې ده د ټیوب سطحه له اندودرم سره یوځای دواړه له منځه ځي چې نوموړی ټیوب بنسټه د Yolk Sac Cavity او پورته د Primitive Node د لارې له Amniotic Cavity سره ارتباط پیدا کوي چې پدې ډول دواړو جوفونو ترمنځ په موقتي ډول رابطه جوړیږي، چې دا رابطه Neuro Enteric Canal څخه عبارت ده (۸-۲ انځور) .

د اندودرم تخریب شوې برخې نهایت له دې ټوب ازادو برخو سره یوځای کیږي او هم د ټیوب پورتنې برخه هوارېږي او د هموار Plate شکل غوره کوي چې Notochardial Plate څخه عبارت دی. د اندودرم تخریب شوې برخ بیرته ترمیمېږي او Notochardial Plate حجرات تکثر کوي کانال بندوي اود Cord شکل غوره کوي چې دا کارډ Definitive Notochord بلل کیږي.

۴- Neural Tube جوړیدل :

Neural Tube د اکتودرم پورتنې سطحې له هغې برخې نه منځته راځي چې د Primitive node او Cardial Plate ترمنځ قرار لري ډیر زر نوموړې ټیوب په دوه غټو برخو تقسیمېږي چې Cranial Part (دماغ جوړوي) او Caudal Part (Spinal Cord جوړوي) څخه عبارت دی، د Neural Tube جوړیدلو پروسې ته Neurolation ویل کیږي (۸-۲ انځور).



۸-۲ انځور : Neurolation ، نوټوکارډ جوړیدل او داخلي میزودرم تقسیمات.

٥ — Allantois :

النتیوز نژدې په شپاړسمه ورځ د یوې راوتلې کڅوړې په ډول د امبلیکل کڅوړې دلکې برخې له طرفه راپیدا کیږي او نسلونکي ډنډر (Connecting Stalk) پورې نښلي . په خزندگانو ، مرغانو او ډیرو تي لرونکو کې دغه د اندودرم غوټه تنفسي وظیفه لري او یا په داخل الرحمي ژوند کې د ادرار ذخیرې په ډول کار کوي . په انسانانو کې النتویک کڅوړه ډیره کوچنۍ پاتې کیږي ، مگر النتویک میزودرم د کوریون لاندې پراخېږي او د پلاستیا رگونه جوړوي . داصلي النتویک راوتنې نژدې برخه دوامدره پاتې کیږي او د ډنډر په شکل تکامل کوي چې Urachus بلل کیږي کوم چې د مثانې نه تر نامه یا Umbilicus ساحې پورې غزیږي . په غتانو کې Urachus د Median Umbilical ligament څرگندوي . النتویک ډنډر د وینې رگونه د Umbilical په شیریانو بدلیږي .

٦ — Intra Embryonic Mesoderm تقسیمات:

امبریونیک ډسک کې میزودرم طبقه د اکتودرم او ندودرم ترمنځ قرار لري ، په درې ځایو کې د اکتودرم او اندودرم ترمنځ میزودرم نشته چې عبارت دی له Procardial Plate ، Clocal Membran او Notochord څخه دی .

د متوسط خط په امتداد امبریونیک ډسک له Caudal End څخه تر Cephalic End پورې د نوټوکارډ دواړو خواو ته میزودرم طبقه قرار لري ، د Procardial Plate شاته Cephalic End طرف ته هم میزودرم موجود دی . د نوټوکارډ دواړو خواو ته د میزودرم طبقه په درې برخو ویشل کیږي چې په لاندې ډول دي (۸ - ۲ انځور) .

الف — Paraxial Mesoderm : د نوټوکارډ دواړو خواو ته د میزودرم نژدې برخه ده چې په شروع کې دغه حجرات په متاجنس ډول قرار لري وروسته په وړو وړو پارچو (Segments) (ویشل کیږي چې Somite بلل کیږي . Somites په دوه ډولونو دي چې په Head Region کې Somatomes بلل کیږي ، چې د سر او ژامې هډوکي او عضلاتو جوړوي . او د Caudal End په طرف پاتې سیگمنتونه په خپله Somite دي چې د فقرات او پښتۍ جوړوي . دا سیگمنتونه مجموعاً ۴۴ جوړې دي ، ۴ یې Occipital ، ۸ Cervical ، ۱۲ Thoracic ، ۵ Lumbar ، ۵ Sacral او ۸ - ۱۰ Coccygeal دي .

ب — Lateral Plate Mesoderm : د امبریونیک ډسک وحشي طرف او څنډو ته میزودرم دی.

ج — Intermediate Mesoderm : د Paraxial Mesoderm او Lateral Plate Mesoderm ترمنځ میزودرم څخه عبارت دی (۸ - ۳ انځور)

۷- Intra Embryonic Coelom رامنځته کیدل


د Paraxial Mesoderm تقسیماتو په وخت کې د میزودرم Lateral Plate کې هم تغیرات منځته راځي پدې ډول چې په وحشي میزودرم کې کوچني کوچني جوفونه جوړېږي چې دا جوفونه غټیږي ، یو بل سره یوځای کیږي او یوه لویه حلا یا جوف جوړوي دغه لوي جوف د Intra Embryonic Coelom څخه عبارت دی . د ا جوف د امبریونیک ډسک په دواړو وحشي خواو کې قرار لري چې دواړه یوازې د Procardial Plate په قدام کې یو بل سره ارتباط لري ، نوموړی Coelom جوف د اس د نعل په شان شکل لري ، تړلی دی او ډیر زر له Extra Embryonic Coelom سره تماس پیدا کوي . د Lateral Plate Mesoderm ددې خلا یا Coelom پواسطه په دوه برخو ویشل کیږي.

الف — Somatopleuric Mesoderm or Parital layer : د وحشي میزودرم هغه برخه ده چې له اکتودرم سره په تماس کې ده (۸ - ۳ انځور)

ب — Splenchnopleuric Mesoderm or Vesceral layer : د وحشي میزودرم هغه برخه ده چې له اندودرم سره په تماس کې ده (۸ - ۳ انځور)

د Procardial plate په قدام کې د Splenchnopleuric Mesoderm برخې پواسطه زړه جوړېږي چې دا ساحه د Cardiogenic area or Cardiogenic plate په نوم یادېږي.

Septum Transversum د Cardiogenic area په قدام کې د وحشي میزودرم برخه د Intra Embryonic Coelom پواسطه په دوه برخو نه تقسیمېږي ، چې دا برخه د وحشي میزودرم Septum Transversum په نوم یادېږي کوم چې په راتلونکې کې د دیاфраګم یوه برخه جوړوي



۸-۳ انځور : داخلي ميزودرم تقسيمات او Intraembryonic Coelom


۸-۳ د زړه او رگونو لمړني جوړښتونو جوړېدل :

د دوهمې هفتې تر اخره امبریو تغذي اول د رحم پواسطه افراز شویو مایعاتو او وروسته د غرس کیدو نه د د اندومیتريوم وظیفوي طبقې بین الحلالي مایع اود مورنۍ وینې نه د Diffusion عمل پواسطه تر سره کیږي.


دریمې هفتې په شروع کې د Extra Embryonic Mesoderm پواسطه Vasculogenesis او Angiogenesis شروع کیږي (په Umbilical Vesicle ، Connecting ، Stalk او کوریون کې) ، تقریباً دوه وروځې وروسته د امبریونیک ډسک ميزودرم پواسطه د وینې رگونو جوړېدل شروع کوي پدې ډول زړه او رگونو سیستم لمړنی شکل منځته راځي ، اکسیجن او نور غذايي مواد د مورنې وینې څخه برابرې وینې په دریمه هفته کې Primordial Utero Placental Circulation تکامل کوي (۸-۴ انځور).

زړه د Intra Embryonic Mesoderm په Cardiogenic Area کې ددوه ټیوبونو په شکل سره منځته راځي چې Endocardial Heart Tube بلل کیږي ، ډیر زر دواړه ټیوبونه سره یوځای کیږي او Primordial Heart جوړوي. د Connecting Stalk ، Chorion ،

Umbilical Vesicle رگونه سره یوځای کیږي ، ددریمې هفتې په اخر او یا هم دڅلورمې هفتې په شروع کې (، په ٢١ یا ٢٢ مه ورځ) دزړه ټیوب تقلصات شروع کوي او وینه په رگونو کې جریان شروع کوي چې دزړه ضربان یا تقلصات د Doppler Ultrasound پواسطه پیژندل کیدای شي ، یا په بل عبارت ویلی شو چې د القاح په څلورمه هفته یا د وروستنې میاشتني عادت په اوومه هفته د رشیم زړه ضربان شروع کیږي.



الف : Angiogenesis او Vasculogenesis




ب : د زړه ټیوبونو جوړیدل او زړه د جوړیدو موقعیت

٨ - ٤ انځور: د Angiogenesis، Vasculogenesis او د زړه لمړني ټیوبونو جوړیدل په الف او ب انځورونو کې .

۹ - د Tropoblasts طبقې حجراتو تکامل (د Chorionic villi تکامل)

د دوهمې هفتې په اخر کې د سایتو تروفوبلاست پواسطه Primary Villi منځته راځي ، په دریمه هفته کې د Primary Villi منځنې برخې حجرات تخریبیږي او په عوض یې د Extra Embryonic Mesoderm Villi منځنې برخې ته داخلېږي په Secondary Villi بدلیږي ، ددې میزوردرم پواسطه د Secondary Villi په منځ کې د وینې رگونه جوړېږي او په Tertiary Villi بدلیږي ، د همدې Villi رگونه پواسطه د مورنې وینې نه ضرورت وړ مواد د Lacunars Space دلارې ترلاسه کوي اود رشیم پواسطه اضافي جوړ شوي مواد بیرته همدې Lacunars Space دلارې مورنې وینې ته اچوي . چې د پلاستېا په برخه کې مفصل ډول توضیح شويدي (۸ - ۵ انځور)



۸ - ۵ انځور: د تروفوبلاست حجراتو تکامل او Tertiary Villi رامنځته کیدل .

کلینکي تړاو :

گسترولیشن سره تړلي Teratogenesis :

ددريمې هفتې په لمړيو کې گسترولیشن شروع کو، د رشيم درې طبقې منځته راځي او لدې درې طبقو څخه پدې هفته کې د بدن د غړو او ارگانونو لمړني حجراتو او لمړني جوړښتونو جوړيدل او بيليدل شروع کوي، لکه سترگه، دماغ او داسې نور، خو پدې وخت کې د رشيم د غړو جدا کيدنه پوره نه وي ترسره شوي يوازي همدومره چې د رشيم د سر، منځنۍ يا تنې او لکۍ برخې معلومې شوي وي. که پدې وخت کې کوم تيراتوجن مواد رشيم ته تير شي د رشيم په سر يا لکې او هم په منځنۍ برخو باندې خپل تيراتوجنیک تاثيرات واردوي او په نتيجه کې ټولو هغه جوړښتونه چې د رشيم سر، لکۍ او يا هم منځنۍ قسمتونو څخه جوړېږي خرابوي.

• په لوړ دوز سره دالکولو استعمال د رشيمي ټيکلي د سر برخې حجراتو د مړينې باعث گرځي چې په نتيجه کې د سراو مخ برخو غړو جوړښتونه نیمگړی پاتې کېږي چې Holoprosencephaly (چې Forebrain کوچنی وي، دواړه جنبي بطينات سره يو ځای شوي وي او يو وي، دواړه سترگې يو بل سره نښتې وي) بلل کېږي.

• Caudal dysgenesis (sirenomelia) : رشيم دلکې برخې تکامل خرابيدل دي. څرنګه چې ددې برخې نه سفلي اطراف، بولي تناسلي سيستم او Lumbosacral Vertebra جوړېږي نو ددې غړو د انوماليو باعث گرځي. مختلفې درجې انومالي منځته راځي لکه د سفلي اطرافو هايپوپلازيا او يو بل سره نښلیدل، مقعدي سوري بند پاتې کيدل يا imperforated anus، د پښتورگو agenesis، د فقراتو انومالي او دجنسي غړو نیمگړتياوې موجودې وي.

• Situs inversus : په دريمه هفته کې نه يوازې د غړو جوړيدل پيلېږي همدارنګه د صدر او بطن واحدو غړو (Single Organs) موقعیتونه هم تعينېږي، چې پدې حالت کې د بطن او صدر جوف غړي د موقعيت په لحاظ تغيرکوي چې ښی يې چپ او چپ يې ښي طرف ته ځای نيسي. برعلاوه لدې دنورو غړو نیمگړتياوې هم موجودې وي

په گسترولیشن پورې تړلي تومورونه: کله کله په Sacrococcygeal region کې د Primitive streak بقايا پاتې کېږي او يا هم Primordium Germ Cells ځينې حجرات گونادونو ته نه رسېږي او پاتې کېږي چې د Primitive Streak پاتې شونې او يا هم لمړني تخمي

حجرات تکثر کوي او توموري کتله جوړوي چې Sacrococcygeal Teratoma بلل کېږي. معولا دا تومور ددرېواړو طبقو حجرات لري او د نويو زیږیدلو ماشومانو عام تومور دی. په لاندې انځور کې ښکاري.



نهم خپرکی

د ارگانوجنیزیس دوره : د څلورمې هفتې پیل نه تر اتمې هفتې پای پورې د رشیم تکامل پدې وخت کې انسان د وجود د ټولو لویو داخلي او خارجي جوړښتونو لمرنی شکلونه او منظرې جوړېږي او ددې دورې په اخر کې د ټولو سیستمونو او ارگانونو تکامل شروع کړی وي ، د ارگانوجنیزیس په دوران کې د رشیم شکل هم تغیر کوي ، د اتمې هفتې په اخر کې د انسان ځانگړې بڼه غوره کوي .

رشیم د تکامل مرحلې

د انسان تکامل په درې مرحلو تقسیم شوی دی .

- لمری د ودې مرحله ده چې پدې کې حجروي تقسیم او حجروي تولیداتو تفصیل شامل دي .
- دویمه مرحله د مارفوجنیزیس ده چې د ځانگړو غړو یا یوې برخې د بدن یا د ټول بدن د شکل ، اندازو او نورو منظرو تکامل پکې صورت نیسي . مارفوجنیزیس تفصیلي پروسې دي چې ددې پروسو په دوران کې ډیر گډ عملونه په منظم ډول پرله پسې تر سره کیږي . د حجراتو حرکات د انساجو او غړو جوړیدو په وخت کې ددوې ترمنځ متقابل عمل اجازه ورکوي .
- دریمه مرحله د تفریق پذیري مرحله ده چې د ځانگړو وظایفو ترسره کیدو وړتیا پیدا کوي .

د دې دورې ارگانوجنیزیس تغیرات په لاندې برخو مطالعه کوو .

۱ - Folding of Embryonic Disc - دامبریو التوات یا قات کیدنه

۲ - Derivative of Germ layers - درشیم ددریو طبقو مشتقات

۳ - د څلورمې هفتې نه تر اتمې هفتې پورې په لنډ ډول د هرې هفتې تکاملي تغیرات

۱ - Folding of Embryonic Disc یا دامبریو التوات یا قات کیدنه

ددریمې هفتې تر اخره رشیم یوه همواره نرمه کتله وي Cephalic End او Caudal End


درلودونکې وي . رشیم قات کیدل په دوه محورونو ترسره کیږي .

الف : د Median Plane په امتداد چې Head Folding او Tail Folding په شکل منځته راځي. دې ډول قات کیدنه کې د متوسط پلان مطابق درشیم سر او لکې قسمت د رشیم قدامي سطحه کې یوبل سره نژدې کیږي.

۱- **Head folding** : د امبریونیک ډسک د Cephalic End په دریواړو طبقوکې


په ترتیب سره لاندې ساختمانونه قرار لري.

د اکتودرم له پاسه د Neural Tube قدامي برخه (Cranial Region) اود اکتودرم قدامي قسمت، Procardial Plate، د میزودرم طبقې ابتدایي پریکارډیوم، د میزودرم Cardiogenic Area او ابتدایي زړه او Septum Transversum، د اندودرم قدامي برخه چې دهضمي توب Fore gut جوړوي. د امبریونیک ډسک قدامي برخه ددې ډسک قدام ته تاویږي، دریواړو طبقو پورتنی ساختمانونه هم قدام ته تاویږي پدې ډول Neural Tube قدامي برخه د Procardial Plate شاته ځای نیسي او Procardial Plate ددې ډسک قدام ته راځي کوم چې په راتلونکي کې د خولې جوف ځینې برخې جوړوي. Septum Transversum. چې دامبریونیک ډسک د Cardiogenic Area قدام کې ده د امبریونیک ډسک په تاویدو سره د Cardiogenic Area شاته ځای په ځای کیږي چې د حجاب حاجز مرکزي برخه جوړوي. د امبریونیک ډسک Cephalic برخې په تاویدو سره ددې برخې اندودرم دهضمي تیوب Fore gut جوړوي (۹ - ۱ انځور).



۹ - ۱ انځور: د Head folding جوړښتونو تغیر ښايي

۲ Tail Folding – د امبریونیک ډسک Caudal End اکتودرم له پاسه Primitive Streak، Cloacal Membrane، میزودرم او اندودرم دریواړه قدام خواته تاویږي چې Cloacal membrane د Primitive Streak په قدام کې ځای نیسي چې په آینده کې Anus جوړوي، اندودرم د هضمي تیوب Hand guts برخه جوړوي (۹-۲ انځور)




۹-۲ انځور: Median Plan Folding

ب — Transverse Plane په امتداد چې دواړو جنبي خواو کې التوات يا Folding پیدا کیدل: امبریونیک ډسک په دواړو وحشي خواو کې قدام يا Ventral ته تاوېږي پدې ډول دواړه څنډې یوبل ته نژدې کیږي، نوموړې تاویدنه د عرضاني محور په امتداد صورت نیسي Lateral Folding هم بلل کیږي.

عرضاني محور په امتداد Folding په نتیجه کې د امبریونیک ډسک دریواړه طبقې تاوېږي او Yolk Sac احاطه کوي. دامبریونیک ډسک فولډونوپواسطه Yolk Sac په رشیم کې د منځه ځي، او په رشیم کې انډودرم له خوا استر شوې تیوب جوړېږي چې Primitive Gut څخه عبارت دی. په شروع کې Primitive Gut د Yolk Sac سره پراخه ارتباط لري د Primitive Gut هغه برخه چې Yolk Sac د Cephalic End طرف کې ده Fore Gut، د Gut هغه برخه چې Caudal End په طرف قرار لري Hand Gut اوپه خپله دارتباط برخه د Mid Gut څخه عبارت دی. دامبریو دې تغیراتو Secondary Yolk Sac کوچنې کیږي، ډیره برخه یې د امبریونیک ډسک نه باندې پاتې کیږي چې پدې وخت کې دا Yolk Sac د Umbilical Vesicle يا Definitive Yolk Sac بلل کیږي او د یوه نري کانال پواسطه Umbilical vesicle له Gut سره ارتباط لري چې دغه کانال د Omphalomesenteric canal يا Yolk Stalk او يا هم Vitelline duct بلل کیږي (۹-۲ انځور)

Connecting Stalk. قدام خواته تاوېږي او د Umbilical Cord په جوړیدو کې برخه اخلي، Extra Embryoin Coelum کوچنۍ کیږي او هم یې له Intra Embryonic Coelum سره ارتباط کمیږي.

د امبریونیک ډسک دواړو ډولونو قات کیدنو (Median and Transvers Plane folding) (سره Yolk Sac Cavity اوهم Extra Embryonic Coelum کوچنۍ کیږي ټول امبریو د Amniotic Cavity پواسطه پوښل کیږي چې جنین د امنیوتیک جوف اوامنیوتیک مایع په منځ کې تر تولد وخته پورې پروت وي. دواړه ډوله فولډونه په لاندې شکلونو کې ښکاري (۹-۳ انځور).



۹ - ۳ انځور: Transverse folding او امنیوتیک جوف

۲ - د اندودرم ، اکتودرم او میزودرم طبقو تفریق پذیری.

Derivatives or Differentiation of Germ Layers

د انسان بدن ټول سیستمونه او اغزاوې د امبریونیک ډسک له درې طبقو څخه منځته راځي داسې چې د هرې طبقې حجرات تقسیمات کوي ، جدا او غټیږي او مربوطه ځایونو ته مهاجرت کوي ، مربوطه غړي جوړوي . د هرې طبقې څخه چې د بدن کومې برخې منځته راځي په لاندې ډول دي.

الف : د اکتودرم طبقې مشتقات : لدې طبقې څخه د بدن لاندې برخې منځته راځي.

- عصبي سیستم (مرکزي او محیطي سیستمونو برخې) چې مرکزي عصبي سیستم د عصبي تیوب او محیطي سیستم د عصبي تیوب کرسټ حجراتو نه منشا اخلي ، په محیطي عصبي سیستم ټول عصبي عقدات (Ganglion) د محیطي عصبي سیستم پوښونکي حجرات هم له اکتودرم نه منشا اخلي.

- سحایا یا Meninges چې دماغ او نخاع یې پوښل دی .
- دسترگې . غوړ او پوزې حسي اپیتل نسج
- د ادرینال غدې میډولا برخه
- د پوستکي او او اپیدرم مشتقات (وینبټان او نوکان) ، د درمس پگمنټ حجرات ،
- نحامیه عده ، Mamary gland ، Subcutaneous gland
- د غاښونو Enamel طبقه

ب : د میزودرم طبقې مشتقات : ددې طبقې نه د بدن لاندې برخې جوړیږي .
منظم نسج ، عضروف ، هډوکي ، عضلات (خط داره عضلات ، Smooth Muscle او دزړه عضله) ، وینه او دوینې او لمف رګونه ، پښتورګي او د Suprarenal gland کورټکس برخه ، تخمدانونه ، حصې ، Genital duct ، د بدن سیروزي عشاوې چې د بدن جوفونه پوښوي (پریټوان ، پلورا او پریکارډ) توری یا Spleen .

ج : اندودرم طبقې مشتقات : د اندودرم نه لاندې برخې د بدن منځته راځي .
د تنفسي او هضمي سیستم پوښونکی اپیتیلیوم نسج ، تانسولونه ، تایراید او پارا تایراید غداواتو پارانشیم ، تایمس . ځیګر او پانکراس ، د مثانې ا و احلیل د ډیرې برخې پوښونکی اپیتیلیوم ، د غوړ Tympanic Cavity ، Tympanic Antrum او Pharyngeal tube پوښونکی اپیتیلیوم .

د سومایټ تفریق پذیری:

Paraxial Mesoderm د نوټوکارډ دواړو خواو ته د میزودرم نژدې برخه ده چې په شروع کې دغه حجرات په متاجنس ډول قرار لري وروسته په متعددو قطعو (Segments) باندې ویشل کیږي چې Somite بلل کیږي ، Somites په دوه ډولونو دي چې په Head Region کې Somatomes بلل کیږي کوم چې د سر او ژامې هډوکي او عضلاتو جوړوي . او د Caudal End په طرف پاتې قطعې په خپله Somite دي . په رشیم کې ټول ۴۴ جوړیږي (۴ یې Occipital ، ۸ Cervical ، ۱۲ Thoracic ، ۵ Lumbar ، ۵ Sacral او ۱۰ Coccygeal) په ۹ - ۱ جدول کې ښودل شويدي

۹ - ۱ جدول :

Approximate Age (days)	No. of Somites
20	1-4
21	4-7
22	7-10
23	10-13
24	13-17
25	17-20
26	20-23
27	23-26
28	26-29
30	34-35


۳ - دارگانوجنیزیس خلاصه

د رشیمي دورې د هرې هفتې تکاملي تغیرات په خلص شکل په لاندې ډول ذکر شويدي.
۱ - د څلورمې هفتې تکاملي تغیرات : د وجود لوي او عمده تکاملي تغیرات د څلورمې هفتې په دوران کې منځته راځي

د څلورمې هفتې په شروع کې امبریود هموار ډسک په شکل وی ، ۴ - ۱۲ پورې Somites لري ، Neural tube د دواړوخواو Somites لپاسه قرارلري او په دواړو نهایتونو کې سوري لري چې یو یې د امبریونیک ډسک په Cephalic End کې د Rostral Neuropore او بل یې لکې برخه کې د Caudal Neuropore په نوم دي . په څلورمه هفته کې د امبریونیک ډسک قات کیدو یا Folding په وجه انخنا پیدا کوي او امبریونیک ډسک د هموار شکل څخه په C شکل بدلیږي.

په ۲۴ مه ورځ د غاړې لمړني دوه قوسونه او په ۲۶ مه ورځ د غاړې دریم قوس تاسس کوي ، په ۲۶ مه ورځ د نیورل تیوب Rostral Neuropore بندېږي د نیورل تیوب سر برخه وده کوي او د دماغ لمړنی برامدگي منځته راځي . د علوي اطرافو برامدگي (Bud) په ۲۶ مه او یا په ۲۷ مه ورځ د امبریو په قدامي قسمت کې منځته راځي او په همدې وخت کې سترگې د جوف ژوروالی او د داخلي غوږ ابتدايې شکل تاسس کوي (۹ - ۴ انځور).

. د څلورمې هفتې په اخر د غاړې څلورم بلغومې قوس جوړېږي ، د سفلي اطرافو برامدگي (Bude) تاسس کوي ، رشیم د لکې نهایت (Caudal End) ډیر واضح کیږي چې ددې هفتې واضح او بارزه منظره جوړوي . د زړه او رگونو مهم ساختمانونه جوړېږي او د نیورل تیوب Caudal Neuropore هم بندېږي . په لاندې انځور کې ددې هفتې تغیرات ښودل شويدي.



۹ - ۴ انځور: د څلورمې هفتې رشیم چې گڼ شمیر جوړښتونو پیل ښايي

۲ - د پنځمې هفتې تکاملي تغيرات : پنځمه هفته کې تکاملي تغيرات نسبت څلورمې هفتې ته کم دي . پدې هفته کې امبریو سر دماغ او مخ برخې دسریع ودې له کبله ډیر غټیږي او زړه ساحې (Cardiogenic Area) ساحې سره په تماس کې کیږي . دوهم بلعومي قوس د دریم او څلورم بلعومي قوس په طرف په تیزې سره وده کوي . Mesonephric Ridge تشکل کوي چې د پښتورگو ابتدايې جوړښت ترې منځته راځي ، کوم چې دانسان داخلي اطراخي غړي جوړوي .

۳ - شپږمې هفتې تکاملي تغيرات : په شپږمه هفته کې امبریو د Touch یا تماس په مقابل کې عکس الغمل ښاي ، د علوي اطرافو برامدگۍ غټیږي او ځینې برخې یې د یوبل څخه جدا کیږي لکه د بازو ، مړوند اود لاس پلیټ (Hand Plate) ، او هم په Hand Plate کې د گوتو برامدگۍ (Digital Rays) منځته راځي


. په شپږمه هفته کې د امبریو Spontaneous Movement (د تنې او نهایاتو تاویدلو په ډول سره) منځته راځي . امبریونیک ډسک چې C د تورې شکل لري پدې هفته کې بیرته یوبل څخه لرې کیږي او د C شکل نه هموار او مستقیم حالت ته تغیرکوي .

۴ - اومې هفتې تکاملي تغيرات : پدې هفته کې علوي او سفلي اطرافو کې پام وړ تغيرات منځته راځي ، د گوتو برامدگیو (Digital Rays) ترمنځ ژوروالی یا Notch منځته راځي او گوتې یو بل نه جدا کیږي . د ابتدايې هضمي تیوب او Umbilical Vesicle تر منځ ارتباط کمیږي او Omphaloentric duct هم کوچنی کیږي . داومې هفتې په اخر کې د علوي اطرافو هډوکو Ossification شروع کیږي (۹ - ۵ انځور)



۹ - ۴ انځور: د اوومې هفتې رشیم

۵ - د اتمې هفتې تکاملي تغيرات: پدې هفته کې رشيم د لاسونو ګوتې يوبل څخه جدا کېږي د پښو ګوتو ترمنځ Notch جوړېږي . د سر په شاوخوا کې Vascular Plexus موجود وي چې دسر برخې مشخصه منظره غوره کوي . د اتمې هفتې په اخر کې د نهاياتو ټولې ساحې ښکاري ، ګوتې اوږدېږي او په مکمل ډول د يوبل نه جدا کېږي . د نهاياتو ګټور حرکات لمرې پدې هفته کې منځته راځي او د Femor هډوکي Ossification هم شروع کېږي . ددې هفتې په اخر کې دامبريو لکې برخې ټوله برآمدګي په مکمل ډول له منځه ځي او امبريو د انسان شکل غوره کوي . د سربخه لويه وي چې د امبريو نيمایي برخه تشکيلوي . د اتمې هفتې په اخر کې د رشيم انځور چې دانسان منظره غوره کوي په لاندې ډول دی. په لاندې انځور کې د اتمې هفتې رشيم ښودل شوی دی (۹ - ۶ انځور) .



۹ - ۶ انځور : د اتمې هفتې رشيم

کلینکي تړاو

ولادې نقیصې یا : Birth defects

د دریمې نه تر اتمې هفتې پورې په رشيم کې د بدن غړو اوسیستمونه لمرني شکلونه او جوړښتونه جوړېږي چې دې مرحلې ته Organogenesis Period هم ویل کېږي. پدې وخت کې Stem cells تجمع د ټولو غړو په لمرني شکل سره موجود وي، دا حجرات د محيطي فکتورونو او Teratogen موادو په مقابل کې ډیر حساس وي نو په همدې وجه د څلورمې نه تر اتمې هفتې پورې د رشيم ډیر حساس عمر دی ، که پدې وخت کې رشيم د Teratogen موادو سره مخامخ شي نو د بدن د غړو جوړښتونو د ګډوډیو او نیمګړتیاو سبب ګرځي چې دغه نیمګړتیاوې ولادي نقیصې یا Birth defects کېږي.

د ناروغیو په تداوی کې د Stem Cells کارول:

څرنګه چې Inner cell mass په دریو طبقو (اکتودرم ، اندودرم او میزودرم) ویشل کیږي ، دا چې د بدن ټولې حجرې ، نسجونه او غړي لدې دریو طبقو جوړیږي ، د Inner cell mass حجرو ته Embryonic stem cell ویل کیږي . دا Stem cell په لابراتوارونو کې په کلچر کې په غیرتفریق پذیري شکل کې ساتل کیدلای او تکثیر کوي . که دا حجرې له ځانګړو Growth factor سره مخ شي ، په کلچر کې Stem cell بیلا بیلې کاهلې حجرې لکه نیورون ، عضلي حجرې ، دویښې حجرې ، دعضروفي حجرې او نورترې جوړیدلای شي . دې حجرو ته Pleuripotent حجرات ویل کیږي . دا لیدل شویده چې کله دا Stem cells د یو ژوندي انسان انساجو ته داخل کړل شي ، محیطي چاپیریال لدې حجرو سره مرسته کوي چې دهمدې ژوندې نسج دحجرو په څیر شي . چې دا تکنیک دبیلا بیلو ناروغیو تداوی لپاره زیات ممکنیت لري . ځینې لدې ناروغیو Myocardial, Diabetes , Alzhiemer disease , Parkinson's disease infarction، دویښې ناروغۍ ، شدیدې سوختګې ، Osteoporosis ، د Spinal cord تروماګانې دي . مګر پدې پروسیجر کې معایفیتي ردونه (Immune rejection) تل موجود وي ځکه چې جنیټیکي جوړښت د ناورغ له جنیټیکي جوړښت سره توپیر لري، پدې ستونزه د بریالیتوب لپاره ساینس پوهان په Therapeutic Stem cells cloning باندې کار کوي . پدې پروسیجر کې د ناروغ د حجرې هسته په Embryonic Stem cells کې زرق کیږي، دا حجرې بیا پرېښودل کیږي چې د ناروغ په هر یو نسج کې وده وکړي . دا چې له Stem cells څخه راولاړیدونکي نسجونه اوس په جنیټیکي توګه له ناروغ سره ورته دي او د ردیدومخنیوی کیږي .

Stem cells دځینو کاهلو انساجو څخه لکه هډوکي مغز ، دماغ او اسکلیټي عضلاتو څخه هم جلا کیدای شي . مګر ستونزمنه ده چې کاهل Stem cells په لابراتوارونو کې کلچر شي ځکه چې دکاهلو انساجو تفریق پذیري کمه ده .

سره لدې چې Embryonic stem cells د تداوي موخولپاره ډیر مناسب دي ،خود Stem cells څیړنې لپاره انساني رشیم ته اړتیا ده ، چې د همدې له امله ځینې مسؤلین یې په اخلاقي لحاظه مخالفت کوي . اساسي اعتراضات پرې دادی چې دطبیعت خلاف او درشیم بې اختراي پکې کیږي .

لسم څپرکی

د نهمې هفتې پیل نه تر ولادت وخت پورې د جنین تکامل

(د جنین تکاملي دورې میاشتنی تغیرات)


جنین تفریق پذیری

رشم بدلیدل په جنین باندې تدریجي ډول صورت نیسي ، خود نوم بدلون یې له رشم څخه جنین ته مهم دی ، چې پدې وخت کې رشم دومره انکشاف کړی وي چې د یو انسان په توګه د پیژندلو وړ وي، د ټولو غړو عمده غړو او سیستمونو لمرني بڼې منځته راغلې وي. جنیني مرحله د انساجو، غړو او سیستمونو له تفریق پذیری سره مل وي ، یو مهم بدلون په جنیني مرحله کې دا دی چې دسر وده نسبت نور بدن ودې ته ورو وي. د بدن وده په جنیني دوره کې ډیره چټکه وي او د جنین وزن داخل الرحمي ژوند په وروستیو کې فوق العاده ډول سره زیاتېږي.

جنیني دوره چې نژدې ۳۰ هفتې په بر کې نیسي په عمومي ډول د جنین عمر تعینول ، د جنین میاشتنی څرګندونو او د جنین هفتوارو تکاملي تغیراتو په ډول مطالعه کیږي .

الف — د جنین او رشم عمر تعینول : د جنین اندازه گیرې او او باندینې ځانګړنې د جنین عمر په تعین کې مهم رول لري.

• رشم عمر تعینولو لپاره د Carnegie مرحلو سیستم غوره طریقه ده چې رشمي دورې تکامل پکې په ۲۳ مرحلویا Stages باندې تقسیم شوی دی، چې نوموړې مرحلې په دریم څپرکې کې د رشم په تکامل کې په تصویري شکل ذکر شويدي. چې پدې مرحله کې د رشم بیروني خواصو له مخې ترسره کیږي . د رشم عمر تعینول د رشم د اندازه کولو طریقو پواسطه د اعتبار وړ ندي یعنی (۱۰- ۱ انځور).




۱-۱۰ انځور: د رشیم تر اتمې هفتې CRL اندازې

• د جنین اندازه او متوقع عمر تعینول د زیږون د ورځې په هکله د یوې وړاندوینې برابرولو لپاره کارول کیږي، ترڅو د زیږون یا ولادت وخت تعین شي او ټول هغه خطرات چې مور او ماشوم ته د ولادت په وخت کې متوجې کیږي مخنیوی یې وشي. د عمر تعین د التراساوند او کلینکي معلوماتو پواسطه تر سره کیږي (۱۰-۲ انځور).

A - د التراساوند پواسطه د جنین او رشیم د عمر تعینولو تر ټولو ښه طریقه ده. چې د رشیم او جنین د مختلفو برخو اندازه کولو پواسطه د جنین او رشیم عمر تعینوي چې په لاندې ډول دي


۱- Crown – Rump Length (CRL) : د التراساوند په مرسته د جنین سر او کونایو ترمنځ اوږدوالي اندازه کولو پواسطه د جنین عمر اندازه کیږي چې د همدې له مخې د ولادت موده هم تعینولی شو (۱۰-۲ انځور).

۲- Crown Head Length (CHL) : پدې طریقه کې د التراساوند پواسطه د جنین د سر نه تر پښو پوندو پورې اوږدوالی اندازه کوو او د جنین عمر تعینوو (۱۰-۲ انځور).



۱۰-۲ انځور: D شکل يې Crown Neural Length دی او B او C ، CRL دی.

۳ - همدارنگه دالتراساونډ په مرسته د جنين د Head Circumferences ، Circumference Abdominal ، Biparietal Diameter او د Femore Length اندازه کولو څخه هم د جنين عمر په تعينولو کې گټه اخيستل کيږي.




۱۰-۲ انځور: د شلمې هفتې او د نهمې مياشتې جنين ښودل شويدي

ب - د کلينيکي معلوماتو پواسطه د جنين او رشيم عمر تعينول: نوموړې طريقه نسبت التراساونډ ته ډيره دقيقه نده خو بيا هم په کلينيک کې ډيره استعمالیږي. پدې طريقه کې وروستني نارمل حيض لمړی ورځې څخه حساب نيول کيږي (1st day of LNMP or Last Normal Menstrual Period) او له هغې څخه ۱۴ ورځې کميږي ځکه چې د رشيم ژوند د القاح څخه شروع کوي، لاسته راغلې وخت د جنين د عمر څخه عبارت دی.

د امیدواری دوره په کلینیک کې په دریو برخو ویشل کېږي چې هره برخه یې له یوه ټرایمستر څخه عبارت ده ، د لمړۍ ټرایمستر په پای کې د جنین ټولو عمده غړو او سیستمونو لمړنۍ انکشاف کړی وي (۱۰ - ۳ انځور). په دویم ټرایمستر یا دویمو درې میاشتو کې جنین په کافي اندازه وده کوي ، که پدې وخت کې التراساوند معاینه تر سره شي اناتوميک جزیات په ښه توګه پکې لیدل کیدلای شي ، همدارنګه پدې ټرایمستر کې لوړ ریزولوشن او Real Time Ultrasound په مټ کولی شو چې عمده ولادي انومالي یا نیمګړتیاوې په ګوته کړو. ددریم ټرایمستر په پیل کې که جنین بې مودې تولد شي نو ښايي ژوندی پاتې شي (۱۰ - ۳ انځور).

د رشیم او جین عمر په ټوله کې د LNMP سره یوځای د جنین وزن او اوږدوالي اندازې اوهمدارنګه د نورو مارفولوجیکې منظرې چې د هرې میاشتې لپاره ورکړل شوي دي د جنین مناسب عمر ترې په صحیح ډول محاسبه کیدلای شي. ددغو اندازو تعین لپاره مناسبه معاینه التراساوند ده کوم چې دیوې نه تر دوه ورځو په توپیر سم معلومات ورکولی شي

د اوومې نه تر څوارلسمې هفتې پورې د CRL اندازه کولو پواسطه هفته وار و تګیراتو په هکله معلومات ورکوي. د ۱۶ - ۳۰ هفتې پورې د Biparietal diameter (BPD) ، د سر او بطن محیط اندازه کولو او د Femor Length اندازه کولو پواسطه معلومات وړاندې کوي. په صحیح ډول د جنین عمر او اندازې تعین د حاملګۍ اداره کولو لپاره ضرور دی ، په ځانګړې ډول هغو میندو لپاره چې حوصلې جوف یې کوچنۍ وي او یا دا چې ماشومان یې نقیصې ولري.



۱۰ - ۳ انځور: د جنین د مختلفو هفتو د CRL اندازه .


د جنین میاشتنی تغیرات

ددریمې میاشتې په لمریو کې د سر برخې احاطې اندازه نژدې د CRL نیمایي وي چې د پنځمې میاشتې په لمریو کې د CHL ۳/۱ وي او د تولد په وخت کې د CHL ۴/۱ برابر وي ، نو ویلای شو چې په جنیني دوره کې د جنین سر برخې وده په قراره وي او د جنین جسم په تیزی سره وده کوي (۱۰ - ۴ انځور).

ددریمې میاشتې په دوران کې د جنین مخ د انسان مخ په شان منظره غوره کوي . په لمریو کې سترگې د سر په وحشي برخه کې قرار لري چې وروسته د مخ قدامي قسمت ته حرکت کوي او همدارنګه غوږونه هم د سر په خپل ځای کې ځای په ځای کیږي . د اطرافو اوږدیدل د جسم په تناسب غټیږي خو سره ددې هم سفلي اطرافو تکامل نسبت علوي اطرافو ته کم وي .

Primary Ossification Centers په ۱۲ مه هفته کې د سراو اوږدو هډوکو کې موجود وي ، همدارنګه په دولسمه هفته کې خارجي تناسلي غړي غټیږي او تردې اندازې تکامل کوي چې دالتراساونډ پواسطه د پیژندلو وړ گرځي .

په شپږمه هفته کې د کولمو غراوات د Umbilicus شاوخوا ته غټ پرسوب رامنځته کوي خو په دولسمه هفته کې دا غراوات بطن جوف ته داخلېږي . دریمه میاشت کې جنین عکسوي فعالیت (Reflex Activity) تر سره کولی شي چې دجنین د غصلي فعالیت نمایندګي کوي



۱۰ - ۴ انځور : په جنیني دوران کې د جنین د سر او تنې متناسبه وده ښايي

د څلورمې او پنځمې میاشتې په دوران کې د جنین اوږدوالی (طول) په تیزی سره زیاتېږي، داخل الرحمي ژوند په لمړۍ نیمایي کې یې ۱۵cm CRL ته رسېږي چې دنوي زیږیدلي ماشوم اوږدوالي نیمایي دی. همدارنګه پدې وخت کې د جنین په وزن کې لږ زیاتوالی منځته راځي چې د پنځمې میاشتې په اخر کې یې هم اندازه له ۵۰۰ ګرامو څخه کمه وي. پدې وخت کې د جنین جسم د نرمو ویښتانو پواسطه چې Lanugo Hair بلل کېږي پوښل شوی وي همدارنګه دسر او وریځو ویښتان هم د لیدلو وړ وي. په پنځمه میاشت کې د جنین حرکات د مور پواسطه حس کیدلی شي.

داخل الرحمي ژوند په دوهمه نیمایي کې د جنین په وزن کې د پام وړ زیاتوالی منځته راځي په ځانګړي ډول په وروستیو دوه نیمومیاشتوکې چې نژدې ۵۰٪ د Full Term ماشوم وزن اخلي.

په شپږمه میاشت کې د جنین پوستکی سور وي او ګونځې لري ځکه چې د پوستکي لاندې منظم نسج نه وي. که چیرته جنین د شپږمې میاشتې په لمړیو کې تولد شي د ژوندي پاتې کیدلو لپاره ډیر مشکلات لري ځکه چې تنفسي او مرکزي عصبي سیستمونو یې پوره تکامل نه وي کړی.

د ۵.۶ – ۷ میاشتو جنین اوږدوالی ۲۵cm او وزن یې نژدې ۱۱۰۰gm وي که چیرته پدې وخت کې جنین تولد شي ۹۰٪ د ژوندي پاتې کیدلو چانس لري. په وروستیو دوه میاشتو کې جنین ګرده منظره غوره کوي داسې چې د پوستکي لاندې شحم ځای په ځای کیږي.

داخل الرحمي ژوند په اخره کې د جنین پوستکی د سپینو شحمي موادو پواسطه چې د Subcutaneous glands پواسطه تولیدېږي پوښل شوی وي، چې دا مواد Vernix Caseosa بلل کېږي. د نهمې میاشتې په اخر کې د سراحاطه تر ټولو لویه وي. د ولادت په وخت کې د نارمل جنین وزن ۳۰۰ – ۳۴۰۰ ګرامه، CRL یې ۳۶ سانتي متره او CHL یې ۵۰ سانتي متره وي، جنسي مشخصې واضح وي، خصیې په سکروتوم کې قرار لري.

۱۰-۱ جدول : په جنيني مرحله کې د هرې مياشتې تغيرات نظر هفتو ته په لاندې جدول کې ذکر شويدي.

عمده بیرونی څرگندونې	Fetal Weight (g)	Foot Length (mm)	Crown-rump length(mm)	Age (weeks)
				Preivable Fetus
دسترگو زیرمې تړلې وي ، سرلوي او گرد وي ، تناسلي سیستم خارجي غړي (نارینه یا ښځینه په شکل) نه معلومیږي ، د کوچنیو کولمو یوه برخه د Umbilical cord سره نژدې واقع وي ، غوږونه ښکته قرار لري.	۸	۷	۵۰	۹
کولمي د بطن په داخل کې وي ، د لاسو گوتو نوکانولمړنۍ وده (نوکانو قاعدې برخه) منځته راغلې وي .	۱۴	۹	۶۱	۱۰
غاړې قسمت واضح وي ، د تناسلي سیستم خارجي غړي واضح وي او جنس (نارینه یا ښځینه) معلومیږي.	۴۵	۱۴	۸۷	۱۲
سر څخه وي . سترگې دمخ په قدامي قسمت کې وي ، غوږونه د سر په خپل وضعیت کې قرار لري	۱۱۰	۲۰	۱۲۰	۱۴

، سفلي اطرافو ښه تکامل کړی وي ، دپښوگوتونوکان وده شروع شوی وي (دنوکانو قاعدې برخه).				
خارجي غوړ د سر نه باندې واضح وي	۲۰۰	۲۷	۱۴۰	۱۶
Vernix caseosa پوستکی پوښي ، د جنین حرکات (Quacking) لمړی ځل دمورپواسطه حس کیږي .	۳۲۰	۳۳	۱۶۰	۱۸
د سر او وجود ویښتان (Lanugo) د لیدلو وړ وي.	۴۶۰	۳۹	۱۹۰	۲۰
				Viable Fetuses
پوستکی گونځې وي ، Translucent او گلابي نه تر سور واضح رنگ لري .	۶۳۰	۴۵	۲۱۰	۲۲
د لاسو گوتو نوکان موجود وي ، جنین جسم لاغر وي	۸۲۰	۵۰	۲۳۰	۲۴
د سترگو زیرمې په قسمي ډول خلاصې وي ، بانه موجود وي.	۱۰۰۰	۵۵	۲۵۰	۲۶
سترگې په پراخه ډول خلاصې وي ، دپام وړ سر ویښتان کله کله موجود وي . ، سر په لږ اندازه گونځې لري	۱۳۰۰	۵۹	۲۷۰	۲۸

تانسولونه موجود وي ، Testis ښکته کيږي	۱۷۰۰	۶۳	۲۸۰	۳۰
دلاسو گوتو نوکان د گوتو څوکو ته رسپري ، پوستکی ښويه وي.	۲۱۰۰	۶۸	۳۰۰	۳۲
د جنين جسم معمولاً نيغ وي ، Lanugo وينستان معمولاً نه وي ، پښو دگوتو نوکان دگوتو څوکو ته رسپري ، نهايات قبض وي.	۲۹۰۰	۷۹	۳۴۰	۳۶
صدر برخه متبارزه وي صدي باندې راوتلې وي ، Testis په سکروټوم کې وي او يا په Inguinal کې د جس وړ وي	۳۴۰۰	۸۳	۳۶۰	۳۸

دا اندازه گيرې منځنۍ دی په ځانگړو حالاتو کې نشي تطبیقیدلی . دا وزنونه هغه Fetuses ته راجع کيږي چې په ۱۰ فیصده فورمالین کې نژدې دوه هفتو لپاره تثبیت شويدي ، تازه زیږیدلو ماشومانو وزن معمولاً نژدې پنځه فیصده کم وي. د عمر او وزن تکامل لپاره غوڅ حد نشته چې جنین دې پکې د ژوندې پاتې کیدو وړتیا ولري. مگر تجربو پواسطه ښودل شويده چې هغه ماشومان چې وزن یې ۵۰۰ گرامو څخه کم وي او یا د القاح عمر یې ۲۲ هفتوڅخه کم وي ژوند یې نه پاتې کيږي . سره لدې چې که چیرته د ۲۶ او ۲۸ هفتو ترمنځ وزیږيږي په سختی سره ژوندی پاتې کيږي ځکه چې تنفسي او مرکزي عصبي سیستمونو یې پوره ډول تکامل نه وي کړی .

د تولد متوقع عمر تعینول یا Time of Birth ، Post mature او

Premature babies

جنین د تولد وخت القاح دورځې څخه ۲۶۶ ورځې یا ۳۸ هفتې دی . معمولاً Oocyte د ازادیدو څخه وروسته په ۱۲ ساعتونو کې القاح کيږي .

نسایي ډاکټران د ماشوم د تولد متوقع عمر د وروستي نارمل تحيضي سایکل (LNMP) (د لمړۍ ورځې نه حسابوي چې ۲۸۰ ورځې یا ۴۰ هفتې دی . تقریبا ۱۲٪ ماشومان د خپل متوقع عمر څخه یو نه دوه هفتې وروسته تولد کیږي .

۱۰-۲ جدول د ولادت وخت مقایسه نظر القاح او نورمال وروستني تحيضي سایکل (LNMP)

مرجع کوونکې نقطه	ورځې	هفتې	د جنټري میاشت (شمسي میاشت)	قمری میاشت
القاح د وخت نه	۲۶۶	۳۸	۸,۵	۹,۵
۱ st day of LNMP نه	۲۸۰	۴۰	۹	۱۰

د زیږون نیټه د القاح ټاکل شوې ورځې څخه ۲۶۶ ورځې ده یا د وروستني نارمل میاشتنی عادت لمړۍ ورځې څخه ۲۸۰ ورځې ده . القاح څخه د رښمې دورې تر پایه (اتمې هفتې تر پایه) د رښم عمر توضیح په ورځو سره کیږي ، د نهمې هفتې څخه وروسته د جنین عمر توضیح په هفتو کیږي .

که چیرته د خپل وخت نه ډیرمخکې تولد شي Premature او یا که د خپل وخته نه ډیر وروسته تولد کیږي Post mature بلل کیږي .

کلینکي تړاو

Low Birth Weight: پدې حالت کې د ماشوم وزن او اوږدوالي کې د پام وړ تغیرات موجود وي ، کله کله دغه اندازې د ماشوم حساب شوو میاشتو او یا هفتو سره مطابقت نه کوي . ډیر فکتورونه پدې کې رول لري (جینټیکي او محیطي فکتورونه) مگر محیطي فکتورونه پکې مهم رول لري .

Intrauterine growth restriction (IUGR) : دا اصطلاح د هغه ماشومانو لپاره استعمالیږي چې د ولادت وزن یې ورکړل شوي متوقع وخت نه ۱۰ Percentile کم وي . چې ددې لپاره کله کله Small for date ، Small for gestational age (SGA) ، Fetal ، malnourished یا Dysmature اصطلاحگانو په ډول هم توضیح کیږي .

یولسم خپرکی

د جنیني دورې مهم تکاملي تغیرات

د جنیني دورې مطالعې لپاره کوم رسمي د مرحلو سیستم نشته خو معمولا د څلورو نه تر پنځو هفتو تکاملي تغیراتو په شکل تشریح کیږي .

۱ - ۹ نه تر ۱۲ هفتې جنین مهم تکاملي تغیرات

د نهمې هفتې په شروع کې جنین سر محیط د ټول CRL نیمايې برخه جوړوي . پدې وخت کې د جنین سر برخې وده کمه وي خو د جسم برخه یې په سریع ډول وده کوي . په نهمه هفته کې مخ پراخه وي ، دواړه سترگې په پراخه ډول یوبل نه جدا وي ، غوږونه ښکته قرار لري او دهرې سترگې دواړه زیرمې یوبل سره وصل وي . ددولسمې هفتې په اخر کې په هډوکوکې د هډوکو جوړولو لمړني مرکزونه ښکاري په ځانگړي ډول د سر او اوږدو هډوکو کې . همدارنگه د نهمې هفتې په اولو کې Legs لاندې وي او Thigh په نسبي ډول کوچنی وي . نهمې هفتې تر اخره د نارینه او ښځینه خارجي تناسلي غړي یوشان وي خو د جدا کیدو وړ نه وي . نهمه هفته کې د وینې سرو حجراتو ډیره برخه د ځیگر پواسطه جوړیږي خو ددولسمې هفتې په اخر کې ځیگر دا وظیفه کمیږي او توری د وینې سرو حجراتو په جوړولو (Erythropoiesis) شروع کوي . د نهمې او دولسمې هفتې ترمنځ Urine جوړیدل شروع کیږي چې د Urethra دلارې امینوټیک مایع ته تخلیه کیږي . د جنین پواسطه یوه اندازه امینوټیک مایع بلع کیږي او دوباره جذبیږي . د جنین اضافي مواد دپلاسنټا دلارې مورنې وینې دوران ته تریږي . د لسمې هفتې تر نیمايې پورې کولمې د Umbilical Cord نژدې برخه کې قرارلري او په یولسمه هفته کې گیدې ته داخلېږي . ددولسمې هفتې په اخر کې علوي اطراف اوږدوالی نژدې خپلې اخرنۍ اندازې ته رسیدلی وي مگر سفلي اطرافو ښه وده نه وي کړي، او د خپل

نهایې اوږدوالي نه لند وي. Primary Ossification ددولسمې هفتې په اخر کې (سر او اوږدو هډوکو کې) شروع کیږي (۱۱-۱ انځور).




۱۱-۱ انځور: د یولسمې هفتې جنین چې کوریون په لرې کیدوسره لوڅ شوی دی.

۲ - ۱۳ نه تر ۱۶ هفتې پورې د جنین عمده تکاملي تغیرات:

پدې وخت کې د جنین وده تیزه وي، په شپاړسمه هفته کې د جنین سر نسبتاً دولسمې هفتې جنین سر ته کوچنی وي سفلې اطراف اوږده شوي وي. د نهایتو حرکات چې د رشيبي دورې په اخر کې شروع کیږي په څوارلسمه هفته کې تنظیمېږي خو پدې وخت کې هم ډیر قرار ه وي او د مورله خوا نه احساسیږي، د نهایتو حرکات د التراساونډ پواسطه دلیدول وړ وي. جنین د هډوکو Ossification پدې مرحله کې ډیر فعال وي او د شپاړسمې هفتې په شروع کې هډوکي د التراساونډ پواسطه واضح شکل لیدل کیږي.

په څوارلسمه هفته کې د سترگو حرکات منځته راځي ، د سر وینښتانو منظره د لیدلو وړ وي .
د جنین جنسیت د ۱۲ - ۱۴ مې هفتې پورې پیژندل کېږي . د غوږونو خارجي برخې د سر په خپل ځای کې ځای نیسي (۱۱ - ۲ انځور)



ج



ب



الف

۱۱ - ۲ انځور : الف شکل د دیارلسو هفتو جنین د سراو اوږې غټ شوی انځور ، ب او ج د شپاړسمې هفتې Fetuses ښايي

۳ - ۱۷ هفتې نه تر ۲۰ هفتې پورې د جنین عمده تکاملي تغیرات

پدې موده کې د جنین وده کمه وي خو بیا هم د جنین CRL تقریبا ۵۰mm په اندازه زیاتیږي . د جنین حرکات (Quickening) معملا دمور پواسطه حس کېږي . پوستکي معمولا د غوړ او پنیر په شان موادو پواسطه پوښل شوی وي Vernix Caseosa . (Vernix caseosa) د جنین پوستکي د امینوټیک مایع له تخریش اوسولیدو څخه ساتي . په شلمه هفته کې د وریځو او سر وینښتان د لیدلو وړ وي . پوستکي په مکمله توګه د Lanugo وینښتانو پواسطه پوښل شوی وي (۱۱ - ۳ الف انځور) ، Brown Fat . پدې دوره کې جوړېږي کوم چې د Infant ماشوم کې د حرارت تولید وظیفه په غاړه لري همدارنګه د شحمي نسج یو ځانګړی ډول د غاړې په بیخ ، د سترنوم شاته او د پښتورګوشاخوا (Perirenal Fat) منځته راځي چې د حرارت تولید وظیفه لري .

په شلمه هفته کې Testis د بطن جوف ته ښکته کیدو شروع کوي . په اتلسمه هفته کې د جنین رحم او Vagina جوړېږي.



۱۱ - ۲ انځور : . په الف شکل کې د اوولسمې هفتې جنین دی اود ب شکل جنین د اوولسمې هفتې جنین قدامي منظره ده . جنین پوستکي لاندې کافي شحم نلري، پوستکي یې ګونځې لري.

۴ - د ۲۱ هفتې نه تر ۲۵ هفتې پورې د جنین عمده تکاملي تغیرات:

پدې دوره کې جنین وزن زیاتېږي ، پوستکي یې معمولاً ګونځې وي اوډیر Translucent وي. به تازه نمونه کې پوستکي ګلابي نه تر سور رنګ لري ځکه چې په کپلریو کې کافي اندازه وینه موجود وي. په یویشتمه هفته کې د سترګو تیز حرکات شروع کیږي، ۲۲ نه تر ۲۳ مې هفتې د سترګو وهلو عکس العملونو راپورونه هم ورکړل شويدي. دسږو اسناحو (Alveoli) جدارونو کې افرازي اپیتل نسج (Type II Pneumocytes) جوړېږي کوم چې Surfactant تولیدوي. د لاسو ګوتو نوکان په ۲۴ مه هفته کې موجود وي (۱۱ - ۳ ب انځور).

که چیرته د ۲۲ نه تر ۲۵ هفتې پورې جنین تولد شي او ښه جدي مراقبت یې تر سره شي ژوندی پاتې کیدای شي خو تنفسي سیستم یې تر اوسه خام وي نو د مړینې کچه یې زیات وي.

که چیرته د ۲۶ مې هفتې نه مخکې تولد شي د Infant ماشومانو عصبي سیستم تکامل خرابېږي او ددې سیستم نیمګړتیاو سبب ګرځي.



ب



الف

۱۱ - ۳ انځور: الف د پنځمې میاشتې جنین دی چې د په ټول بدن باندې د ویښتانو شنه کیدل ښایي او هم پدې وخت کې د خوب او ویښیدلو څرګند سایکل لري ، ب انځور هم د پنځمې میاشتې جنین دی چې نژدې ۸ - ۱۰ انځو پورې اوږدوالی او یو نه تر دوه پونډه پورې وزن لري .



ب



الف


۱۱ - ۴ انځور: دریمې او پنځمې میاشتې جنین په مقایسوي ډول ښودل شويدي . الف د پنځمې میاشتې جنین چې ۱۹ سانتي متره اوږدوالی لري ، ب د دریمې میاشتې جنین ۶ سانتي متره اوږدوالی لري ښایي

۵ - ۲۶ نه تر ۲۹ هفتې پورې د جنین تکاملي تغیرات

که چیرته پدې دوره کې جنین تولد شي معمولا ژوندی پاتې کیږي ځکه چې سږي او رگونو سیستم یې کافي اندازه تکامل کړی وي، مرکزي عصبي سیستم پوښ وي چې د وجود حرارت او تنفسي سیستم منظم حرکات کنټرولولی شي. په نوې زیږیدلو ماشومانو کې د مړینې کچه په Low Birth weight (۲۵۰۰ ګرامه وزن) او په Very Low Birth weight (۱۵۰۰ ګرامه وزن) زیږیدلو ماشومانو کې ډیره ده. په ۲۶ مه هفته کې د سترګو زیرمې خلاصې وي، د Lanugo او سرویښتانو ښه تکامل کړی وي، د پښو نوکان د لیدلو وړوي او پوستکي په کافي اندازه شحم لري، ډیری ګونځې یې د منځه ځي او خوي (Smooth) منظره غوره کوي (۱۱ - ۵ انځور). پدې دوره کې د جنین جسم ۳،۵٪ سپین شحم درلودونکی وي. د جنین توری د وینې جوړولو (Erythropoiesis) عمده برخه وي، د ۲۸ مې هفتې په اخر کې د هډوکو مغز د وینې په جوړول شروع کوي، چې په MRI کې واضح ښکاري (۱۱ - ۶ انځور).




۱۱ - ۵ انځور: ۲۴ مې هفتې جنین چې نرمواو نازکو ویښتانو (Lanugo Hair) وښتانو او Vernix موادو پواسطه پوښل شوی دی.



۱۱ - ۶ انځور: د نارمل جنینونو MRI انځورونه: الف انځور د ۱۸ هفتو، ب انځور د ۲۶ هفتو انځور او ج انځور د ۲۸ هفتو جنین دي.

۶ - ۳۰ نه تر ۳۴ مې هفتې پورې د جنین عمده تکاملي تګیرات

په ۳۰ مه هفته کې Pupillary Reflex (د رڼا په مقابل کې د سترګې کسې قطر تګیرات) موجود وي. معمولاً ددې دورې په اخر کې پوستکي سور ګلابي او ښویه وي، علوي او سفلي اطراف چاغ او ګرده (Chubby) منظره غوره کوي. پدې وخت کې د سپنو شحمو اندازه بدن د وزن ۸٪ ته رسیږي. ۳۲ هفتو له دې نه زیات وخت جنین که له وخته مخکې تولد شي معمولاً ژوندی پاتې پاتې کیږي، که چیرته نارمل وزن لرونکی ماشوم په دې دوران کې وزیږیږي، دا دتاریخ له نظره مخکې د وخته (Premature by date) دی (۱۱ - ۷ انځور).



۱۱ - ۷ انځور: الف انځور د ۳۰ مې هفتې جنین او ب انځور د ۳۲ مې هفتې جنین ښايي.

۷ - ۳۵ نه تر ۳۸ مې هفتې پورې د جنین تکاملي تغیرات

په ۳۵ مه هفته کې جنین کلک او نیونکې منظره لري او د رڼا په مقابل کې عکسل العمل ښايي ، عصبي سیستم کافي پوښ وي چې ټول خپل وظائف تنظیمولای شي . زیادتره Fetus پدې دوره کې (پاې ته رسیدونکې دوره) نیغ وي . په ۳۶ مه هفته کې د سراو بطن برخې محیط (Circumferences) اندازې سره مساوي وي ، وروسته لدې ممکن د گیدې برخې محیط اندازه د سره نه زیاته وي .

په Full Term Fetus یا په وخت پوره جنین کې د CRL طول ۳۶۰ ملي متره وي ، واو وزن یې نژدې ۳۴۰۰ گرامو ته رسیږي ، سپین شحم یې جنین د بدن وزن ۱۶٪ ته رسیږي، د امیدوارې په اخرو هفتو کې د یو جنین شحم په ورځ کې ۱۴ گرامه زیاتیږي . سینې یا Breast راوتلې وي دواړه صديې Breast په کمه اندازه سینې له جدار نه په دواړو جنسونو کې باندې راوتلې وي ، په وخت پوره نارینه جنین کې Testis په سکروټوم کې وي ، نارینه جنین چې د وخت څخه مخکې وي حصې یې سکروټوم ته ښکته شوې نه وي . په Full Term Fetus کې د جنین سر برخه نسبت جسم ته کوچنې وي ، خو بیا هم د بدن لویه برخه وي . نارینه جنین طول او وزن نسبت ښځینه جنین ته زیات وي (۱۱ - ۸ انځور).



ب



الف

۸ - ۱۱ انځور: نارمل تولد شوي ماشومان

۱۱ - جدول: د جنیني ژوند په دوران کې ځینې مهمې تکاملي پېښې .

عمر (په هفتو)	
۷	د خصیو غوټه یا Buds ښکاري
۱۰	بلع کول ترسره کیږي
۱۴ - ۱۶	تنفسي حرکات رامنځته کیږي
۲۴	رودلو حرکات رامنځته کیږي
۲۴ - ۲۶	ځینې اوازونو اوریدل کولی شي
۲۸	سترگې یې د رڼا په مقابل کې حساسې وي

کلینیکي تړاو

Post Maturity Syndrome یا د پوخوالي وروسته سندروم :

د امیدواری اوږدیدل د زیږون اټکل شوې نېټې څخه په ۵٪ نه تر ۶٪ امیدوارو ښځو کې صورت نیسي. دا سندروم د حامله میندو په یو څه ماشومانو کې تکامل کوي او د مړینې کچه پکې زیاتېږي ځکه چې دې میندو کې ولادت تنبه کولو ته ضرورت پیدا کوي. Post maturity Syndrome مریضان وچ او دڅرمې په شان پوستکي لري ، وزن یې زیات وي او Lanugo Heir نلري ، Vernix caseosa کم یا نه وي ، نوکان یې اوږده وي او ویښتان یې زیات وي.

هغه فکتورونه چې وده اغیزه کوي.

جنین د ودې او انرژي لپاره موادو ته ضرورت لري ، گازات او غذايي مواد په ازاده توګه د پلاسنتیا پردې له لارې تیرېږي .

ګلوکوز : جنین ودې او انرژي میتابولیزم لپاره لمرنۍ سرچینه ده ، امینو اسیدونو ته هم ضرورت لري. دغه مواد د مورنۍ وینې څخه د پلاسنتیا دلارې جنین ته تیرېږي. د ګلوکوز مصرف لپاره انسولین ته ضرورت لري چې دجنین پانقراص پواسطه تولیدېږي ، مورنۍ انسولین په کافي اندازه جنین ته نه رسیږي ځکه چې دغه هارمون د پلاسنتیا پردې د لارې په نسبي ډول تیرېږي. انسولین ، Insuline like growth factore ، انساني Growth Hormone او ځینې کوچني پولي

پیتایدونه (لکه Somatomedin C) په هکله فکر کېږي چې د جنین وده تنبه کوي. ډیر فکتورونه دي چې ولادت څخه مخکې وده اغیزمنه کوي ، مورني ، جنيني او محيطي ځينې فکتورونه دي چې د اميدوارې په ټول دوران کې جنين اغيزمن کولی شي لکه مور د رگونو ناروغۍ ، د رحم انتانات ، سيگرټ څکول او دالکولو استعمال ، دپته ميلان لري چې داخل الرحمي ودې محدودوالي (Intra Uterine Growth Retardation) يا Small for Gestational Age لامل شي. ځينې فکتورونه د د اميدوارۍ په اخرو درې مياشتو کې عمل کوي ، لکه مورنۍ سوي تغذي چې په معمول ډول ددې ميندو ماشومانو وزن کم وي ، اوږدوالی او د سر اندازه يې پوره وي.

سيگرټ څکول :

سيگرټ څکول د IUGR ښه منل شوی لامل دی . د اخرو شپږو نه تر اتو هفتو په دوران کې د جنين د ودې اندازه په هغو ميندو کې چې سيگرټ څکوي نسبت نارمل ميندو ته کمه وي . په منځني ډول د ولادت وزن په هغه ماشومانو کې چې مور يې سيگرټ څکونکې وي د نارمل نه ۲۰۰ کرامه کمه وي ، مور سيگرټ څکولو اغيزې په جنين باندې نسبت هغې مور ته چې کافي غذايي رژيم نه اخلي زياتې دي.

دولسم څپرکی

کورین ، امینون ، Decidua او پلاسنتا


کورینون یا Chorionic palate :

په دوهمه هفته کې ټروفوبلاست حجرات په دوه طبقو کې تنظیمیږي چې یوه یې داخلي منظمه یوه هستوي حجراتو طبقه د سایټوټروفوبلاست یا Langhans Layer ده او بله یې بیروني غیر منظمه څو هستوي حجراتو طبقه چې ساینسیشیم یا Plasmodium تروفوبلاست طبقه ده. همدارنګه درشیم خارجي میزودرم هم په دوهمه هفته کې په دوه طبقو تقسیمېږي ، د خارجي میزودرم هغه طبقه چې سایټوټروفوبلاست طبقې سره په تماس کې پاتې کیږي خارجي میزودرم Somatopleuric layer ده . د خارجي میزودرم دوهمه برخه رشیم ، امینیوټیک جوف جدار او Yolk sac سره په تماس کې وي خارجي میزودرم Splenchnopleuric layer ده.

کورینون یا Chorionic palate د خارجي میزودرم سومایټیک طبقه د ټروفوبلاست حجراتو سره یوه ځای کورینون یا Chorionic palate بلل کیږي ، له کورینون څخه ګڼ شمیر د ګوتو په شان جوړښتونه وده کوي چې Chorionic Villi بلل کیږي . Chorionic Villi د موجودیت او نه موجودیت له نظره کورینون په دوه برخو تقسیم شوی دی.

۱ - Chorion Leave یا smooth : تر اتمې هفتې Chorionic Villi د جنین په ټول کورینون کې قرار لري ، د اتمې هفتې نه وروسته Decidua Capsularis وینې جریان کمیږي او ددې لاندې کورینون برخې Chorionic Villi کوچنۍ کیږي او د منځه ځي چې ددې برخې کورینون خویه پاتې کیږي چې دا کورینون Chorion smooth یا Chorion Leave بلل کیږي.

۲ - Chorion Frondusum : هغه Chorionic Villi چې د Decidua Basalis په طرف قرار لري وده کوي او د پلاسنتا جنیني برخه جوړوي Chorion Frondusum په نوم یادېږي (۱۲ - ۱ انځور).



۱۲ - ۱ انځور: کوریون ، Chorionic Frandusum ، Chorionic Leave ، او Chorionic Sac انځورونه

Chorionic Cavity

د Extra Embryonic Mesoderm دواړو طبقو Somatiopleuric layer او Splechnopleuric layer ترمنځ جوف د کوریون جوف څخه عبارت دی چې Extra Embryonic Coelum هم بلل کیږي

امنیون او امنیوتیک مایع :


امنیون یو عشاځي کڅوړه ده چې رشیم او وروسته جنین احاطه کوي. د امبلیکل کارډ اپیتل پوښ جوړوي چې دا اپیتیل حجرات د مایکرو ویلای لري چې دامنیوتیک مایع په تبادله کې مهم رول لري.

په شروع کې یو مقدار امنیوتیک مایع د امنیوتیک حجراتو پواسطه افرازیږي مگر په زیات مقدار د مورنۍ وینې څخه فلتر کیږي. د حمل په وروستیو کې جنین هره ورځ نیم لیتر په اندازه ادرار امنیوتیک مایع ته اطراح کوي. د امنیوتیک مایع اندازه په تدریجي ډول د رشیم او جنین ودې سره زیاتیږي ، په لسمه هفته کې ۳۰ ملي لیتر ، په شلمه هفته کې ۳۵۰ ملي لیتر او په اوه دیرشمه هفته کې ۱۰۰۰ ملي لیتر ته رسیږي . که چیرته په دریم ترایمستر کې یې اندازه د ۴۰۰ ملي لیترو کمه شي Oligohydramnios بلل کیږي چې جنین د پښتورگو Renal Agenesis او د پلاستیا دوران په کموالي باندې دلالت کوي. که چیرته د امنیوتیک مایع اندازه د ۱۵۰۰ - ۲۰۰۰

ملي لیتره یا لدې څخه زیاتېږي Polyhydramnios بلل کیږي چې عمده سبب یې د جنین پواسطه د امنیوتیک مایع نه بلع کولو څخه عبارت دی چې د عصبي سیستم سو تشکلاتو لکه Anencephaly او یا هم Esophageal Atresia په نتیجه کې رامنځته کیږي. (۱۲- ۲ انځور).

د امنیوتیک مایع اهمیت او وظیفه :


- د امنیون پردې سره درشیم د نښلیدلو څخه ساتي
- رشیم د هغه ضربه څخه چې مور ورسره مخ کیږي او همدارنگه د ولادت په اولو وختو کې د عضلي تقلصاتو په نتیجه کې رامنځته کیږي څخه ساتي
- د رشیم حرارت درجه کنټرولوي.
- رشیم په امنیوتیک مایع کې په ازادانه ډول حرکات کولی شي پدې ترتیب د اسکلیټي عضلاتو انکشاف تامین کې رول لري.
- د امنیوتیک مایع په معاینه کولو سره د رشیم پوخوالی یا Maturation او هم د ځینو ناروغیو په پیژندلو کې کومک کوي.
- د جنین د ادرار او Meconium لپاره یو محیط دی.



۱۲- ۲ انځور : د جنین عشاوو انځورونه ښايي.

: Decidua and Decidual Reaction

په دوهمه هفته کې بلاستوسیسټ د رحم اندومیتریوم وظیفوي طبقه کې غرس کیږي چې اندومیتریوم د بلاستوسیسټ غرس کیدو سره اډیمایي کیږي چې لدې وروسته اندومیتریوم Decidua بلل کیږي او د رحم اډیمایي کیدلو عمل ته Decidual Reaction وایي. Decidua په اندومیتریوم کې د بلاستوسیسټ غرس کیدو موقعیت ته په درې برخو کې تقسیمېږي، هغه برخه چې د غرس شوي بلاستوسیسټ لاندې قرار لري Decidua basalis، هغه برخه چې غرس شوي بلاستوسیسټ د پاسه قرار لري Decidua Capsularis او د اندومیتریوم پاتې برخې Decidua Paritalis بلل کیږي (۱۲ - ۳ انځور)



۱۲ - ۳ انځور: الف انځور د کوریونیک Villi او کوریون کڅوړې دی، ب انځور د Decidua درېواړه برخې ښايي، ج او د انځورونه د امنیون کوریون او Decidua مختلفې برخې ښايي.

د پلاستېا تکامل

پلاستېا د مور او جنین ترمنځ مشترک جوړښت دی چې یوه برخه یې جنین او بله برخه یې د رحم اندومیتریوم پواسطه جوړېږي او جنین ودې او تکامل لپاره د مور وینې دوران څخه ټول ضرورت وړ مواد برابروي او د جنین پواسطه اضافه تولید شوي مواد له جنین څخه مورني دوران ته لیږدوي.

Placenta د یوناني کلمې Plakaus څخه اخیستل شوې چې هموار کیک یا ډیسک په معنی ده دې ۱۲ - ۱۵ سانتي متره قطر، ۳ سانتي متره ضخامت او ۵۰۰ - ۱۰۰۰ گرامه وزن لري . مکمله جوړه شوې پلاسنتیا د رحم جوف ۱۵ - ۳۰ فیصده سطحه احاطه کوي چې درحم جوف له توسع سره په یو وخت دا هم غټیږي . نیم ساعت وروسته د ماشوم د ولادت څخه رحم له جدار څخه جدا او خارجيږي .

پلاسنتیا د تروفوبلاست حجراتو سریع تقسیم ، Chorionic Sac او Chorionic Villi په رامنځته کیدو سره شروع کوي ، ددریمې هفتې په اخر کې رشیم فزیالوژیک ضرورت زیاتیدو په منظور تنظیميږي او ځانگړې اناتوميک منظره غوره کوي . څرنکه چې مخکې مو یاده کړه چې پلاسنتیا د مور او ماشوم ترمنځ گډ جوړښت دی نو ویلای شو چې پلاسنتیا له دوه برخو نه جوړه ده چې په لاندې ډول دي .

۱- Fetal Part of Placenta

دپلاسنتیا دا برخه دجنین له Chorion او Chorionic Villi څخه جوړه ده .


ب — د Chorionic Villi یاد کوریون ذغاباتو جوړیدل : نوموړي ذغابات درشیم تروفوبلاست حجراتو پواسطه د Decidua په طرف رشیم په ټول محیط کې منځته راځي . کوریونیک ذغابات (Chorionic Villi) تروفوبلاست د دوه طبقو او Extra embryonic mesoderm جوړیږي او په درې مرحلو کې تکمیلیږي چې په لاندې ډول دي .

۱- Primary Villi : ددې ذغاباتو په مرکزي برخه کې Cytotrophoblast وي او د Syncytium trophoblast پواسطه احاطه شوي وي .

۲- Secondary Villi : پدې مرحله کې درې طبقې لري چې په ترتیب سره داخل نه خارج ته خارجي رشیمي میزودرم ، سایتو تروفوبلاست او Syncytium Trophoblast څخه دي (۱۲ - ۱۴ انځور) .

۳- Tertiary Villi : دوهمې Villi ته ورته دي خو په منځ کې موجوده میزودرم دوینې رگونه جوړوي . Chorionic Villi تر اتمې هفتې پورې درشیم په ټول محیط کې موجودې وي وروسته له اتمې هفتې څخه یوازې Decidua Basalis په طرف پاتې کیږي چې دپلاسنتیا جنیني برخه جوړوي .

لمړنۍ جوړې شوې Villi په جنیني طرف کې د جنیني مزودرم پورې نښتې وي او مورنې خوا کې Cytotrophoblastic Shell پواسطه پوښل شوې وي نو ځکه دیته Anchoring Villi هم وایې (۱۲ - ۴ انځور). Anchoring Villi ګڼ شمیر څانګې ورکوي چې د ازادو ذغابو په شکل Intervillous space ته نمو کوي. همدارنګه د Intervillous space له کوریونیک اړخ څخه نوي Villi هم راتوکېږي په اخر کې نژدې ټول Intervillous space له Villi څخه ډکېږي. په پایله کې د مورنې او جنیني دورانونو تر منځ د موادو تبادلي لپاره موجوده ساحه زیاتېږي (۱۲ - ۴ انځور).




۱۲ - ۴ انځور: Stem او Branch Villi انځورونه .

۲- Maternal Part of Placenta


دا برخه د رحم اندیومیټریوم د Decidua Capsularis پواسطه جوړېږي. پلاسنتا د مورني اړخ څخه Intervillous space ته پردې (Placenta Septa) نمو کوي او په یو شمیر لوبونو ویشل کېږي چې هر لوب ته یې Maternal Cotyledon وایي، او په یوه مکمله جوړه شوې پلاسنتا کې یې تعداد ۱۵ - ۳۰ پورې رسېږي. ددې حجابونو قاعدې دمیزابو په شکل ښکاري خو په خپله Cotyledon د محدبو ساحو په شکل لیدل کېږي چې دهمدې میزابو پواسطه احاطه شوي وي.

د پلاسنتا هر فص یا لوب دوه یا زیاتې Anchoring Villi یا Stem Villi اودهغې Branch Villi لري داډول یوه Stem Villi اودهغې څانگې Fetal Cotyledon څخه عبارت دی. یوه مکمله جوړه شوې پلاسنتا دا ډول ۶۰ – ۱۰۰ پورې Fetal Cotyledon لري پدې وخت کې پلاسنتا یوه متراکمه کتله وي اود ټیکلي شکل لري (۱۲ – ۵ انځور).



۱۲ – ۵ انځور: د پلاسنتا مورنۍ برخې Septa او د پلاسنتا جریان ښايي.

د څلورمې میاشتې په اخر کې ټول Decidua Basalis په Cotyledone معاوضه کیږي او Decidua Capsularis د Chorionic Sac خارجي سطحه جوړوي. د Chorionic Sac په غټیدو سره Decidua Capsularis رحم جوف نه خارجيږي، ډیره نرې کیږي او بالاخره د Decidua Paritalis سره تماس پیدا کوي. د ۲۲ – ۲۴ هفتو پورې د Decidua Capsularis د وینې جریان کمیږي او له منځه ځي یوازې Chorionic Leave د Decidua Paritalis سره په تماس کې پاتې کیږي. پدې انځورونو کې پلاسنتا، Umbilical cord او Decidua ښودل شويدي (۱۲ – ۶ انځور)




۱۲ - ۶ انځور: د Decidua درې واړه برخې او مکمله جوړه شوې پلاستېا پکې ښوده

شویده .

Placental Membrane

په پلاستېا کې مورنې وینه په Intervellious space او جنیني وینه د Chorionic Villi د وینې په رگونو کې دوران کوي چې پدې ډول سره مورنې وینه د جنین له وینې سره نه گډېږي. دواړه وینې د Villi دیوال د طبقو پواسطه یوله بل نه جدا شويدي، همدا د Chorionic Villi دیوال طبقې د پلاستېاد غشا څخه عبارت دی. تر شلمې هفتې پورې نوموړې غشا څلور طبقې لري چې Syncytium trophoblast، سائیتو تروفوبلاست، د Villi منضم نسج او د Villi شعريه رگونو اندوتیلیوم دی. د شلمې هفتې څخه وروسته په Villi کې حجروي تغیرات منځته راځي داسې چې سائیتو تروفوبلاست طبقه نرې کیږي بلاخره له منځه ځي او یوازې د Syncytium trophoblast نرې طبقه پاتې کیږي چې د شلمې هفتې نه وروسته دا غشا درې طبقې لري، خو په ځینو ځایو کې Syncytium تروفوبلاست له منځه ځي، د Villi شعريه رگونو اندوتیلیوم د مورنې وینې سره مستقیما په تماس کې پاتې کیږي. ددې غشا ټول مساحت له ۴ - ۱۴ متره مربع دی چې د کاهل شحص دهضمي قنات د جذب دساحې سره برابر دی. د پلاستېا پردې پنډوالی په لمړیو کې ۰.۲۵mm وي او په اخره کې یې پنډوالی ۰.۰۲mm ته راکمیږي چې پدې نري کیدوسره ددې غشاموثریت زیاتېږي (۱۲ - ۷ انځور).




۱۲ - ۷ انځور : Placental Membran انځور

Placental Circulation

د Syncytium Trophoblast د Lacunar Space له لارې د وينې جريان د حاملگۍ په نهمه ورځ (دويمه هفته) کې شروع کوي . لدې وروسته Intervillous Space په رامنځته کيدو سره مورنې وينه دې Intervillous Space ته له مورني شريانونو څخه داخليږي ، د وينې فشار يې Chorionic Plate ته ټيله کوي او بيرته وينه لدې مسافو څخه دپرانستل شوو وريدونو پواسطه خارجيږي (۱۲ - ۵ انځور).

بشپړه جوړه شوې پلاسنتيا په Intervillous Space کې نژدې ۱۵۰ ملي ليتره وينه شتون لري چې په هرو ۱۵ - ۲۰ ثانيو کې معاوضه کيږي . جنين وينه د Umbilical Cord شريانونو پواسطه لمړۍ د پلاسنتيا Chorionic Plate وينې رگونو ته او بيا Chorionic Villi شعريه رگونو ته ویشل کيږي او بيرته د پلاسنتيا کوريونیک پليټ وريدونو ته او له دې وريدونو نه Umbilical Veins پواسطه جنين ته انتقالیږي . د جنين وينه دمورنې وينې څخه د پلاسنتيا ممبران پواسطه جدا شويده (۱۲ - ۵ انځور)



۱۲-۶ انځور : مکمله جوړه شوې پلاسنتا الف انځور د جنیني برخې او ب انځور د مورنۍ برخې پلاسنتا دی..

Umbilical Cord یا خبل سروي :

امبلیکل کارډ معمولا پلاسنتا جنیني برخې مرکزي برخې سره نښتی وي خو کیدلی شي چې پلاسنتا له څنډو سره هم نښتی وي . امبلیکل کارډ معمولا ۱-۲ سانتي متره قطر او ۳۰-۹۰ سانتي متره اوږدوالی لري (۱۲-۶ انځور).

امبلیکل کارډ دوه شریانونه او یو ورید لري چې یو ډول مخاطي نسج Wharton's Jelly پواسطه پوښل شويدي.

د پلاسنتا وظایف : لاندې درې عمده دندې لري.

الف - Transport Function : پلاسنتا د دواړو خواوو ترمنځ د موادو په تبادله کې رول لري.

ب- Endocrine Function : پلاسنتا پواسطه ځینې هارمونونه تولیدیږي چې ابتدايي مواد یې د جنین یا مور پواسطه جوړیږي او هارمونونه ترې د پلاسنتا د Syncytium trophoblast پواسطه منځته راځي . معمولا پروتیني او سټرایډ هارمونونه جوړوي چې په لاندې ډول دي .

۱- Human Chorionic Gonadotropin Hormone (HCG) :

ددې هارمون تاثیرات د نخامیه غدې LH سره ورته دي چې د تخمدان په زیر جسم باندې تاثیر لري او تر درې میاشتو پورې یې له استحالې څخه ساتي . نوموړې د ادرار له لارې

اطراح کیږي چې د حمل په لمړیو کې په ادرار یا وینه کې د حمل معلومولو لپاره د یوې معاینې په ډول کارول کیږي.

۲- Human Chorionic Somatotropin Hormone (HCS) :

دا هارمون Somatomamotropin یا Placenta Lactogen هم بلل کیږي ، په مور باندې دانسولین ضد اغیزې لري چې د مور وینې په پلازما کې د گلوکوز او امینو اسیدونو سویه لوړوي پدې شکل جنین لپاره موادو شتون زیاتوي ، د جنین له خوا د گلوکوز مصرف زیاتوي . همدارنگه مور ثدیو وده زیاتوي او د Lactation لپاره یې آماده کوي .

۳ - پروجسټرون او استروجن هارمونونه:

نوموړي هارمونونه درې یا څلورو میاشتو پورې د تخمدان زیر جسم پواسطه جوړیږي لدې وروسته د پلاسنټا پواسطه تر ولادت پورې جوړیږي ، د یادولو وړ ده چې نوموړي هارمونونه د حاملگۍ دوام لپاره اړین دي

ج _ Metabolic Function : د حاملگۍ په شروع کې پلاسنټا گلايکوجن ، کولسټرول او شحمي اسیدونه جوړوي چې درشیم او جنین لپاره د غذا او انرژۍ منبع جوړوي .

کلینیکي تړاو

د پلاسنټا پواسطه تولیدیدونکي Human chorionic gonadotropin hormone (HCG) تاثیرات د نخامیه غدې د LH هارمون سره یوشان دي. HCG هارمونونه د مورني ادرار له خوا اطراح کیږي چې د حمل په اولو وختو کې د حمل معلومولو لپاره دیوې معاینې په ډول کارېږي.

Human Chorionic Somatomamotropin (HCS) هارمون په مور باندې دانسولین ضد اغیز لري چې د مورني دوران په پلازما کې د گلوکوز او امینواسیدونو سویه لوړوي . په دې ډول د جنین لپاره ددې موادو شتون زیاتوي همدارنگه د جنین لخوا د گلوکوز مصرف زیاتوي.

Placenta Praevia : پلاسنټا په مکمل ډول یا په نیمگري ډول د رحم جوف ښکتنې برخې (د Cervix داخلي سورې ته نژدې) پورې نښتې وي چې دا ډول نښتې اېنارمل دي او Placenta Praevia بلل کیږي . دا د تولد په وخت کې ستونزې رامنځته کوي او ممکن د شدیدې خونریزۍ لامل شي.

ديارلسم څپرکی

غبرگونتوب يا دوگا نګي (Twinning)


او جنيني غشاوې (Fetal Membrane)

په يو وخت کې د دوه ماشومانو زيږيدو ته غبرگونتوبی يا Twins وايي، کله کله په يو وخت کې درې (Triplets)، څلور (Quadruplets) يا لدې هم زيات ماشومان تولد کيږي. په دوگانګيو کې جنيني غشاوي او جنيني جوفونه د دوگانګيو نوعې او د دوگانګيو رامنځته کيدو وخت پورې اړه لري. ټولو ژونديو تولد شوو ولادتونو ۳٪ يې دوه ګوني ولادتونه منځته راځي، غبرگونتوب په دوه ډوله دي.

د ټولو غبرګونو ماشومانو ۳/۲ برخې Dizygotic Twins او ۳/۱ برخې Monozygotic Twins تشکيلوي. Dizygotic Twins په مختلفو نژادونو کې فرق لري لکه په امريکا متحده ايالاتو کې په سپين پوستکو کې ۱،۰۸٪ او په تورپوستو کې ۱،۳۶٪ ده، مګر په مونوزايګوټيک دوگانګي په ټولو انسانانو کې يو شان ده. همدارنګه ډايزايګوټيک غبرګونتوب د ښځو عمر په زياتيدو سره زياتيږي مګر مونوزايګوټيک غبرګونتوب د ښځو په ټول عمر کې يو شان ده. ډايزايګوټيک غبرګونتوب په فاميلونو او نسلونو کې په ارثي ډول تکراريږي او انتقالیږي. څيړنو ښودلې ده چې ډايزايګوټيک غبرګونتوب فاميلي او ارثي انتقال مورني جينوتايب پورې اړه لري. همدارنګه دا هم مطالعاتو پواسطه ښودل شويده چې په هغه ميندو کې چې لمړنی تولد يې ډايزوګوټيک Twins وي په راتلونکو ولادتونو کې هم د دوه ګونو او څوګونو ماشومانو زيږون چانس زيات دی.

۱- Dizygotic Twins : د دوگانگیو دوه په درې (۷۰٪) برخه Dizygotic Twin

جوړوي ، چې په هرو ۱۰۰۰ ولادتونو کې ۷ نه تر ۱۱ پورې تصادف کوي .
په هغه حالاتو کې چې په یو وخت کې دوه تخمې ازادې شي ، دواړه د جدا جدا سپرمونو پواسطه القاح شي او په معمول ډول دواړه انکشاف وکړي (Dizygotic(Fraternal) Twins بلل کېږي . دا چې هریو یې له جلا تخمې او جلا سپرم څخه رامنځته کېږي هر یو یې جلا جنیټیکي ترکیب لري دداسې دوه گونو جنس ممکن ورته یا ورته نه وي او په قواره کې هم دومره ورته والی ولري لکه د همدې والدینو نور ماشومان . هر زایگوت په رحم کې جدا جدا غرس کېږي او معمولا هر یو یې جدا جدا امینوټیک او کوریونیک کڅوړې او بیلا بیلې پلاسنتا گانې لري . کله کله دواړه پلاسنتا گانې یوبل سره ډیرې نژدې وي او سره یوځای کېږي ، همدارنگه د کوریونیک کڅوړې هم ممکن یوبل سره نژدې او بلاخره سره و نښلي (۱۳ – ۱ انځور).




۱ – ۱۳ انځور: Dizygotic Twins انځورونه

۲- Monozygotic Twins : که دوه گوني ماشومان له یوې القاح شوې تخمې څخه

رامنځته شي Monozygotic (Maternal) twins یا Identical twins بلل کېږي دا ډول دوگانگي د ټولو دوگانگيو ۳۰٪ تشکیلوي . په هر ۱۰۰۰ تولد شوماشومانو کې ۳ نه تر ۴ پورې تصادف


کوي. زایګوټ په مختلفو مرحلو کې جدا کیږي او څو نور زایګوټونه منځته راوړي، دا ډول دوگانګي نظر تقسیماتو او جدا کیدو وخت ته په لاندې ډول دي .

الف : څرنګه چې زایګوټ د لمړني تقسیماتو په وخت کې زایګوټ هره حجره ددې وړتیا لري چې په جدا جدا رشیم باندې تکامل وکړي (Totipotent) . که چیرته زایګوټ د لمړنۍ تقسیم په وخت کې (Two cell stage) حجرات جدا شي، یو بل نه بیلېږي او جدا جدا زایګوټ منځته راوړي ، هره یوه یې په رحم کې جدا غرس کیږي او د Dizygotic twins په شان هره یوه یې خپله پلاسنتا او جدا کوریونیک جوف جوړوي او کومه دوگانګي چې پدې ډول منځته راځي . دواړه جنینونه یو بل سره مشابه وي ، ورته والې یې د وینې ګروپ ، Fingerprints ، جنس او خارجي منظرې نه لکه د سترګو او دوینستانو رنګ له مخې معلومیږي داسې چې دواړه سره ډیر نژدیوالی لري . چې په لاندې شکل ښکاري (۱۳- ۲ انځور)



۱۳- ۲ انځور: دوه حجروي مرحله کې مونوزایګوټیک دوگانګي رامنځته کیدو مرحلې.


ب : په هغه صورت کې چې رشیم تر مرولا پورې نورمال ډول خپله وده وکړي او د بلاستوسیت جوړیدو په وخت کې په دوه Inner Cell Mass تقسیم شي یعنې په یو بلاستوسیسټ جوف کې دوه امبریوبلاست منځته راشي ، هریو یې په یو بشپړ جنین تکامل کوي . پدې حالت کې دواړو کوریونیک کڅوړه او پلاسنتا شریکې وي خو امنیوتیک جوفونه یې جدا جدا وي (۱۳- ۳ انځور).



۱۳- ۳ انځور: د Inner cell mass رامنځته کیدو په مرحله کې مونوزاگوتیک رامنځته کیدو مرحلې .

ج : په ډیرو کمو حالاتو کې دوه طبقې رشیمي ټیکلې د Primitve streak جوړیدو نه مخکې جدا شي او د بلاستوسیسټ Inner Cell Mass کې دوه جنیني ټیکلي رامنځته شي .
Prochordial Plate او Primitive Streak یې د هریوه جدا جدا وي ، دواړه یوه پلاسنتا ، مشترکه کوریونیک جوف او مشترکه امنیوتیک کڅوړه لري (۱۳- ۴ انځور).
که چیرته پدې ډول دوه گونو ماشومان کې کوریون مشترک وي ، دواړه به یوه پلاسنتا او جدا جدا Umblical Cord ولري . په هغه صورت کې چې ددوه گونو ماشومانو کوریونیک کڅوړې جدا وي دواړه به جلا پلاسنتا گانې اوبیل Umblical cord ولري .
دوگانگي ممکن له دوو په زیاتو برخو د یو زایگوت تقسیمیدو ، یا له دوو زیاتو تخموا القاح کیدو او یا ددې دواړو فکتورونو د یوځای کیدو په نتیجه کې د دوو نه زیاتو ماشومانو رامنځ ته کیدو لامل شي .

د ډیرو ماشومانو تولد په ډیرو کمو حالاتو کې (۱/۷۶۰۰ حاملګي) منځته راځي همدارنګه څلورو ، پنځو او زیاتو ماشومانو تولد او تکامل هم ډیر کم دی .
هغه میندی چې ګوناد تروپین هارمونونه (Fertility drugs) د Ovulatory failure په خاطر استعمالوي د زیاتو تخمو ازادیدو باعث ګرځي چې په نتیجه کې د ډیرو ماشوماتو تولد چانس زیاتوي.



۱۳ - ۴ انځور: د Primitive Streak رامنځته کیدو په وخت کې مونوزایګوټیک دوګانګي او عشاوي.

د دوه ګونو ماشومانو جنیني عشاوي (Fetal membranes in Twin) :

په نورمال ډول هر رشیم خپل امنیون ، کوریون او پلاسنتا لري ، مګر کله کله پلاسنتا یو بل سره وصل وي . معمولاً هر رشیم په کافي اندازه وینه تر لاسه کوي مګر په ځینو حالاتو کې دواړو تر منځ لوي شنت موجودوي چې یوه ته د وینې جریان زیات او بل ته کم وي .

په Dizygotic twins کې هر یورشیم جدا جدا کوریون ، امنیون او پلاسنتیا لري . په Monozygotic twins کې که دوگانګې د cell stage ۲ مرحله کې رامنځته شي د Dizygotic twins په شان هر رشیم خپل کوریون ، امنیون او پلاسنتیا لري . که مونوزایګوټیک دوگانګې د Inner cell mass جوړیدو په مرحله کې داسې رامنځته شي چې هره داخلي حجروي کتله یو بل نه جدا شي ، پدې حالت کې به دواړه مشترک کوریون ، مشترکه پلاسنتیا، جدا امنیون او جدا Umbilical cord ولري. که مونوزایګوټیک دوگانګې د Inner cell mass په ورستیو مرحلو رامنځته شي نو دواړه رشیمونه به یو کوریون ، یو امنیون او یوه پلاسنتیا ولري.

کلینکي تړاو

د دوگانګیو نقیصه (Twin Defects) :

په Twin pregnancies کې Perinatal معیوبیت ، مړینو او مخکې د وخت څخه ولادت ډیر واقع کیږي . نژدې ۱۲٪ Premature تولدشوي ماشومان دوه ګوني وي ، او دوه ګوني ماشومان معمولا د ولادت په وخت کې کوچني وي (د وزن له نظره کم وي یا Low birth weight) . دوه ګوني Premature ماشومانو د مړینې خطر زیات وي چې تقریبا ۱۰ - ۲۰ فیصدو پورې مړه کیږي چې پدې ډول چې د Single نویو زیږیدلو ماشومانو کې د مړینې کچه ۲ فیصده ده . ډیر دوه ګوني ماشومان مخکې لدې چې تولد شي مړه کیږي چې دځینو مطالعو ښودلې چې یوازې ۲۹ فیصده Twins لرونکې حامله ښځې دواړه ماشومان ژوندي زیږوي .

Vanishing twins : دا اصطلاح ددوه جنینوله جملې نه د یو جنین مړه کیدلو لپاره

استعمالیږي . دا معمولا په لمړۍ یا د دوهم ټرایمسټر په اولووختونو کې له منځه ځي .

Transfusion Syndrome : د دوه ګونو ماشومانو د مړینې بل عمده علت


Transfusion syndrome دی، کوم چې ۵ - ۱۵ فیصده په Monochorionic monozygotic

twins کې تاسس کوي . پدې حالت کې چې پلاسنتیا مشترکه وي ددواړو رګونه یوبل سره انستوموز کوي داسې چې یوجنین ته د وینې جریان زیات صورت نیسي او په مقابل کې بل جنین ته د وینې دوران کميږي ، بلاخره یوجنین غټ او بل کوچنی پاتې کیږي (۱۳ - ۵ انځور) . خو ددې سندروم نتیجه خرابه ده داسې چې ۶۰ - ۱۰۰ فیصده حالاتو کې دواړه مړه کیږي.



۱۳ - ۵ انځور: دا انځور د هغه مونوزایگوتیک مونوکرومیک دوگانګي دی چې رګونو ترمنځ یې ترانسپیوژن سنډروم پکې تاسس کړی دی او په نتیجه کې یو جنین غټ او بل کوچنی پاتې دي.

Conjoined (Siamese) twins : که چیرته درشیم دوه کیدل د تکامل په وروسته وختو کې په ځانګړي ډول د Primitive node او Primitive streak جوړیدو په وخت کې صورت ونیسي ، ددې امکان شته چې دواړه یوبل څخه سم جدا نشي او ځینې برخې یا ډیرې برخې یوبل سره نښتې پاتې شي چې پدې ډول د Conjoined یا وصل شو دوگانګیو رامنځته کیدولامل ګرځي (۱۳ - ۶ انځور).



۱۳ - ۶ انځور: دا انځورونه د Conjoined twins مختلف ډولونه ښايي.

Superfecundation : د هغه حالت څخه عبارت دی چې په یو وخت کې دڅو تخمو القاح کیدل د څو نارینه جنسونو سپرمونو پواسطه صورت ونیسي ، یعنې په یو ښځینه جنس کې په یو وخت کې څو تخمې ازادې شي او بیا دا ښځینه جنس په څو ساعتونو کې له څو نارینه جنسونو سره یوځای شي او نوموړې ازادې شوې تخې د څو مختلفو نارینه جنسونو سپرمونو پواسطه القاح شي ، چې دا عمل په ځینو تي لرونکو حیواناتو لکه سپي او پیشو گانو کې تر سره کیږي مگر په انسانانو کې څو کاله مخکې په جرمني کې یوې واقعې راپور ورکړ شوی دی. یو ې ښځې ډایزاګوټیک غبرګونې ماشومان تولد کړي وو او بیا دې ښځې ادعا کړې وه چې چې یو ماشوم پلار یو کس او بل ماشوم پلار یې بل کس ښودلی وو چې وروسته له جنیټیکي معلوماتو ترلاسه کولو څخه معلومه شوه چې یو ماشوم جنوټایپ له نظره په یو کس او بل یې په بل کس پورې ارتباط درلوده ، دې ښځې د څو ساعتونو په موده کې ددې دوه کسانو سره جنسي عمل ترسره کړی وو.

Superfetation : دیو حامله ښځې په رحم کې د یو یا زیاتو بلاستوسیستونو غرس کیدلو څخه عبارت دي چې په ځینې تي لرونکو حیواناتو کې صورت نیسي ، مگر په انسانانو کې چې حمل صورت ونیسي نورې تخې نه ازادیږي نو ځکه په انسانانو کې ناممکن لري.

څوارلسم څپرکی

Parturition یا زیږونه

د حاملګۍ په لمړیو ۳۴ - ۳۸ هفتو کې د رحم مایومیتريوم غضلات د زیږون Signals په مقابل کې کوم جواب نه وایي. د حاملګۍ په ورستیو دوو نه تر څلورو هفتو کې د زیږون شروع کیدو لپاره د رحم په انساجو کې گذري ډول (Transitional Phase) تغیرات منځته راځي. ددې مرحلې په اخر کې د رحم پورتنې برخې مایومیتريوم غضلات ضخیمېږي، د رحم ښکتنې برخې او Cervix انساجو کې نرموالی او نرې کیدل منځته راځي.

هغه فکتورونه چې زیږون تنبه کوي په پوره ډول ندي پیژندل شوي، مګر ډیر هارومونونه معلوم شوي چې د رحم تقلصاتو شروع کوي، د جنین هایپوتلاموس Corticotrophin-releasing hormone افرازي چې د نخامیه غدې قدامي فص نه Adrenocorticotropine هارمون جوړوي او د جنین Suprarenal Gland کورټیکس نه Corticol جوړوي، Corticol د استروجن هارمونو په جوړولو کې رول لري. دا سټیرایډ هارمونونه د رحم تقلصات تنبه کوي.

رحم د Smooth muscles پرېستالټیک حرکات د Oxitocin هارمون پواسطه چې د نخامیه غدې Neurohypophyse نه جوړېږي ترسره کېږي. د ضرورت په وخت کې اوکسیټوسین هارمون په کلینیک کې هم د زیږون د شروع لپاره توصیه کېږي. اوکسیټوسین هارمون د Deciduas څخه Prostaglandin ازادوي چې د زړه عضلې مایوکارډیوم حساسیت د اوکسیټوسین په مقابل کې زیاتوي او په نتیجه کې د زړه د عضلې تقلص زیاتوي. Estrogen هم د زړه تقلصی قدرت زیاتوي او هم د اوکسیټوسین او د پروستاګلانډین افراز زیاتوي. هغه مطالعات چې په میږو او نورو حیواناتو کې ترسره شوي، ښایي چې زیږون مستقیماً د جنین تر کنټرول لاندې دي.






زیږون یا ولادت په درېو مرحلو ت تر سره کېږي:

الف - Stage-۱ درحم Cervix canal نرمیدلو او پراخیدلو مرحله: دا مرحله د رحم Cervix په نرې کیدو او پراخیدو شروع کوي چې ددې مرحلې په اخر کې په پوره ډول پراخیدو

باندې پای مومي. دامرحله د رحم دعضلاتو په تقلصاتو سره شروع کوي، چې د رحم تقلصات د رحم Cervix په مقابل کې ترسره کېږي داسې چې درحم عضلاتو تقلص قوه د جنین په امنیوتیک مایع باندې واردېږي، د امنیوتیک مایع فشار زیاتوالي سبب ګرځي، د امنیوتیک مایع فشار درحم په Cervix Canal راځي، که چیرته امنیون پرده څیرې شي دغه قوه دجنین یوې برخې پواسطه په ځانګړي ډول جنین د سر پواسطه په Cervix Canal واردېږي، چې پدې ډول د Cervical canalپراخېږي (۱۴- ۱ انځور).

ب — Stage-۲ جنین د زیږون مرحله: د جنین زیږون کې هم د رحم عضلاتو تقلصات برخه اخلي خو مهمه برخه د ګیدې عضلاتو تقلصات دي (۱۴- ۱ انځور).
ج — Stage-۳ — د پلاسنتیا او جنیني غشاو ولادت مرحله: دا مرحله هم درحم عضلاتو تقلص پواسطه او هم د بطن داخلي فشار لوړوالي په نتیجه کې تر سره کېږي چې د پلاسنتیا او جنیني غشاوې خارجېږي (۱۴- ۱ انځور).

کله چې رحم تقلص کوي درحم پورتنې برخه سره غونجېږي او رحم Lumen کوچنی کېږي، درحم لاندینې برخه درحم تقلص پواسطه تولید شوې قوې پواسطه پراخېږي. د رحم تقلصات وقفوي شکل سره منځته راځي چې په لمړۍ مرحله کې هر لس دقیقې وروسته منځته راځي، په دوهمه مرحله دزیږون کې د یوې دقیقې نه کم وخت کې صورت نیسي او په دریمه مرحله دزیږون کې ۹۰- ۳۰ Seconds منځته راځي. دغه نبضاني ډول درحم تقلصات د جنین ژوندي پاتې کیدو لپاره ضرور دي داسې چې دا تقلصات په Uteroplacental Circulation باندې وقفوي ډول کافي اندازه قوه واري چې هم د زیږون باعث ګرځي او په عین وخت کې د جنین وینې دوران هم ساتي. که چیرته دغه تقلصات دوامداره ډول اوسي نو جنین دوینې جریان قطع کیدو لامل ګرځي او دزیږون په وخت کې د جنین مړینه باعث شي.



۱-۱۴ انځور: دی انځورونو کې د زیږون مختلفې مرحلې ښودل شوي دي.

کلینیکي تړاو:

Preterm Birth یا مخکې دوخت څخه ولادت:

د ۳۴ هفتې څخه مخکې د جنین تولد Preterm Birth څخه عبارت دی. هغه فکتورونه چې مخکې د وخت څخه د ولادت باعث گرځي ندي پیژندل شوي. خو کیدای شي چې د حاملګۍ تداوي د دوامداره پاتې کیدو نه د مخنیوي په خاطر د حاملګۍ تقویه کونکي فکتورونو (لکه هارمونونه او داسې نور) لرې کول او یا په فعال ډول سره تنبه کونکو فکتورونو پواسطه د زیږون تنبه کول د Preterm Birth باعث شي.

په امریکا متحده ایالاتو کې مخکې د وخت څخه د ماشومانو زیږون د ماشومانو د مړینې دوهم مهم سبب جوړوي او هم د څرګندو معیوبیتونو لامل گرځي. Premature delivery د جنیني غشاو مخکې څیري کیدو، مخکې دوخت څخه د زیږون شروع کیدل او یا هم د حاملګۍ اختلاطاتو موجودیت په وجه صورت نیسي. مورنۍ هایپرټنشن، مورنې ډیابیت ناروغې او همدارنګه Abruptio Placenta یې خطري فکتورونه دي. مورني انتانات د Bacterial Vaginosis په شمول هم د Preterm delivery خطر زیاتوي.

Feto neonatal circulation (د جنین او نوي زیږیدلی ماشوم دوینې دوران)


Fetal Circulation: مخکې د ولادت څخه د پلاستیا نه ۸۰٪ اکسیجن لرونکي وینه جنین ته امبلیکل کارډ د Umbilical Vein پواسطه انتقالیږي. کله چې ځیګر ته ورسېږي ډیره برخه یې د Ductus Venosus پواسطه مستقیماً Inferior Venacava ته داخلېږي، کمه برخه یې ځیګر ساینوزویدونو ته ځي او د Portal Vein وینې سره ګډېږي. Sphincter mechanism د Ductus venosus د Umbilical vein په طرف بندېږي چې امبلیکل ورید ته دوینې داخلیدو څخه مخنیوی کوي او هم د امبلیکل ورید وینه د ځیګر په ساینوزویدونو کې تنظیموي. کله چې د رحم تقلصات شروع شي دغه Sphincter د وینې جریان ډیر زیاتوالي په وجه بندېږي چې په زړه باندې د ناڅاپي وینې جریان زیاتوالي څخه مخنیوی کوي. د پلاستیا وینه چې کافي اندازه اکسیجن لري د Inferior Venacava وینې سره چې Deoxygenated ده او دسفلي اطرافو نه راځي ګډېږي، د زړه ښي اتریوم یا دهلیز ته داخلېږي. په ښي دهلیز کې د Foramen Oval د لارې دوینې ډیره اندازه مستقیماً چپ دهلیز ته جریان پیدا کوي، کمه اندازه وینه چې

د Septum scandium د ښکتنې څنډې پواسطه په ښي دهلیز کې پاتې کیږي ، د Superior Venacava د سږو Desaturated وینې سره چې د سږو پورتنی اطرفوڅخه راځي گډیږي . په چپ دهلیز کې د سږو Desaturated وینې سره چې کمه ده گډیږي ، لدې وروسته چپ بطن ته او بیا Ascending aorta ته جریان پیدا کوي .

څرنگه چې کروني او Carotid شیریانونه د اورټا لمړني شعبات دي نو زړه عضله او دماغ د ښه اکسیجن لرونکې وینې پواسطه ارواکیږي . Desaturated وینه د Superior Venacava د ښي دهلیز څخه ښي بطن ته او بیا pulmonary trunk ته جریان کوي . څرنگه چې په جنیني دوره کې سږي بند وي او دسږو وینې جریان په مقابل کې لوړ مقاومت موجود وي نو دغې وینې ډیره برخه د Ductus arteriosus دلارې له Pulmonary trunk څخه Descending Aorta ته داخلېږي او د چپ بطن وینې سره گډیږي (۱۴-۲ انځور) .. د Descending Aorta دلارې د دوه Umbilical arteries پواسطه وینه دوباره پلاسنتیا ته چې ۵۸٪ اکسیجن لري وړل کیږي .

وینې جریان دپلاسنتیا څخه د جنین غړوته د انتقال په وخت کې د اکسیجن غلظت په تدریجي ډول کمیږي داسې چې د جنین د Desaturated وینې سره گډیږي . په نظري ډول سره دا وینه په لاندې ځایونو کې د Desaturated وینې سره گډیږي (۱۴-۲ انځور) .

- په ځیگر کې د Portal ورید Desaturated وینې سره گډیږي
- Inferior Venacava کې دسفلي اطرافو ، حوصلې او پښتورگو له Desaturated وینې سره
- په چپ دهلیز کې د سر ، غاړې او علوي اطرافو له Desaturated وینې سره گډیږي .
- د Ductus arteriosus دلارې د Descending aorta سره دسږو Desaturated وینې سره گډیږي .



۱۴-۲ انځور : جنين دوينې دوران او د پلاسنتا دوينې جريان ښايي.

د ولادت په وخت کې دوراني تغيرات يا Neonatal circulation

دولادت په وخت کې دوراني تغيرات پلاسنتا د وينې جريان قطع کيدل او د جنين تنفس شروع کيدو سره منځته راځي.

Ductus arteriosus د جدار د عضلاتو تقلص په وجه بندېږي ، د Pulmonary arteries د پواسطه سږو ته دوينې جريان زياتېږي ، بيرته دا وينه له سږو نه د Pulmonary veins پواسطه چپ دهلېز ته راځي پدې ډول په چپ دهلېز کې دوينې فشار لوړېږي ، په عين وخت کې د پلاسنتا دوينې جريان قطع کيدو په وجه په ښي دهلېز کې دوينې فشار ښکته راځي، په نتيجه کې Septum primum د Septum secundum په مقابل کې ځای نيسي چې په وظيفوي ډول


Foramen oval بندوي. په خلص ډول وروسته د ولادت څخه په دوراني سیستم کې لاندې تغیرات منځته راځي.

د امبلیکل شیریانونو بندیدل: ددې شیریانونو د دیوال smooth عضلاتو تقلص چې د Thermal stimuli او د اکسیجن غلظت تغیراتو په نتیجه کې منځته راځي نوموړي شیریانونه بندېږي. په وظیفوي ډول د ولادت څخه څو دقیقې وروسته بندېږي خو په حقیقي ډول یې Lumen د فایبروز نسج پواسطه دوه نه درې میاشتو کې بندېږي (۱۴ - ۳ انځور).

د امبلیکل وریدونو او Ductus Venosus بندیدل: د امبلیکل شیریانونو بندیدلو نه لږ وروسته بندېږي داسې چې په پلاستیا کې موجوده وینې جریان ته د جنین لپاره زمینه برابروي. Umbilical vein بندیدلو نه وروسته د ځیگر په Ligamentum teres بدلیږي او Ducutus venosus کوم چې د Lig teres نه تر Inferior venacava پورې امتداد لري د ځیگر په Ligamentum venosum بدلیږي (۱۴ - ۳ انځور).

Dactus Arteriosus تړل کیدل: دا هم ډیر ژر وروسته د ولادت څخه ددې جدار د عضلاتو تقلص پواسطه بندېږي. ددې بندیدل د Bradykinin پواسطه کوم چې د سږو لمړیو ساعتونو په نتیجه کې افرازیږي صورت نیسي. مکمل بندولی یې چې د انتیما طبقې تکرر په نتیجه کې منځته راځي ۱ - ۳ میاشتې وخت نیسي، په غټانو کې ددې پاتې شوني Ligamentum arteriosus دی.

Foramen oval بندیدل: د ولادت په وخت کې تنفس شروع سره په چپ دهلیز کې فشار زیاتیدل او ورسره په ښي دهلیز کې د فشار ښکته کیدل ددې ولا بندیدو باعث گرځي. د ولادت په لمړۍ ورځ دغه بندوالی رجعي دی. ماشوم د ژړا په وخت کې د چپ نه ښي طرف دهلیز ته شنب پیداکوي چې په Newborn کې Cyanotic Period شمیرل کیږي. نوموړې دواړه پردې د یو کال په دوران کې یوبل سره په دایمي ډول نښلي. په ۲۰٪ خلکو دا وال ممکن په مکمل ډول بند نه شي (prob patent foramen oval).



۱۴ - ۳ انځور : د ولادت څخه وروسته جنین دینې دوران تغیرات ښایي.

پنځلسم-څپرکی

Teratology

تعریف: د ولادي ګډوډیو مطالعه Teratology بلل کیږي. Teratos یوناني کلمه ده چې د Monster د سترې بلا په معنی ده.

Congenital Malformation، Birth Defect او Congenital Anomalies مترادفې کلمې دي چې د تولد شوو ماشومانو ساختماني، وظیفوي، سلوکی او میتابولیک انومالیاو څخه بحث کوي. د ټولوژونډیو تولد شویو ماشومانو ۳٪ ولادي انومالیاو سره تولد کیږي چې د Infant ماشومانو ۲۵٪ د مړینو باعث ګرځي او همدارنګه د ۶۵ کلنۍ نه ښکته د مړینې پنځم مهم سبب جوړوي.

- ۴۰٪ - ۴۵٪ حالاتو کې د ولادي انومالیاو سبب معلوم ندی.
- ۲۸٪ حالاتو کې د جنینیتیکي (د کروموزوم او جن ګډوډیو) انومالیاو له امله منځته راځي.
- ۳٪ - ۴٪ حالاتو کې د محیطي فکتورونو (انتانات، شعاع او داسې نور) پواسطه منځته راځي.
- ۲۰٪ - ۲۵٪ حالاتو کې په ګډه محیطي او جنیتیکي فکتورونه (Multifactorial) (موجود وي).
- نیم نه یو فیصد حالاتو کې دوګانګیو سره یوځای وي.

د Teratology اساسات

ټول هغه فکتورونه چې د Teratogen موادو د Teratogenicity قوت او ظرفیت معلوموي د Teratology اساسات بلل کېږي .


۱- **Conceptus Genotype** : د جنین جنیټیکي جوړښت د محیطي فکتورونو سره د تعامل لپاره اهمیت لري یعنې محیطي فکتورونو ته خاص میلان لري او همدارنګه د مور جنیټیکي حالات لکه دواګانو میتابولیزم ، انتاناتو په مقابل کې مقاومت او داسې نور هم مهم دي

۲- د جنین عمر د Teratogen موادو سره د تماس له نظره : رشیم او جنین داخل رحمي عمر له نظره د دریمې هفتې نه تر اتمې هفتې اخر پورې جنین د Teratogen موادو په مقابل کې ډیر حساس وي چې دا وخت درشیم د Embryogenesis څخه عبارت دی .

۳- د Teratogen موادو سره د تماس وخت او موده ده.

۴- Teratogen موادو د تاثیر میکانیزم.

د جنین غیر نورمال تکامل او انکشاف تظاهرات مړینه ، سو تشکل ، ودې وروسته پاتې کیدل او وظیفوي بې نظمۍ دي . د رشیم او جنین باندې د مختلفو Teratogen موادو تاثیرات د جنین د عمر له مخې په لاندې ګراف کې ښودل شوي دي.



Teratogens موادو ډولونه : په لنډ ډول د مختلفو تیراتوجن موادو نوعې او دهغو تاثیرات په لاندې جدول کې توضیح شويدي.

ولادي انومالي	Teratogen مواد
انتانات	۱
د غاښونو اېنارملي ، کونوالی ، په زړه کې نقيصه ، سترګه کې کټرکت او ګلوکوما	روبيلا ویروس
د ماشوم مړینه ، دماغي تاخر ، ږوندوالی او Microcephaly	سایتوميګالي ویروس
سترګو کوچنیوالی ، microcephaly, retinal dysplasia ,	هرپس سمپلکس ویرس
د عضلاتو اتروفي ، دماغي تاخر ، نهایتو هایپوپلازیا	Varicella virus
Microcephaly ، د ودې تاخر	HIV
هایدروسیفالوس ، د دماغ کلسیپای کیدل ، سترګو کوچنیوالی	توکسوپلازموزس
دماغي تاخر او کونوالی	سفلس
فزيکي مواد	۲
دماغو کوچنیوالی ، spina bifida, cleft palate , ، د نهایتو نقيصې	اکسري شعاع ګانې
Anencephaly, spina bifida, ، دماغي تاخر ، د زړه انومالي ، د نهایتو اېنارملي د زړه انوملی ، omphalocele,	هایپر ترمیا
کیمیاوي مواد او دواګانې	۳
د زړه انومالي او نهایتو غلط جوړیدل	تالیدوماید
Anencephaly, هایډرو سفالوس ، cleft lip and palate ,	Aminopterin
Fetal hydantoin syndrome : دمخ نقيصې ، دماغي تاخر	Diphenylhydantoin
د عصبي تیوب نقيصې : د سر ، مخ او نهایتو انومالي	والپرویک اسید
د زړه نقيصه ، Cleft palate ، بولي تناسلي او سکلیټل انومالي	Trimethadione
د زړه انومالي	لیتیوم

Cleft lip and palate, د زړه نقيصې	Amphetamines
Chonrodysplasia , microcephaly	وارفارين
د جنين ودې تاخر او د جنين مړينه	ACE inhibitors
Cocaine Growth retardation , microcephaly , Gastrochisis	کوکاين
Fetal alcohol syndrome , Short palpebral fissures, maxillary hypoplasia , cleft palate , Heart defects	الکول
Vitamin A embryopathy : د غوړونو شکل اېنارملي ، Mandibuler hyopoplasia, د زړه نقيصه او Cleft palate	Isotretinoin (vitamin A)
د عصبي ټيوب نقيصې ، د سراومخ انومالي ، کم وزن لرونکي ماشومانو تولد	Industrial solvents
Cerebral Palsy په شان عصبي اعراض	Organic mercury
د ودې وروسته پاتې کيدل ، عصبي بې نظمۍ	
هارمونونه	۴
Masculinization of female genitalia : نښتې Labia ، د کلايتوريس هايپرتروفي	Androgenic agents
درحم ، Uterine tube او د Testis سؤ شکل	Diethylstil bestrol (DES)
مختلف سؤ تشکلات لکه زړه او عصبي ټيوب نقيصې ډيرې عامې دي.	Maternal diabetes
د زړه نقيصې ، عصبي ټيوب نقيصه ، Omphalocele	Maternal obesity
ACE (angiotensin-converting enzyme) , HIV(human immunodeficiency virus) , DES(diethylstilbestrol) .	

په لاندې ډول د ولادي گډوډيو څو شکونه ښودل شويدي.



دلاس او پښو انومالي ښودل شويدي



Prenatal دوره کې يې زړه بدونکي تغيرات:

کلينکي تړاو:

د ولادي نقيصو مخنيوی:

ډيرې ولادي نقيصو مخنيوی کېدای شي . د مثال په ډول د ايودين لرونکې مالگو اويا په اوبو کې د ايودين استعمال د دماغي تاخر او ددهوکو سو شکل څخه مخنيوی کوي.

هغه میندې چې Diabetes ولري مخکې لدې چې حمل صورت ونیسي دیابیت ښه کنټرول شي نو په جنین کې د ډیرو ولادي نقيصو مخنیوی کوي. د حاملگۍ په اول وخت کې د فولیک اسید توصیه کول ماشوم د عصبي تیوب نقيصو څخه لکه Spina bifida او anencephaly څخه ساتي. د حاملگۍ په ټول دوران کې د الکولو او نورو دواگانو څخه پرهیز کول د Birth defects وقوعات کموي.

د داخله ډاکټر لپاره ډیره مهمه ده چې یوه حامله ښځې ته د دوا په توصیه کې د نوموړې دوا په Teratogenesis باندې خبر اوسي او هغه دوا هیڅ وخت توصیه نشي چې په جنین باندې بد تاثیرات لري. لکه Retinoid یا ویتامین A چې د ځوانکو (Cystic Acne) تداوي لپاره دخولې دلارې او یا په وموضعي ډول استعمالیږي په جنین بد تاثیرات لري او د Vitamin A embryopathy باعث گرځي، د خولې دلارې توصیه زیات Teratogenic دی.

شپاړسم څپرکی

جنیټیک او د انسان تکامل

د انسان بدن له دوه ډوله حجراتو څخه جوړ شوی دی ، جسمي حجرات چې د بدن مختلف سیستمونه یې جوړ کړيدي او موجوده ژوندي انسان ژوند کولو مسولیت لري بل جنسي حجرات دي چې د انسان نسل د بقاء ساتلو لپاره د نوي موجود منځته راوړلو دنده په غاړه لري . د بدن هره حجره که هغه جسمي وي او یا هم جنسي وي د ژوند کولو او د ژوند د بقاء لپاره زرگونو کوډونه (جینونه) لري چې دا جینونه د حجراتو په هستو کې په کروموزمونو کې ځای پر ځای شوي دي.

د انسان د بدن هره جسمي حجره ۴۶ عدده کروموزومونه لري چې Diploid Chromosome بلل کیږي . ۲۲ جوړې Autosome دي یعنې د بدن جوړښت لپاره خاص جینونه لري او یوه جوړه جنسي کروموزومونه (Sex Chromosome) دي د جنسیت تعین او د جنسي اعضاوو جوړښت لپاره جینونه لري . جنسي کروموزومونه X او Y دي په نارینه و کې XY او په زنانه و کې XX جوړو په شکل دي.


جنسي حجرات چې د القاح قابلیت ولري (Mature Sex cells) ۲۳ عدده کروموزومونه لري چې دنورو حجراتو نیمایي دي نو Haploid کروموزومونه بلل کیږي ، ۲۲ عدده اتوزوم او یو عدد جنسي کروموزوم دی جنسي کروموزوم به یا X او یا هم Y وي .

کروموزوم جوړښت او جینونه

یوه داسې حجره چې د استراحت په حالت کې وي کروموزومونه یې د لیدلو وړنه وي ځکه چې د هغوي کروماتیني مواد په زیاته اندازه تیت او پرک دي مگر د حجروي ویش په وخت کې په هسته کې د کروماتین شبکه متراکمېږي او یوشمیر کروموزومونه ترې جوړېږي ، یو وصفي کروموزوم د دوه میله شکله ساختمانونو (Chromatid) څخه چې تقریباً یو له بل سره موازي قرار لري جوړشوی دی . نوموړي کرماټیدونه یو له بل سره په یوه کم رنگه ساحه کې چې Centromere

Kinetochores or بلبل کېږي نښتې وي هر کروماتید دوه بازوگان لري چې د سنټرومیر په دواړو خواو کې قرار لري کروموزومونه یو له بل څخه طول ، د بازوگانو په نسبي اوږدوالي او په نورو مشخصاتو کې فرق لري چې دهمدې توپیرونو له وجې په جداګانه ډول پیژندل کېږي د کروموزومونو دې ډول تقسیم بندي ته Karyotype وايي چې د Karyotype په مرسته د هر کروموزوم انومالي په اسانه پیژندل کېدای شي.

جینونه د کروموزوم د پاسه DNA خاص جوړښتونه دي چې دمخلفو پروټینونو لپاره خاص کوډونه لري انسان (Genome) ۲۳۰۰۰ جینونه لري چې د ۱۰۰۰۰۰ پروټینونو لپاره کوډونه لري همدا پروټینونه د انسان بدن جوړښت کې مهمه ونډه لري . جین د ساختمان له نظره د DNA او پروټین (Histone) څخه جوړېږي . د Histone پواسطه د DNA حلقوي شکل ساتل کېږي چې Nucleosome بلل کېږي . نیوکلیوزوم یو له بل سره د نورو پروټینونو په واسطه وصل شوي دي . معلومات ټول په جینونو کې زیرمه کېږي (۱۶- ۱ انځور).



۱-۱۶ انځور: د کروموزوم او جن شکلونه ښودل شويدي

د انسان تکامل مالیکولي بیالوژي

دمالیکولي بیالوژي تیز پرمختګ ډیرونو تخنیکونو ته زمینه برابره کړه لکه Recobinant DNA technology ، Transgenic mice ، Chimeric models ، Stem cell manipulation او

دا تخنیکونه اوس په پراخه ډول سره په څیړنیزو لابراتوارونو کې د ډول ډول مشکلاتو په پیژندلو کې استعمالیږي لکه د مارفوجنیزیس جنیټیکي تنظیم ، موقتي او ناحیوي ډول د خاصو جینونو Expression یا څرگندیدل او څنګه حجرات یو بل سره معلومات تبادله کوي او د رشیم مختلفې برخې جوړوي . لمړی ځل لپاره مونږ پدې پوه شوه چې څنګه ، کله او چیرته په نښه شوي جینونه په رشیم کې نارمل او اېنارمل تکاملي حالاتو کې فعالیږي او څرګندیږي . د Lan Wilmut د ملګروپه مرسته لمړی ځل لپاره په ۱۹۹۷ کې د Somatic cell nuclear transfer تخنیک پواسطه پسه Cloned کړای شو (د پسه سوماتیک حجراتو کرول پواسطه بل پسه منځته راوړ) . دهغې نه وروسته دمختلفو حیواناتو کاهلو حجراتو کلچر څخه Cloned شو . دانسان حجراتو Cloning سره په اجتماعي، اخلاقي او قانوني لحاظ د زیاتو مخالفتونو سره مخ کیدو په وجه علاقه کمه شویده. سره لدې د Infant ماشومانو کې چې سختو نارغیو او ولادې نقیصو سره زیږیږي Cloning تر سره کیږي.

دانساني رشیم Stem حجرات Pluripotential دي ، د خپل ځان دوباره نوي کیدو وړتیا درلودونکي دي (Capable of self-renewal) او هم ددې وړتیا لري چې په مختلفو خاصو حجراتو په ډولونو باندې تفریق شي . دانسان رشیمي Stem حجرات چې جداشي او په منظم پلان سره کلچر شي ډیر ددې وړتیا لري چې په Degenerative ، حبیثه یا Malignancy او جینټیکي ناروغیو تداوي کې استعمال شي . مالیکولي بیالوژي مهمه برخه د Gene Expression ده چې په لاندې ډول توضیح شویده.

د جین څرګندیدل یا Gene Expression :

ټولو ژونديو موجوداتو د ساده بکټریاو څخه تر مغلق یوکاریوټیاو پورې ټول د جین څرګندیدلو لپاره یوشانته میخانیکېت په بر کې نیسې د فعال جین یونقل په RNA کې تولیدیږي او بیا دغه RNA نقل په رایبوزوم کې دامینواسیدونو څنځیر سره مخامخ کېږي اودغه پروسه بیدون له کوم تغیر څخه دپیل څخه تر اخره پورې صورت نیسې دیوجین څرګندیدل په دوو مرحلو کې صورت نیسې چې یوله ترانسکریپشن اوبل یې دترانسلیشن په نوم یادېږي.

لمړۍ مرحله ترانسکریپشن (Transcription):

دجین څرگندیدل لومړۍ مرحله دجین د mRNA نقل جوړولو څخه عبارت دې پدې عملیه کې

چې دلاتیني لغت Transcription یانې نقل څخه اخیستل شویډې د RNA دنوروډولونوپه شان mRNA هم د DNA دقطار دتغیر څخه منځته راځي د DNA مالیکول قطاردیوپلان یانقشې په شکل دیو Complimentar یامعادل RNA دجوړولولپاره استعمالیږي چې یواځنې فرق یې د Thymine دقلوي پر ځای د Uracil قلوي جوړیدل دي اودغه جوړه شوې RNA د mRNA یا Messenger RNA یاقاصد RNA پنوم یادیري ددغه نوم علت دادې چې یوکاریوتیاکې DNA یواځې دحجرې په هسته کې تولیدیږي .

او سایتوپلازم ته نه انتقالیږي او پروتین په سایتوپلازم کې درایبوزوم دپاسه تولیدیږي چې په دې عملیه کې د mRNA دیوقاصد په حیث دیوجوړه د ای قطار په شکل دهستې څخه په سایتوپلازم کې درایبوزومونو ته ځي اوهلته خپله وظیفه اجرا کوي .د ترانسکریپشن عملیه د RNA polymerase انزایم په مرسته ترسره کېږي.

دوهمه مرحله ترانسلیشن (Translation):

دجین دڅرگندیدلودوهمه مرحله دترانسلیشن یا ترجمه کېدلونوم یادیري. هغه ارثي معلومات د mRNA دهستې څخه انتقال کړې دې رایبوزوم ته په رایبوزوم کې دامینواسیدونو په سلسلې باندې ترجمه کېږي اوپه نتیجه کې نوی امینواسیدونه تولیدیږي.

mRNA دمعلوماتوترجمه د rRNA په مرسته صورت نیسې په دې پروسه کې چې کله mRNA درایبوزوم سره په تماس کې شي نو د rRNA په مرسته معلومات ترجمه کېږي اوپولي پیپتاید سلسلې ته امینواسیدونه اضافه کېږي اوبیا دخو پولي پیپتایدڅخه پروتین تشکیلیږي

Invitro Fertilization یا Test Tube Babies

دا ډول القاح د نړې په ډیرو لابراتوارونو کې صورت نیسي .پدې ډول چې اول د Gonadotropin هارمون پواسطه د تخمدان فولیکلونه تنبه کیږي چې د هغه په نتیجه کې د یوه فولیکل نشو نما په تخمدان کې صورت نیسي بیا وروسته ، د Ovulation نه لږ مخکې د یوې الې پواسطه چې Aspirator بلل کیږي تخمه چې د خپل اول میوټیک تقسیم په اخره مرحله کې

قرارلري اخستل کېږي او په يوه مساعد ذريعه يا Culture کې ايښودو څخه فوراً وروسته دهغه سره سپرماتوزوا يو ځای کېږي. زايگوت خپلو تقسيماتو ته دوام ورکوي کله چې د اتو حجراتو په تعداد Cleavage وکړي و نور تکامل لپاره د مور رحم په اندوميترיום کې غرس کېږي او پدې ډول رشيم خپل تکامل ته دوام ورکوي .

پدې نوعه القاح کې تقريباً ۲۰ فيصده القاح شوې تخمې د ر خم په اندوميترיום کې غرس او تکامل کوي نو د حمل چانس پدې نوع ميتود کې ډير کم دی اما ددې کار د مخنيوي لپاره زياتره څلور يا پنځه القاح شوې تخمې د رحم په اندوميترיום کې غرس کوي او تکامل کوي . خو ځينې وخت داسې ليدل شوي چې دوه يا درې او يا زيات تعداد رشيم په عين وخت کې تکامل کوي . دوهم مشکل دا دی چې د اندو متریوم تغيرات همزمان د Cleavage سره صورت نه نيسي ځکه چې د عضويت نه دباندې Cleavage ۲۰ - ۳۰ فيصده د مور د عضويت د کليواژ په تناسب سست دی . نو زياتره ددې تغيراتو په وجه د القاح شوې تخمې غرس په مکمله توگه صورت نه نيسي.

د انسانانو هغه جوړه چې داخلي القاح مشکل ولري (په Uterian Tube کې Fertilization ممکن نه وي) د ماشومانو د راوړلو لپاره دې ډول تخنيک څخه کار اخيستل کېږي چې په لاندې ډول توضيح شويده.

Prenatal Diagnosis يا مخکې د ولادت څخه تشخيص:

د جنين او رشيم د ودې او تکامل د پيژندلو لپاره ډيرو طريقو څخه کار اخيستل کېږي لکه التراساوند، Amniocentesis ، Chorionic villus sampling او مورني سيروم سکرين کول . د دغو تخنيکونو يو ځال استعمال د سَوَ تشکلاتو ، جينتيکي انوماليو ، د ټول جنين وده او د حاملگۍ اختلاطونو (لکه د پلاسنتيا يا رحم انومالي گانې) په پيژندلو کې کومک کوي

۱ - التراساوند (Ultrasonography) :

التراساوند يوه Noninvasive تخنيک دی . دا پروسيجر کيدای شي چې بطن يا Transvaginal د لارې ترسره شي . اوسني تخنيکونه ډير پرمختللي دي چې دغو رگون په داخل کې د وينې جريان ، د زړه د والونو حرکات ، په ټراخيا او برانکسونو کې مایع حرکت معلومولی شي . التراساوند معمولاً د جنين عمر او ودې مشخصاتو پيژندلو لپاره، د ولادې انوماليو موجوديت اونه

موجودیت تعین لپاره ، درحم محیط حالت معلومولو، امنیوتیک مایع اندازه کول، د پلاسنټا وضعیت ، Umbilical blood flow اوهمدارنگه د څوماشومانوپيژندلو لپاره کارول کېږي . هغه میتودونه چې التراساوند پواسطه د جنین د ودې او تکامل لپاره استعمالېږي مخکې ذکرشويدي .

۲- Maternal Serum Screening :

د جنین دځینو حالاتو پیژندلولپاره بعضې بیوشیمک مواد د مور وینې په سیروم کې اندازه کېږي. یوه معاینه هم د Alfa fetoprotein دی چې د جنین دځیگرپواسطه تولیدېږي او دپلاسنټا دلارې موروینې ته داخلېږي . په څوارلسمه هفته کې اعظمي حد ته رسیږي چې دخاملگۍ په دوهم ترایمستر کې دموږپه وینه کې لوړغلظت سره موجودوي ، دیرشمه هفتې څخه وروسته یې اندازه کمیږي . د جنین په ډیروناروغیو کې لکه دعصب تیوب نقیصه ، Omphalocele، Sacroccygeal teratoma ، Bladder extropathy ، Intestinal atresia او داسې نوروناروغیو په تشخیص کې دموږپه وینه او امنیوتیک مایع کې د AFP اندازه زیاتیږي . په Down syndrome، ۱۸ کروموزوم ترايزومي او داسې نورو ناروغیو کې یې اندازه کمیږي .

۳- Amniocentesis :

همدارنگه امنیوتیک مایع معاینه کول هم د مور وینې سیروم اندازه کولو په شان د جنین د ډیروناروغیو په پیژندلو کې کومک کوي . امنیوتیک مایع د التراساوند لارښونې لاندې د یوې ستنې پواسطه د بطن دلارې اخیستل کېږي خو معمولا دا پروسیجر دڅوارلسمې ورځې څخه وروسته اجراکېږي .

۴- Chorionic Villus Sampling :

دا هم د یوې اوږدې ستنې پواسطه د بطن دلارې کوریونیک ذغاباتو یوه برخه اخیستل کېږي اوحاص معاینات پرې اجراکېږي .

References

۱. Clinical Embryology Longman's ۸th Edition by T W Sadler
۲. Moore Development Human Clinical Oriented Embryology ۹th
Edition by Keith L. Moore.
۳. Human Embryology ۸th Edition by Inder Bursing
۴. General Embryology by Pro.Dr. Baray seddiqui ۱۳۹۱

د اناتومي ډیپارتمنټ

دوهم کال لمړی سمسترامبریالوژي مضمون کریکولم مفردات

هفتې	ساعتونه		عنوان
	نظري	عملي	
۱	۱	۱	امبریالوژي پېژندنه: تعریف ، تاریخچه ، د امبریالوژي برخې ، د امبریو یا رشیم موقعیت.
۲	۱	۱	تناسلي سیستم : د ښځینه تناسلي سیستم ، د نارینه تناسلي سیستم.
۳	۱	۱	Progenesis : گمیتونه ، گمیتوجنیسیس ، د تخمدان سایکل ، کلینکي تړاو.
۴	۱	۱	تکامل : د ولادت څخه مخکې ژوند ، د ولادت څخه وروسته ژوند.
۵	۱	۱	Pereorganogenesis : القاح ، د القاح مرحلې ، د القاح اهمیت ، کلینکي تړاو.
۶	۱	۱	د لمړۍ هفتې تکامل : کلیواژ ، په دریمه او څلورمه ورځ تکامل ، د شپږمې ورځې تکامل ، داوومې ورځ تکامل ، کلینکي تړاو.
۷	۱	۱	د دوهمې هفتې تکامل : د ۸ ورځې تکامل ، د ۹ ورځې تکامل ، د ۱۰ ورځې تکامل ، د ۱۱ ورځې تکامل ، د ۱۲ ورځې تکامل ، د ۱۳ ورځې تکامل ، کلینکي تړاو.
۸	۱	۱	د دریمې هفتې تکامل : گسټرولیشن یا Germ disc جوړیدل ، دنوتوکارد جوړیدل ، الټوزیس ، نیورولیشن ، Intra Embryonic Mesoder تکامل ، لمړنۍ د زړه اورگونو سیستم

رشيمني دوره	۱	۱	۹
(Organogenesis) : درېمې نه تر اتمې هفتې پورې د اندودرم ، اکتودرم او ميزودرم تفریق پذيري، د سومایټ تفریق پذيري ، کلينيکي تړاو ، دارگانوجنيزيس خلاصه			
جنيني دوره : د جنين تفریق پذيري ، میاشتنی تغیرات ، دزیریدو وخت ، کلينيکي تړاو.	۱	۱	۱۰
جنيني دوره : د جنيني دورې څلورو هفتو تکامل ، کلينيکي تړاو، Premature او Post mature ماشوم.	۱	۱	۱۱
خارج رشيمني غشاوې: پلاسنټا، امنيون ، کوريون ، کلينيکي تړاو.	۱	۱	۱۲
خارج رشيمني غشاوې: په دوه گوني ماشومانو کې جنيني غشاوې ، کلينيکي تړاو.	۱	۱	۱۳
زیرون (Fetoneonatal circulation) Postnatal period:	۱	۱	۱۴
Teraotology: تغریف ، په Prenatal دوره کې اېنارمل تغیرات ، د تیراتولوژي اساسات، د Teratogen نوعې، Prenatal کې يې زړه بدونکي تغیرات ، کلينيکي تړاو.	۱	۱	۱۵
په Embryogenesis باندې تاثیرات : جنیټک اودانسان تکامل ، دانسان تکامل مالیکولي بیالوژي ، Invitro Fertilization ..Prenatal Diagnosis	۱	۱	۱۶



پوهنيار دوكتور عبدالله جان شينواري

د افغانستان د ۸ پوهنتونونو د چاپ شويو طبي کتابونو لست

(کابل، کابل طبي پوهنتون، ننگرهار، خوست، کندهار، هرات، بلخ او کاپيسا) ۲۰۱۹-۲۰۱۰

ردیف	د کتاب نوم	ليکوال	پوهنتون	ژبې	د کتاب نوم	ليکوال	پوهنتون
۱	فارمکولوژي	پوهندوی سيد قمبر علي حيدري	ننگرهار	۲	کتاب ولادی	پوهندوی داکتر حسن فريد	هرات
۳	انتاني ناروغی	پوهنوال داکتر عبدالناصر جبارخېل	ننگرهار	۴	د سترگو ناروغی	پوهنمل داکتر خالد يار	ننگرهار
۵	زېږون	پوهنمل داکتر مریم اکرم معصوم	ننگرهار	۶	د کوچنيانو د وينې ناروغی	پوهندوی داکتر منصور اسلمزی	ننگرهار
۷	تنفسي او د زړه د دسامونو روماتيزمل ناروغی	پوهاند داکتر طيب نشاط	ننگرهار	۸	د سرطاني ناروغيو اساسات	پوهاند داکتر ظاهر ظفرزی	ننگرهار
۹	توبرکلوز	پوهندوی داکتر سيد انعام سیدي	ننگرهار	۱۰	اندوکراينولوژی او روماتولوژي	پوهاند داکتر محمد طيب نشاط	ننگرهار
۱۱	بيوفزيک	پوهاند مير محمد ظاهر حيدري	بلخ	۱۲	د ماشومانو کليڼکي معاينه	پوهنوال داکتر ناصر خان کاموال	ننگرهار
۱۳	فزيک نور	پوهاند مير محمد ظاهر حيدري	بلخ	۱۴	د پرازيتولوژي اساسات	داکتر محمد صابر	ننگرهار
۱۵	د سينې ناروغی او توبرکلوز	داکتر ناصر محمد شينواری	کندهار	۱۶	د کولمو بندش او د پريپوان جراحي ناروغی	پوهاند داکتر عبدالرؤف حسان	ننگرهار
۱۷	کليڼيکي راديوپلوژي	پوهنوال داکتر غلام سخي رحمانزی	ننگرهار	۱۸	د کوچنيانو د درملنې لارښود (انگليسی)	پوهندوی داکتر منصور اسلمزی	ننگرهار
۱۹	د پښتورگو ناروغی	پوهاند داکتر محمد ظاهر ظفرزی	ننگرهار	۲۰	د هضمي جهاز او پښتورگو ناروغی	پوهنوال داکتر عبدالواحد وثيق	کندهار
۲۱	د هضمي جهاز ناروغی	پوهاند داکتر محمد ظاهر ظفرزی	ننگرهار	۲۲	جراحی بطن وملحقات آن	پوهاند داکتر محمد معصوم عزيزی	کابل طبي پوهنتون
۲۳	د وينې ناروغی	پوهاند داکتر محمد ظاهر ظفرزی	ننگرهار	۲۴	روش های ارزيابی کليڼکي اطفال	پوهندوی داکتر فاروق حميدي	کابل طبي پوهنتون
۲۵	د خيگر ناروغی	پوهاند داکتر محمد ظاهر ظفرزی	ننگرهار	۲۶	عمومي هستولوژي	پوهندوی داکتر فضل الهی رحمانی	کندهار
۲۷	تشخيصي راديوپلوژي	پوهنوال داکتر غلام سخي رحمانزی	ننگرهار	۲۸	پتالوژی عمومي	دوکتورس زهرا فروغ	هرات
۲۹	د وينې سرطان	پوهنوال داکتر نظر محمد سلطانزی	ننگرهار	۳۰	بيولوژي ماليکولي حجره، بخش اول	پوهنوال علي يوسف پور	کابل طبي پوهنتون
۳۱	اطفال	پوهنوال داکتر محمد رسول فضلي	ننگرهار	۳۲	بيولوژي ماليکولي حجره، بخش دوم	پوهنوال علي يوسف پور	کابل طبي پوهنتون
۳۳	تغذيه او روغتيا	پوهيالی داکتر محمد هارون	ننگرهار	۳۴	د توبرکلوز ناروغی	داکتر محمد ناصر ناصري	کندهار
۳۵	ډيموگرافي او کورنی تنظيم	پوهيالی داکتر محمد ابراهيم شيرزی	ننگرهار	۳۶	امراض ساری اطفال	پوهاند داکتر سلطان محمد صافی	کابل طبي پوهنتون
۳۷	د عمومي جراحي اساسات	پوهندوی داکتر بادشاه زار عبدالي	خوست	۳۸	د کوچنيانو ناروغی	پوهاند داکتر سلطان محمد صافی	کابل طبي پوهنتون
۳۹	جراحی، د کليڼيکي معايناتو سيستم	پوهندوی داکتر بادشاه زار عبدالي	خوست	۴۰	امراض جراحي بطن و ملحقات ان	پوهندوی داکتر عبدالخالق دوست	کندهار
۴۱	عمومي پتالوژي	پوهنوال داکتر خليل احمد بهسودوال	ننگرهار	۴۲	هستولوژي	پوهاند داکتر بری صديقي	کابل طبي پوهنتون
۴۳	د ساري ناروغيو کنترول	پوهندوی داکتر محمد عظيم منگل	ننگرهار	۴۴	د وينې فزيولوژي	پوهنمل داکتر ولي محمد وياپ	کندهار
۴۵	طبي هستولوژي	پوهنوال داکتر خليل احمد بهسودوال	ننگرهار	۴۶	طبي بيوشي	پوهاند دوکتور خان محمد احمدزی	کابل طبي پوهنتون
۴۷	يورولوژي	پوهنوال داکتر عبدالاحد حميد	ننگرهار	۴۸	فزيک اوپتيک	پوهنوال غلام قادر دهگان	هرات
۴۹	اخلاق طبابت	پوهاند داکتر عبدالغفور همدل صديقی	بلخ	۵۰	اورتوپيدي او کسرونه	پوهنمل داکتر محمد همايون مصطفی	کندهار

۵۱	فزیکل دیاگنوزس	پوهنوال ډاکتر حفیظ الله اږیدی	ننګرهار	۵۲	بطن حاد و مزمن	پوهنوال ډاکتر عبدالغفور ارساد	هرات
۵۳	د زړه او رګونو ناروغی	پوهندوی ډاکتر دل آقا دل	ننګرهار	۵۴	اساسات جراحی	پوهاند ډاکتر نجیب الله امرخیل	کابل طبی پوهنتون
۵۵	د چاپیریال او ډنډیزه روغتیا	پوهنوال ډاکتر محمد عارف رحمانی	ننګرهار	۵۶	اناتومی	پوهنمل ډاکتر حفیظ الله سهار	کابل طبی پوهنتون
۵۷	د هضمي سیستم او پښتورګو ناروغی	پوهندوی ډاکتر سیف الله هادی	ننګرهار	۵۸	التراساوند تشخیصیه	پوهندوی ډاکتر محمد نواب کمال	کابل طبی پوهنتون
۵۹	د کوچنیانو تغذیه	پوهنمل ډاکتر نجیب الله امین	ننګرهار	۶۰	د قندونو هضم، جذب او استقلال	دوکتور یحیی فهمیم پوهیالی	ننګرهار
۶۱	د کوچنیانو ناروغی، اول جلد	پوهنوال دوکتور عبدالستار نیازی	ننګرهار	۶۲	د غوړ، پزی او ستونی ناروغی	پوهنمل دوکتور میر محمد اسحاق خاورین	ننګرهار
۶۳	د کوچنیانو ناروغی، دوهم جلد	پوهنوال دوکتور عبدالستار نیازی	ننګرهار	۶۴	د پوستکي ناروغی	پوهندوی دوکتور اسدالله شینواری	ننګرهار
۶۵	هیماتولوژي، ایمینولوژي او د ویتامینونو کموالي ناروغی	پوهندوی دوکتور ایمل شیرزی	ننګرهار	۶۶	د خولې او هضمي سیستم ناروغی	پوهاند دوکتور ظاهر ظفرزی	ننګرهار
۶۷	رهنمای تدریس طب	پوهاند دوکتور نادر احمد اکسیر	کابل طبی پوهنتون	۶۸	جراحی بطن	پوهاند دوکتور محمد مصصوم عزیز	کابل طبی پوهنتون
۶۹	امراض اطفال	پوهاند دوکتور سلطان محمد صافی	کابل طبی پوهنتون	۷۰	جراحی عصبی	پوهنوال دوکتور عبدالغفور ارساد	هرات
۷۱	مایکروبیولوژی	پوهاند محمد جمعه حنیف	هرات	۷۲	اساسات پرازیټولوژی طبی	پوهنمل دوکتور محمد یوسف مبارک	کابل طبی پوهنتون
۷۳	امراض جراحی سیستم هضمی و ملحقات آن	پوهاند دوکتور عبدالوهاب نورا	کابل طبی پوهنتون	۷۴	امراض جهاز هضمی و کبد	دوکتور محمد یونس فخری	بلخ
۷۵	فزیک طبی بخش میخانیک	پوهاند میر محمد ظاهر حیدری	بلخ	۷۶	فزیک طبی بخش حرارت	پوهاند میر محمد ظاهر حیدری	بلخ
۷۷	توضیح اساسات فزیک، و سایل تشخیصیه طبی	پوهاند میر محمد ظاهر حیدری	بلخ	۷۸	انالیز ریاضی	سید یوسف مانووال	بلخ
۷۹	نور و فزیک جدید	پوهنوال غلام قادر دهگان	هرات	۸۰	حرارت و ترمودینامیک	پوهنوال غلام قادر دهگان	هرات
۸۱	عمومي جراحي، لومړی ټوک	پوهندوی ډاکتر بادشاه زار عبدالی	خوست	۸۲	عمومي جراحي، دوهم ټوک	پوهندوی ډاکتر بادشاه زار عبدالی	خوست
۸۳	اناتومی و فزیولوژی انسان، جلد اول	پوهندوی محمد طاهر نسیمی	بلخ	۸۴	اناتومی و فزیولوژی انسان، جلد دوم	پوهندوی محمد طاهر نسیمی	بلخ
۸۵	روانی رنځپوهنه	پوهندوی ډاکتر جهان شاه تنی	خوست	۸۶	تغذیه او سو تغذیه	پوهنوال ډاکتر عبدالواحد وثیق	قندهار
۸۷	امراض روانی، جلد اول	پوهندوی دوکتور عبدالعزيز نادری	کابل طبی پوهنتون	۸۸	امراض روانی، جلد دوم	پوهندوی دوکتور عبدالعزيز نادری	کابل طبی پوهنتون
۸۹	انتاني ناروغی (انگلیسی)	پوهنمل ډاکتر محمد ذکریا امیرزاده	کندهار	۹۰	بېړنی طبی پېښی	پوهنوال ډاکتر عبدالواحد وثیق	قندهار
۹۱	پرازیټولوژی طبی	پوهاند دوکتور عبیدالله عبید	کابل طبی پوهنتون	۹۲	ولادي جراحي، لمړی ټوک	ډاکتر عجب گل مومند	قندهار
۹۳	مایکرو بیولوژی طبی، جلد اول	پوهاند دوکتور عبیدالله عبید	کابل طبی پوهنتون	۹۴	ولادي جراحي، دوهم ټوک	ډاکتر عجب گل مومند	قندهار
۹۵	مایکرو بیولوژی طبی، جلد دوم	پوهاند دوکتور عبیدالله عبید	کابل طبی پوهنتون	۹۶	د غوړ، پزی او ستونی ناروغی	ډاکتر عزیز الله فقیر	کندهار
۹۷	رهنمود PBL در افغانستان	پوهاند دوکتور محمد فرید برنایار	کاپیسا	۹۸	مایکروبیولوژی عمومی	دوکتور شعیب احمد شاخص	هرات
۹۹	ترومانولوژی	پوهنوال دوکتور عبدالغفور ارساد	هرات	۱۰۰	د زړه او سږو ناروغیو تشخیصیه رادیولوژي	پوهنیار ډاکتر شاه محمد رنځورمل	خوست
۱۰۱	نرسنگ عملیاتخانه	پوهاند دوکتور نجیب الله امرخیل	کابل طبی پوهنتون	۱۰۲	گیاهان طبی مستعمله در تداوی امراض قلبی و وعایی	پوهنوال محمد عثمان بابری	کابل پوهنتون
۱۰۳	امبریولوژی طبی	پوهندوی ډاکتر بشیر نورمل	کابل طبی پوهنتون	۱۰۴	بېړنی درملنې	ډاکتر عبدالولی رنځمل وردک	خوست

۱۰۵	د احصایی اساسات	پوهنپار محمد اغا ضياء	کندهار	۱۰۶	د کوچنیانو ساری ناروغی	پوهاند دوکتور سلطان محمد صافی	خوست
۱۰۷	امبریولوژی عمومی انسان	پوهندوی داکتر بشیر نورمل	کابل طبی پوهنتون	۱۰۸	امراض یورولوژی	پوهندوی دوکتور غلام سخی حسنی	کابل طبی پوهنتون
۱۰۹	کمک های اولیه	پوهاند دوکتور نجیب الله امرخیل	کابل طبی پوهنتون	۱۱۰	امراض نسایی	پوهندوی داکتر محمد حسن فرید	هرات
۱۱۱	طبي هستالوژی	پوهاند داکتر بری صدیقی	خوست	۱۱۲	امبریولوژی	پوهاند دوکتور بری صدیقی	خوست
۱۱۳	رهنمای انستیزی برای کشورهای رو به انکشاف، جلد اول	دانیل دی موس	کابل طبی پوهنتون	۱۱۴	عمومي جراحي	داکتور گل سیمای ابراهیم خیل قادری	خوست
۱۱۵	رهنمای انستیزی برای کشورهای رو به انکشاف، جلد دوم	دانیل دی موس	کابل طبی پوهنتون	۱۱۶	عضوي کيميا، د اليفاتيک برخه	پوهندوی دوکتور گل حسن ولیزی	خوست
۱۱۷	احصاییه	پوهاند محمد بشیر دودیال	ننګرهار	۱۱۸	د کوچنیانو خوار ځواکي	پوهندوی داکتر سمیع الله حیات	ننګرهار
۱۱۹	کلاسیک او مالکیولی جنیتیک	دوکتور محمد صابر	ننګرهار	۱۲۰	تصویرې یا تر سیمې راډیو گرافي	پوهنوال داکتر غلام سخی رحمانزی	ننګرهار
۱۲۱	د داخلي بېړنۍ پېښې او د بحران څارنه	پوهنوال داکتر حفیظ الله اپریدی	ننګرهار	۱۲۲	اورتوپیدی	پوهندوی داکتر سید شال سیدی	ننګرهار
۱۲۳	د عامی روغتیا اساسات او اداره	پوهنمل داکتر محمد عارف رحمانی	ننګرهار	۱۲۴	طبي ترمینالوژي	دوکتور گل سیمای ابراهیم خیل قادری	ننګرهار
۱۲۵	هلمنتولوژي	پوهاند داکتر سید رفیع الله حلیم	ننګرهار	۱۲۶	وراثت او ډسمورفولوژي	پوهنمل داکتر مسیح الله مسیح	ننګرهار
۱۲۷	د بېړنیو پېښو د درملنې لارښود (انګلیسی)	پوهنوال داکتر ایمل شیرزی	ننګرهار	۱۲۸	د نوبو زېږدلو ماشومانو د ستونزو اهتمات	پوهندوی داکتر ناصر خان کاموال	ننګرهار
۱۲۹	د سیستمونو پتالوژي	پوهنوال داکتر خلیل احمد بهسودوال	ننګرهار	۱۳۰	په ماشومانو کې نری رنځ	پوهنمل داکتر حقیق الله چار دیوال	ننګرهار
۱۳۱	د اتونوم او مرکزي عصبي سیستمونو فارمکولوژي	داکتور غلام ربی بهسودوال	ننګرهار	۱۳۲	د ننگرهار طب پوهنځی نصاب او درسی مفردات (انګلیسی)	ننگرهار طب پوهنځی	ننګرهار
۱۳۳	د درملو د استعمال عملی لارښود (انګلیسی / پښتو)	داکتور مالتی ایل وان بلومرودر	ننګرهار	۱۳۴	عمومي کیمیا	پوهاند دوکتور خیرمحمد ماموند	ننګرهار
۱۳۵	اناتومی (هدوکی، مفاصل او عضلات)	پوهنمل داکتر محمد ناصر نصرتی	ننګرهار	۱۳۶	فارمکولوژی، دوهم ټوک	پوهنوال داکتر سید قمبر علی حیدری	ننګرهار
۱۳۷	حاد اپنډیساییتیس، تشخیص، اختلالات او تداوي	پرفیسور دوکتور محمد شریف سروری	خوست	۱۳۸	د جهازانو اناتومي	پوهنوال داکتر محمد حسین یار	ننګرهار
۱۳۹	امبریولوژي	پوهنوال داکتر محمد حسین یار	ننګرهار	۱۴۰	اناتومی دریم جلد عصبي سیستم، حواس او اندوکراین غدوات	پوهنمل داکتر محمد ناصر نصرتی	ننګرهار
۱۴۱	طبي امبریولوژی	پوهنمل داکتر محمد ناصر نصرتی	ننګرهار	۱۴۲	د ماشومانو د ناروغیو عملي لارښود (انګلیسي)	داکتور مالتی ال-وان بلومرودر	ننګرهار
۱۴۳	د طبي عامو ستونځو عملي لارښود (انګلیسي)	داکتور مالتی ال-وان بلومرودر	ننګرهار	۱۴۴	د رواني روغتيايي ستونځو عملي لارښود (انګلیسي)	سیان نیکولاس	ننګرهار
۱۴۵	نشه یی توکي او اړونده ناروغی	داکتور محمد سمین ستانکرزی	ننګرهار	۱۴۶	د شحمیاتو انقلاب	دوکتور محمدم عظیمی	ننګرهار
۱۴۷	عصبي جراحي	پوهندوی داکتر عبدالصیر منگل	ننګرهار	۱۴۸	سرطان او د چاپیریال راډیو اکتیویتي	پوهنوال داکتر نظر محمد سلطانی څدران	ننګرهار
۱۴۹	بېړنۍ طبی درملنې	داکتور سید ملیار سادات	ننګرهار	۱۵۰	د تنفسي سیستم فزیولوژي	دوکتور احسان الله احسان	ننګرهار
۱۵۱	نیوتنولوژي	پوهنوال داکتر عبدالستار نیازی	ننګرهار	۱۵۲	عصبي ناروغی	پوهنمل داکتر بلال پاینده	ننګرهار

۱۵۳	د زړه برقي گراف (ECG)	زنځوروال ډاکټر سيد عبدالله سادات	ننګرهار	۱۵۴	الټراسونډ	ډاکټر محمد يونس سلطاني	ننګرهار
۱۵۵	د شکري ناروغي	ډاکټر محمد نعيم همدرد	ننګرهار	۱۵۶	فيزيکي تشخيص	ډاکټر عبدالناصر جبارخيل	ننګرهار
۱۵۷	تلویزيوني آزمويڼي	پوهندوی ډاکټر نجيب الله خيليلي	ننګرهار	۱۵۸	د هضمي سيستم اناتومي	پوهنمل ډکتور محمد ناصر نصرتی	ننګرهار
۱۵۹	د بولي تناسلي سيستم اناتومي	پوهنمل ډکتور محمد ناصر نصرتی	ننګرهار	۱۶۰	د زړه او د وينی د رگونو اناتومي	پوهنمل ډکتور محمد ناصر نصرتی	ننګرهار
۱۶۱	عصبي جراحي	پوهندوی دوکتور فضل الرحيم شگيوال	ننګرهار	۱۶۲	بيوفيزيک	پوهنيار پېښنه بنايي	ننګرهار
۱۶۳	د کوچنيانو نارغی د پنځم ټولگی د لومړی سمیستر لپاره	پوهاند ډاکټر عبدالستار نيازی	ننګرهار	۱۶۴	د کوچنيانو د جهازاتو معمولي ناروغي I	پوهاند ډاکټر عبدالستار نيازی	ننګرهار
۱۶۵	د کوچنيانو د جهازاتو معمولي ناروغي II	پوهاند ډاکټر عبدالستار نيازی	ننګرهار	۱۶۶	انتاني ناروغي	پوهنوال ډاکټر حفيظ الله اپريدی	ننګرهار
۱۶۷	د اندوکراین، زړه، رگونو او پښتورگو فزيوزي	پوهنوال ډاکټر احسان الله احسان	ننګرهار	۱۶۸	د جراحي انکال	رنځوريار ډاکټر عجب گل مومند	ننګرهار
۱۶۹	د ځيگر ویروسی التهاب (طبی تشخيص او درملنه)	دوکتور محمد اسحاق شريفی	ننګرهار	۱۷۰	ملاريا	دوکتور محمد اسحاق شريفی	ننګرهار
۱۷۱	طبي پرازينټولوژي	پوهنوال دوکتور غلام جيلاني ولي	ننګرهار	۱۷۲	وراثت	پوهنوال دوکتور گل سالم شرافت	ننګرهار
۱۷۳	د کوچنيانو ناروغی لومړی ټوک	پوهاند دوکتور احمد سير احمدی	ننګرهار	۱۷۴	د کوچنيانو ناروغی دوهم ټوک	پوهاند دوکتور احمد سير احمدی	ننګرهار
۱۷۵	عقلی ناروغی	ډاکټر بلال پاينده	ننګرهار	۱۷۶	فيزيکي کيميا دوهم جلد، ترمودينامیک	حبيب الله نوابزاده	ننګرهار
۱۷۷	کسرونه او خلعي	پوهندوی سيد بها کریمي	ننګرهار	۱۷۸	د کوچنيانو ساري ناروغی	پوهندوی دوکتور نجيب الله امين	ننګرهار
۱۷۹	نسايي ناروغی	پوهندوی دوکتورس تورپيکې اپريدی	ننګرهار	۱۸۰	د گيډی د ملحقاتو د جراحي ناروغي	پوهنوال دوکتور بادشاه زار عبدالی	خوست
۱۸۱	د ماشومانو د معدې معايي سيستم او يني ناروغی	پوهنمل ډاکټر ولی گل مخلص	خوست	۱۸۲	د سيستمونو پتالوژي ديمه برخه	پوهاند دوکتور خليل احمد بهسودوال	ننګرهار
۱۸۳	د سيستمونو هستالوژي	پوهاند دوکتور خليل احمد بهسودوال	ننګرهار	۱۸۴	د پوستکي ناروغی	پوهنوال ډاکټر سيد انور اکبري	ننګرهار
۱۸۵	د ټټر اناتومي	پوهنيار دوکتور يما صديقي	ننګرهار	۱۸۶	رهنمای عملی مشکلات عام طبي (دری)	ډاکټر مالتی ايل وان بلومرودر	بلخ
۱۸۷	عمومي هستالوژي	پوهاند دوکتور خليل احمد بهسودوال	ننګرهار	۱۸۸	راديولوژي ازموينی او ناروغتياوې	پوهنوال ډاکټر غلام سخی رحماني	ننګرهار
۱۸۹	د نيونتاالوژي او کوچنيانو د ناروغيو کلينيکي هندېوک	پوهنوال دوکتور منصور اسلم زی	ننګرهار	۱۹۰	د طبابت لنډ تاريخ	پوهاند عبدالحی مومنی	ننګرهار
۱۹۱	ميخانيک او د نور فزيک	پوهنيار هدايت الله	ننګرهار	۱۹۲	د برق فزيک	پوهنيار هدايت الله	ننګرهار
۱۹۳	عمومي بيولوژي	پوهنمل جماعت خان همت	ننګرهار	۱۹۴	د تنفسی سيستم او د زړه روماتيزمل ناروغی	پوهاند دوکتور سيف الله هادي	ننګرهار
۱۹۵	فارمکولوژي، دريم ټوک	پوهنوال سيد قمبر علي حيدري	ننګرهار	۱۹۶	عمومي پتالوژي	پوهندوی دوکتور محمد آصف	ننګرهار
۱۹۷	طبي فزيولوژي	پوهاند شريف الله نعمان	ننګرهار	۱۹۸	د پلاستيک جراحي اساسات او تخنيکونه	ډاکټر الفت هاشمی	ننګرهار
۱۹۹	عمومي بيولوژي	پوهندوی الفت شیرزی	ننګرهار	۲۰۰	د عصبي سيستم اناتومي	پوهنيار دوکتور يما صديقي	ننګرهار
۲۰۱	د سينې سرطان، پېژندنه، درملنه او مخنيوی	پوهنوال ډاکټر نظر محمد سلطانی خدران	ننګرهار	۲۰۲	د وينې حجرو، تنفي جهاز، هضمي جهاز، او نوو زېږېدلو فزيولوژي	پوهنوال دوکتور جنت مير مومند	ننګرهار
۲۰۳	د سينې بطن او حوصلې اناتومي	پوهندوی ډاکټر حميدالله حامد	خوست	۲۰۴	فيزيکي تشخيص او د تاريخچې اخسته	پوهاند ډاکټر شريف الله	ننګرهار

۲۰۵	د ځانګړو حسیتونو، پوسټکي، اوتونوميک او مرکزي سېسټم فزیولوژي	پوهنوال دوکتور محب الله شینوار	ننګرهار	۲۰۶	د درملو بدن اغیزی	پوهنوال سید قمبر علی حیدری	ننګرهار
۲۰۷	جراحی عمومی اطفال	پوهنپار داکتر توریالی حکیمی	کابل طبی پوهنتون	۲۰۸	معاینات کلینیکی اطفال بطور ساده	پوهندوی دوکتور سید نجم الدین جلال	کابل طبی پوهنتون
۲۰۹	۱۴۰ طبي کتابونه په دی وی دی کې (پښتو، دري او انګلیسی)	بېلا بېل مؤلفین	ټول پوهنتونونه	۲۱۰	۲۱۴ طبي کتابونه په دی وی دی کې (پښتو، دري او انګلیسی)	بېلا بېل مؤلفین	ټول پوهنتونونه
۲۱۱	عصبي معاینات او سلوکپوهنه	پوهنوال داکتر جهان شاه تبی	خوست	۲۱۲	عصبي جراحي	پوهاند دوکتور بادشاه زار عبدالي	خوست
۲۱۳	د عامو کسرونو تړلې درملنه	پوهندوی دوکتور ظاهر گل منگل	خوست	۲۱۴	د ویني ناروغی	داکتر حیات الله احمدزی	ننګرهار
۲۱۵	د داخله ناروغیو تفریقي تشخیص لومړی برخه	پوهاند دوکتور سیف الله هادی	ننګرهار	۲۱۶	د داخله ناروغیو تفریقي تشخیص دهمه برخه	پوهاند دوکتور سیف الله هادی	ننګرهار
۲۱۷	امینو فارمکولوژي	پوهنوال دوکتور غلام ربی بېسودوال	ننګرهار	۲۱۸	د ماشومانو تنفسي، زړه، وینې او پښتورگو ناروغی	پوهاند داکتر نجیب الله امین	ننګرهار
۲۱۹	تشخیصیه رادیولوژي، دوهمه برخه، سینه یا صدر	دوکتور نور محمد شینوار	ننګرهار	۲۲۰	طبی فزیک	پوهنپار هدایت الله مهمند	ننګرهار
۲۲۱	رادیولوژي	پوهنوال داکتر سید عارف ویار		۲۲۲	اندوکراینولوژي او روماتولوژي	پوهاند دوکتور سیف الله هادي	ننګرهار
۲۲۳	د کوچنیانو جراحي	پوهاند داکتر فضل الرحیم شگیوال	ننګرهار	۲۲۴	د سترګې کلینیکی ناروغی	پوهنوال داکتر عبدالصیر صافی	ننګرهار
۲۲۵	بیوفزیک	پوهنپار گل احمد سهیل	ننګرهار	۲۲۶	مالیکولي بیولوژي	پوهندوی جماعت خان همت	ننګرهار
۲۲۷	د ماشومانو انتاني ناروغی	پوهاند دوکتور عبدالستار نیازی	ننګرهار	۲۲۸	د ماشومانو اساسات، هضمي، اندوکراین او عصبي ناروغی	پوهاند سمیع الله حیات	ننګرهار
۲۲۹	تنفسي او د زړه روماتیزمل ناروغی	پوهندوی داکتر سلام جان شمس	ننګرهار	۲۳۰	یورولوژي	داکتر غازی جمال عبدالناصر	ننګرهار
۲۳۱	طبي جنیتیک	پوهندوی الفت شیرزی	ننګرهار				

تطبیق کوونکی: داکتر حیجی وردگ، د لوړو زده کړو وزارت مشاور، څلورمه کارته، کابل افغانستان، جون ۲۰۱۹
دفتري: 0756014640، ایمیل: www.mohe.gov.af, textbooks@afghanic.de

افغاني درسي کتابونو ته آنلاین لاس رسی
Access to Online Afghan Textbooks
www.ecampus-Afghanistan.org
 Full version of all textbooks can be downloaded as PDF from above website.



If you want to publish your textbooks please contact us: Dr. Yahya Wardak, Ministry of Higher Education, Kabul, Office: 0756014640, Email: textbooks@afghanic.de

Publishing Textbooks

Honorable lecturers and dear students!

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To tackle this issue, we have initiated the process of providing textbooks to the students of medicine. For this reason, we have published 311 different textbooks of Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism and Agriculture (96 medical textbooks funded by German Academic Exchange Service, 190 medical and non-medical textbooks funded by Kinderhilfe-Afghanistan, 7 textbooks funded by German-Afghan University Society, 2 textbooks funded by Consulate General of the Federal Republic of Germany, Mazar-e Sharif, 3 textbooks funded by Afghanistan-Schulen, 2 textbooks funded by SlovakAid, 1 textbook funded by SAFI Foundation, 8 textbooks funded by Konrad Adenauer Stiftung and 1 textbook funded by inasys) from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-Beroni, Kabul, Kabul Polytechnic and Kabul Medical universities. The book you are holding in your hands is a sample of a printed textbook. It should be mentioned that all these books have been distributed among all Afghan universities and many other institutions and organizations for free. All the published textbooks can be downloaded from www.ecampus-afghanistan.org.

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states:

"Funds will be made available to encourage the writing and publication of textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority areas, to improve the quality of teaching and learning and give students access to state-of-the-art information. In the meantime, translation of English language textbooks and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum reform. Without this facility it would not be possible for university students and faculty to access modern developments as knowledge in all disciplines accumulates at a rapid and exponential pace, in particular this is a huge obstacle for establishing a research culture. The Ministry of Higher Education together with the universities will examine strategies to overcome this deficit".

We would like to continue this project and to end the method of manual notes and papers. Based on the request of higher education institutions, there is the need to publish about 100 different textbooks each year.

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate or revise their lecture notes or written books and share them with us to be published. We will ensure quality composition, printing and distribution to Afghan universities free of charge. I would like the students to encourage and assist their lecturers in this regard. We welcome any recommendations and suggestions for improvement.

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the books according to the international standards, but if there is any problem in the book, we kindly request the readers to send their comments to us or the authors in order to be corrected for future revised editions.

We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book. We would also like to mention that he has provided funds for 190 medical and non-medical textbooks so far.

I am especially grateful to GIZ (German Society for International Cooperation) and CIM (Centre for International Migration & Development) for providing working opportunities for me from 2010 to 2016 in Afghanistan.

In our ministry, I would like to cordially thank Acting Minister of Higher Education Prof Abdul Tawab Balakarzai, Administrative & Financial Deputy Minister Prof Dr. Ahmad Seyer Mahjoor (PhD), Financial Director Ahmad Tariq Sediqi, Advisor at Ministry of Higher Education Dr. Gul Rahim Safi, Chancellor of Universities, Deans of faculties, and lecturers for their continuous cooperation and support for this project .

I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues Hekmatullah Aziz and Fahim Habibi in the office for publishing books.

Dr Yahya Wardak
Advisor at the Ministry of Higher Education
Kabul, Afghanistan, February, 2020
Mobile: 0706320844
Email: textbooks@afghanic.de

Message from the Ministry of Higher Education

In history, books have played a very important role in gaining, keeping and spreading knowledge and science, and they are the fundamental units of educational curriculum which can also play an effective role in improving the quality of higher education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and today's requirements and based on educational standards, new learning materials and textbooks should be provided and published for the students.



I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very thankful to those who have worked for many years and have written or translated textbooks in their fields. They have offered their national duty, and they have motivated the motor of improvement.

I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish textbooks in their respective fields so that, after publication, they should be distributed among the students to take full advantage of them. This will be a good step in the improvement of the quality of higher education and educational process.

The Ministry of Higher Education has the responsibility to make available new and standard learning materials in different fields in order to better educate our students.

Finally I am very grateful to German Aid for Afghan Children (Kinderhilfe-Afghanistan) and our colleague Dr. Yahya Wardak that have provided opportunities for publishing this book.

I am hopeful that this project should be continued and increased in order to have at least one standard textbook for each subject, in the near future.

Sincerely,
Prof Abdul Tawab Balakarzai
Acting Minister of Higher Education
Kabul, 2020

Book Name General Human Clinical Embryology
Author Teaching Assist. Dr Abdullah Jan Shinwari
Publisher Nangarhar University, Medical Faculty
Website www.nu.edu.af
Published 2020
Copies 1000
Serial No 293
Download www.ecampus-afghanistan.org



This publication was financed by German Aid for Afghan Children (**Kinderhilfe-Afghanistan**), a private initiative of the Eroes family in Germany.

Administrative and technical support by Afghanic.

The contents and textual structure of this book have been developed by concerning author and relevant faculty and being responsible for it.

Funding and supporting agencies are not holding any responsibilities.

If you want to publish your textbooks, please contact us:

Dr. Yahya Wardak, Ministry of Higher Education, Kabul, Afghanistan

Office 0756014640, 0706320844

Email textbooks@afghanic.de

All rights reserved with the author.

Printed in Afghanistan 2020, Sahar Printing Press

ISBN 978-9936-620-66-7