



تعلیم او تربیه پوهنځی



Shaikh Zayed University, Khost, Education Faculty

Afghanic


طبي کیمیا



طبي کیمیا

Associate Prof Amrullah Asefi

Medical Chemistry



Funded by
Kinderhilfe-Afghanistan

پوهنوال امرالله آصفي



۱۴۰۰

پلورل منع دی



ISBN 978-9936-620-73-5



9 789936 620735

Not For Sale

2021

طبي کیمیا

پوهنوال امرالله آصفي



Pashto PDF
2021



Shaikh Zayed University, Khost, Education Faculty
تعليم او تربيه پوهنځی

Funded by
Kinderhilfe-Afghanistan

Medical Chemistry

افغانیک
Afghanic

Associate Prof Amrullah Asefi

Download:

www.kitabona.com

www.ecampus-afghanistan.org

اقراً باسم ربك الذي خلق

طبي کیمیا

پوهنوال امرالله آصفي

لومړی چاپ

دغه کتاب په پي ډي ايف فارمټ کې په مله سي ډي کې هم لوستلی شئ:



د کتاب نوم	طبي کيميا
مؤلف	پوهنوال امرالله آصفي
خپرندوی	شيخ زايد پوهنتون، خوست، تعليم او تربيه پوهنځی
وېب پاڼه	www.szu.edu.af
د چاپ کال	۱۴۰۰، لومړی چاپ
چاپ شمېر	۱۰۰۰
مسلسل نمبر	۳۳۸
ډاونلوډ	www.ecampus-afghanistan.org
	www.kitabona.com



دا کتاب د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې، په جرمني کې د Eroes کورنۍ يوې خيريه ټولنې لخوا تمويل شوی دی. اداري او تخنیکي چارې يې په آلمان کې د افغانیک لخوا ترسره شوي دي. د کتاب د محتوا او ليکنې مسؤليت د کتاب په ليکوال او اړونده پوهنځي پورې اړه لري. مرسته کوونکي او تطبيق کوونکي ټولنې په دې اړه مسؤليت نه لري.

د تدريسي کتابونو د چاپولو لپاره له مور سره اړيکه ونيسئ:
ډاکتر يحيی وردک، د لوړو زده کړو وزارت، کارته ۴، کابل
موبايل ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴، ۰۷۸۰۲۳۲۳۱۰
ايمېل textbooks@afghanic.org

د چاپ ټول حقوق له مؤلف سره خوندي دي.

ای اس بی ان ۵-۷۳-۶۲۰-۹۹۳۶-۹۷۸

د لوړو زده کړو وزارت پیغام



د بشر د تاریخ په مختلفو دورو کې کتاب د علم او پوهې په لاسته راوړلو، ساتلو او خپرولو کې ډېر مهم رول لوبولی دی. درسي کتاب د نصاب اساسي برخه جوړوي چې د زده کړې د کیفیت په لوړولو کې مهم ارزښت لري. له همدې امله د نړیوالو پېژندل شویو معیارونو، د وخت د غوښتنو او د ټولنې د اړتیاوو په پام کې نیولو سره باید نوي درسي مواد او کتابونه د محصلینو لپاره برابر او چاپ شي.

له ښاغلو استادانو او لیکوالانو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې دوامداره زیار یې ایستلی او د کلونو په اوږدو کې یې په خپلو اړوندو څانگو کې درسي کتابونه لیکلي او ژباړلي دي، خپل ملي پور یې ادا کړی او د پوهې موتور یې په حرکت راوستی دی. له نورو ښاغلو استادانو او پوهانو څخه هم په درنښت غوښتنه کوم چې په خپلو اړوندو برخو کې نوي درسي کتابونه او درسي مواد برابر او چاپ کړي، چې له چاپ وروسته گرانو محصلینو ته په واک کې ورکړل شي او د زده کړو د کیفیت په لوړولو او د پوهې د انتقال پروسې په پرمختگ کې یې ښکې گام اخیستی وي.

د لوړو زده کړو وزارت خپله دنده بولي چې د گرانو محصلینو د علمي کچې د لوړولو لپاره د علومو په مختلفو څانگو کې معیاري او نوي درسي مواد برابر او چاپ کړي. په پای کې د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمیټې او زموږ همکار ډاکټر یحیی وردگ څخه مننه کوم چې د دې کتاب د خپرولو لپاره یې زمینه برابره کړې ده.

هېله من یم چې نوموړې گټوره پروسه دوام وکړي او پراختیا ومومي چې په نژدې راتلونکي کې د هر درسي مضمون لپاره لږ تر لږه یو معیاري درسي کتاب ولرو.

په درنښت

پوهنمل دیپلوم انجنیر عبدالنواب بالاکرزي

د لوړو زده کړو وزارت علمي معین

کابل، ۱۴۰۰ ل

د درسي کتابونو چاپول

قدرمنو استادانو او گرانو محصلينو!

د افغانستان په پوهنتونونو کې د درسي کتابونو کموالی او نشتوالی له لویو ستونزو څخه گڼل کېږي. یو زیات شمېر استادان او محصلین نویو معلوماتو ته لاسرسی نه لري، په زاړه میتود تدریس کوي او له هغو کتابونو او چپترونو څخه گټه اخلي چې زاړه دي او په بازار کې په ټیټ کیفیت فوټوکاپي کېږي.

موږ تر اوسه پورې د ننگرهار، خوست، کندهار، هرات، بلخ، البیروني، کابل پوهنتون، د کابل طبي پوهنتون او د کابل پولې تخنیک پوهنتون لپاره ۳۴۲ عنوانه مختلف درسي کتابونه د طب، ساینس، انجنیري، اقتصاد، ژورنالېزم او کرهڼې پوهنځیو لپاره چاپ کړي دي. ۹۶ طبي کتابونه د آلمان د علمي همکاريو ټولنې DAAD، ۲۱۰ طبي او غیر طبي کتابونه د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې (Kinderhilfe-Afghanistan)، ۷ کتابونه د آلماني او افغاني پوهنتونونو ټولنې DAUG، ۲ کتابونه په مزار شریف کې د آلمان فدرال جمهوري جنرال کنسولگری، ۴ کتابونه د Afghanistan-Schulen، ۲ کتابونه د سلواک اېډ، ۸ کتابونه د کنراد ادناور شتیفتونگ بنسټ (KAS) په مالي مرسته چاپ کړي دي.

د یادونې وړ ده، چې نوموړي چاپ شوي کتابونه د هېواد ټولو اړوندو پوهنتونونو او یو زیات شمېر ادارو او موسساتو ته په وړیا توگه وېشل شوي دي. ټول چاپ شوي کتابونه له www.afghanistan-ecampus.org او www.kitabona.com ویب پاڼې څخه ډانلودولی شئ.

دا کړنې په داسې حال کې تر سره کېږي چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د (۲۰۱۰-۲۰۱۴) کلونو په ملي ستراتیژیک پلان کې راغلي دي چې: دا کړنې په داسې حال کې ترسره کېږي چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د (۲۰۱۰-۲۰۱۴) کلونو په ملي ستراتیژیک پلان کې راغلي دي چې:

"د لوړو زده کړو او د ښوونې د ښه کیفیت او زده کوونکو ته د نویو، کره او علمي معلوماتو د برابرولو لپاره اړینه ده، چې په دري او پښتو ژبو د درسي کتابونو د لیکلو فرصت برابر شي، د تعلیمي نصاب د ریفورم لپاره له انگریزي ژبې څخه دري او پښتو ژبو ته د کتابونو او درسي موادو ژباړل اړین دي، له دغو امکاناتو پرته د پوهنتونونو محصلین او استادان عصري، نویو، تازه او کره معلوماتو ته لاسرسی نه شي پیدا کولای."

موږ غواړو چې د درسي کتابونو په برابرولو سره د هېواد له پوهنتونونو سره مرسته وکړو او د چپتر او لکچرنوټ دوران ته د پای ټکی کېږدو. د دې لپاره اړینه ده چې د افغانستان پوهنتونونو لپاره هر کال لږ تر لږه ۱۰۰ عنوانه درسي کتابونه چاپ شي.

له ټولو درنو استادانو څخه هيله کوو، چې په خپلو مسلکي برخو کې نوي کتابونه وليکي، ويې ژباړي او يا هم خپل پخواني ليکل شوي کتابونه، لکچرنوټونه او چټپرونه ايډېټ او د چاپ لپاره تيار کړي، زموږ په واک کې يې راکړي چې په ښه کيفيت چاپ او وروسته يې د اړوند پوهنځيو، استادانو او محصلينو ته په واک کې ورکړو. همدارنگه د يادو ټکو په اړه خپل وړانديزونه او نظريات له موږ سره شريک کړي، چې په گډه په دې برخه کې اغېزمن گامونه پورته کړو.

د ليکوالانو او خپروونکو له خوا پوره زيار ايستل شوی دی، چې د کتابونو محتويات د نړيوالو علمي معيارونو پر اساس برابر شي، خو بيا هم کېدای شي د کتاب په محتوا کې ځينې تېروتنې او ستونزې وليدل شي، نو له درنو لوستونکو څخه هيله لرو چې خپل نظريات او نيوکې ليکوتل او يا موږ ته په ليکلې بڼه راولېږي، چې په راتلونکي چاپ کې اصلاح شي.

د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې او د هغې له مشر ډاکټر ابروس څخه ډېره مننه کوو چې د دغه کتاب د چاپ لگښت يې ورکړی دی، دوی تر دې مهاله د ننگرهار پوهنتون د ۲۱۰ عنوانه طبي او غير طبي کتابونو د چاپ لگښت پر غاړه اخيستی دی.

د جي آي زېټ (GLZ) له دفتر او (CIM (Center for International Migration & Development څخه، چې زما لپاره يې له ۲۰۱۰ نه تر ۲۰۱۶ زېږديز کاله پورې په افغانستان کې د کار امکانات برابر کړي وو، هم د زړه له کومې مننه کوم.

د لوړو زده کړو له علمي معين پوهنمئل ډيپلوم انجنير عبدالنواب بالاکزي، د مالي او اداري معين ښاغلي نور احمد دروېش، د لوړو زده کړو وزارت سلاکار ډاکټر گل رحيم صافي، د پوهنتونونو رييسانو، د پوهنځيو رييسانو او استادانو څخه مننه کوم چې د کتابونو د چاپ لړۍ يې هڅولې او مرسته يې ورسره کړې ده. د دغه کتاب له ليکوال څخه ډېر منندوی یم او ستاينه يې کوم، چې خپل د کلونو - کلونو زيار يې په وړيا توگه گرانو محصلينو ته وړاندې کړ.

همدارنگه د دفتر له همکارانو هر يو، ښاغلي حکمت الله عزيز او ښاغلي فهيم حبيبي څخه هم مننه کوم چې د کتابونو د چاپ په برخه کې يې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړې دي.

ډاکټر يحيی وردک، د لوړو زده کړو وزارت سلاکار

کابل، مې، ۲۰۲۱

د دفتر ټيليفون: ۰۷۸۰۲۳۲۳۱۰، ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴

ايميل: textbooks@afghanic.org

مخکي خبري

لکه څرنگه چې ټولو لوستونکو ته معلومه ده زموږ گران افغانستان کې د ډير پخوا راهيسې ډير لږ علمي اثار په ميلي ژبو (پښتو او دري) چاپ شوي دي ، دغه علمي اثار په ورستيو اوږدو جگړو کې په زيا ته اندازه د منځه ولاړل او زمونږ فرهنگي ستونزې د اقتصادي ، سياسي او ټولنيزو ستونځو په څير نور هم زياتې شوي . لدې کبله خپله دنده گڼم چې د پوهنتونونو ، علمي موسيسو او مرکزونو د زده کونکو ، استادانو او نورو علاقه مندانو لپاره د طبي کيميا د رسالې په ليکلو سره يو څه اندازه خدمت تر سره کړم . د دې رسالې (کتاب) په ليکلو کې د ټولو هغه ستندرد علمي اثار او کتابونو څخه چې په نړيواله کچه پوهنتونونو کې تدریس کيږي گټه اخستل شوې او کوشش شوي دي چې د مروجو او معمولي اصطلاحاتو په کارولو سره د زده کونکو اود طبي کيميا د مينه والو د بڼه پو هيد و سبب وگرزي .په نظر کېنې ده چې د دې کتاب څخه د ښوني اوزرني پوهنځي د کيميا څانگې او بيولوژي څانگې د محصلينو لپاره درسي کتاب ، د فارمسي پوهنځي د درمل جوړوني . طب ، وترنري ، زراعت پوهنځيو د محصلينو لپاره د درسي مرستندويه کتاب په توچه گټه واخستل شي د دې لپاره چې د دې رسالې څخه ښه گټه تر لاسه شوي وي دا کتاب په ۱۵۳ پاڼو کې ځاي پر ځاي شوي دي چې د کيميا څانگې په څلورم سمستر کې اود ستوماتولوژي پوهنځي په لمړي او دوهم سمسترونو کې د درسي کړيکولم سره سم تدریس کيږي ، د بيولوژي څانگې محصلين په دريم سمستر کې ورڅخه د درسي کتاب په توگه کار اخستلاي شي . په دې کتاب کې د عناصرو طبي اهميت ، د منرالو نو ميتابوليزم اود مغوي اهميت دانسان په بدن کې په ډيره ښه توگه سره څيرل شوي دي چې محصلين او استادان کولي شي په ډيره اسانه طريقه سره ور څخه گټه اخستلاي شي .

څرنگه چې زمونږ ميلي ژبي (پښتو او دري) د علمي اصطلاحاتو څخه غريبې دي نو څر گنده خبره ده چې په علمي اصطلاحگانو او ليکلو کېنې به نيمگړ تياوي ډيري وي . سره د دې هم هيله کوم چې د دې رسالې (کتاب) ليکل زمونږ د گران هيواد افغانستان د علمي زيرموپه غني کولو کې يو کوچنی گام وگڼل شي .

زه د دې رسالې د ښاغلو لوستونکو څخه هيله لرم چې خپل انتقاد ونه او اصلاحي پيشنهادونه د دې رسالې (کتاب) د وروستي چاپ د اصلاح لپاره دريغ نکړي او مونږ ته يې راو ليږي تر څو چې په بل چاپ کې هغه اصلاح اود گرانو هيواد والو په چوپړ کې حاضر کړل شي .

په درنښت

پوهنوال امرالله اصفي

شيخ زايد پوهنتون او د اسلامي پوهنتون د کيميا استاد

لړلیک

- ۱.....: سریزه
- ۲.....: د عناصرو دوراني جدول
- ۳.....: ایونونه او کټیونونه
- ۳.....: (Anions) ایونونه
- ۴.....: فاسفیتونه : (PO_4^{3-}) کوم وخت چی فاسفیتونه دنیترومولبدیک معیار سره یوځای شی
- ۵.....: دآیونونوپېژندل:
- ۶.....: سرب Pb اودرانه فلزات :
- ۷.....: اوسپنه Fe:
- ۷.....: بسموت Bi:
- ۸.....: نقره Ag:
- ۸.....: مس (Cu):
- ۹.....: کلسیم Ca:
- ۹.....: سودیم Na^+ .
- ۱۰.....: پوتاشیم K.
- ۱۲.....: لمړي گروپ عناصر
- ۱۲.....: خواص :
- ۱۳.....: طبي استعمال :
- ۱۳.....: سودیم (Na)
- ۱۳.....: سودیم کلوراید (NaCl)
- ۱۳.....: فزیکي خواص :
- ۱۳.....: طبي استعمال :
- ۱۴.....: پوتاشیم کلوراید (KCl)
- ۱۴.....: تشخیص :
- ۱۵.....: لاسته راوړلو طریقه :
- ۱۵.....: د د و هم گروپ عناصر (2A group Elements)
- ۱۵.....: مگنیزیم (Mg)
- ۱۶.....: مگنیزیم کار بونات ($MgCO_3$)
- ۱۶.....: مگنیزیم اکساید (MgO)
- ۱۶.....: مگنیزیم کلوراید ($MgCl_2$)

۱۷	مگنیزیم اسیتات ($\text{Mg}(\text{CH}_3\text{COO})_2$)
۱۷	کلسیم (Ca)
۱۷	کلسیم کاربونیٹ (CaCO_3)
۱۷	باریم (Ba)
۱۸	باریم سلفیٹ (BaSO_4)
۱۸	زنگ یا جست (Zn)
۱۸	زنگ اکساید (ZnO)
۱۸	د جستو سلفیٹ (ZnSO_4)
۱۹	بورون (B)
۱۹	بور ترای اکساید (B_2O_3)
۲۰	المونیوم (Al)
۲۰	المونیوم هایدرواکساید ($\text{Al}(\text{OH})_3$)
۲۰	د څلورم اصلي گروپ (4A) عناصر
۲۱	کاربن (C)
۲۱	کاربنیک اسید گاز (CO_2)
۲۲	سلیکان (Si)
۲۲	مگنیزوم ترای سلیکیٹ ($\text{Mg}_2\text{Si}_3\text{O}_8$)
۲۲	تالک (Talc)
۲۳	کاولین ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$)
۲۳	سرب (Pb)
۲۳	د سربو اکساید (PbO)
۲۳	د سربو اکساید طبي استعمال
۲۴	د پنځم اصلي (5A) گروپ عناصر
۲۴	امونیا (NH_3)
۲۵	امونیوم کلوراید (NH_4Cl)
۲۵	نایتروس اکساید (N_2O)
۲۶	سودیم نایترايت (NaNO_2)
۳۰	سلفر (S)
۳۱	سودیم سلفاید (Na_2S)

۳۱	سودیم سلفایت (Na_2SO_3)
۳۱	سودیم سلفیت (Na_2SO_4)
۳۲	اووم اصلي گروپ (7A) گروپ عناصر
۳۳	کلورو هیدریک اسید (HCl)
۳۳	د هلو جنو اکسیجنی مشتقات (هایپو کلوریتونه)
۳۴	کلسیم هایپو کلوریت (CaOCl_2)
۳۴	سودیم کلوراید (NaCl)
۳۶	پوتاشیوم کلوراید KCl :
۳۶	دسودیم (Na) اوپوتاشیم برومایدونه :
۳۹	دآیودین محلول :
۳۹	پوتاسیم پرمنگانت:
۴۰	کیمیای تعاملات :
۴۲	د هایډرو کار بنو طبي استعمال
۴۳	ایتایل کلو راید ($\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$)
۴۳	فلوئان یا هلو تان ($\text{C}_2\text{F}_3\text{ClBrH}$)
۴۳	ایود و فارم (CH_3I)
۴۳	الکولونه (Alcohol):
۴۵	گلسرین (Glycerin):
۴۶	الدهایدونه (Aldehydes):
۴۷	کاربوکسلیک اسید Carboxylic Acid او مشتقات
۴۸	کلسیم استیت Calcium acetate
۵۱	د اوسپینی لکتیک لاسته راوړی (PREOARATION):
۵۱	الیفاتیک امینو اسیدونه
۵۱	ALIPHATIC AMINO ACID
۵۵	میتونین (METHIONINE):
۵۹	د طبي کیمیا د وهمه برخه
۵۹	سریزه
۶۰	د انسان د بدن بنسټیز اسیدونه
۶۱	د اسید و نو په وړاندې د بفر محلولو نو عمل
۶۱	تنفسي سیستم

٦٢.....	بولي تناسلي سيسٽيم (Urogenital system)
٦٢.....	د تشو ميتازو اسيدي فيڪيشن (Acidification)
٦٢.....	د امونيا (NH3) جو ريډ ل
٦٢.....	د هايډرو جن (H) اطراح د يو ازاد اسيد په شڪل
٦٣.....	اسيد وزيښ
٦٤.....	الكلوزيس (Alklosis)
٦٦.....	هيټرو سايڪليڪ مر ڪيونه (Hetro cyclic Compound)
٧٢.....	الكلوزيس (Alklosis)
٧٦.....	الكلوزيس (Alklosis)
٨٢.....	دهيټرو سايڪليڪ مر ڪباتو طبي اهميت
٨٣.....	د منرالونو استقلاب (Metabolism of Minerals)
٨٦.....	ڪلسيم (Calcium)
٨٧.....	د پلازما ڪلسيم
٨٩.....	Renal Rickets رينال ريڪيٽس
٨٩.....	اوسٽو پروسيڊ (Osteoprosis)
٨٩.....	فاسفورس (Phase Phosphor)
٩٠.....	بيو شيميڪي وظيفي
٩٠.....	غذائي ضرورت
٩٠.....	د ويٺي فاسفيٽ
٩١.....	مگنيزيم (Mgnesium)
٩٢.....	سودي م (Sodium)
٩٢.....	پلازما سودي م
٩٣.....	مريض حا لتونه
٩٣.....	پوٽاشيم (Potassium)
٩٣.....	د پلازما پوٽاشيم
٩٤.....	ڪلورين (Chlorine)
٩٤.....	د پلازما ڪلورايد
٩٥.....	سلفر
٩٥.....	اوسپنه
٩٧.....	اوسپنه په مخاڻي حجرو ڪي

۹۷	په پلازما کې د اوسپني انتقال
۹۷	دواسپني ذخيره
۹۹	د پلازما مس
۱۰۱	منگانيز (Manganese)
۱۰۲	جست
۱۰۳	قندونه (Carbohydrate)
۱۰۴	26.1. د قندونو پيدايښت او عمومي اهميت
۱۰۵	26.2 د قند ونو تعريف
۱۰۶	26.3 د قندونو طبقه بندي
۱۰۷	26.4 ساده قندونه يا مونوسکرایډونه
۱۰۸	26.5 اوليگوسکرایډونه (Oligosaccharides)
۱۰۸	(۱) - ډاي سکرایډونه
۱۰۹	(۲) - تري سکرایډ ونه ($C_{18}H_{32}O_{16}$)
۱۰۹	(۳) - تترا سکرایډ ونه ($C_{24}H_{42}O_{21}$)
۱۱۰	26.7 پولي سکرایډ ونه
۱۱۰	(۱) - پولي پنتوزانونه (Polypentans)
۱۱۱	(۲) - ميتيل پنتوزانونه $H_2O (X-1) - (C_6H_{12}O_5)X$
۱۱۲	26.7 ساده قندو جوړښت
۱۱۲	26.8 غير متناظر
۱۱۳	26.9 د غير متناظر کاربن موډل اود هغې اينوي تصوير
۱۱۵	26.11 ساده قندونو جوړښت
۱۲۵	26.14 يورا نیک اسيد ونه
۱۲۸	د قندونو استقلاب (ميتابوليزم)
۱۲۸	The Hexose Monophosphate Shunt :-
۱۳۳	د خميرمايه په واسطه د الکولو جوړيدل 26.3
۱۳۴	پروتين (Protein)
۱۳۴	امين لرونکو قندونو استقلاب 26.11
۱۳۶	26.12 د شکرې ناروغي ، انسولين او گلوکاگون
۱۳۶	26.13 انسولين او دهغې ميتابوليک تاثيرات
۱۳۶	26.14 د انسولين په وسيله د عضلاتو د گلوکوز اخستل او ميتابوليزم

۱۳۷	15.27 د گلايکوجن د خیره په عضلا تو کې.....
۱۳۸	16.27 د انسولين تاثیر په نشوونما کې.....
۱۳۸	1.16.27 د انسولين د افراز کنترول.....
۱۳۹	17.27 گلوکاگون او دهغې وظيفې (Glucagon And Its Functions).....
۱۳۹	18.27 د شکرې ناروغي (Diabetes Mellitus).....
۱۴۰	20.27 گلوکوز په تشومتيازو کې.....
۱۴۱	1.20.27 GLUCOSE TOLERANCE TEST.....
۱۴۱	3.20.27 DIABETES تشخیص.....
۱۴۱	پروتين.....
۱۴۲	د پروتينو د ندي (Function of Proteins).....
۱۴۳	مأخذونه.....
۱۴۴	دمولف لنډه پيژندنه.....

طبي کيميا

لمري برخه

طبي کيميا هغه علم دی چې عناصرو اهمیت دانسان په بدن کې اود هغه تعاملتو خصوصیات بیانوي چې د انسان په بدن کې صورت نیسي تر څیرني لاندې نیسي.

سریزه :

په طبي کيميا کې د لمري گروپ عناصرو ، دوهم گروپ عناصرو ، دریم گروپ عناصرو ، دریم گروپ عناصرو ، څلورم گروپ عناصرو ، پنځم گروپ عناصرو ، شپږم گروپ عناصرو ، اووم گروپ عناصرو اود فرعي گرو پو عناصرو طبي اهمیت څیرل کیري برسیره پردې سره هایدرو کار بنونه او دهغوي طبي اهمیت ، د هایدرو کار بنو ډولونه او طبي رول دهغوي ، الکایل هایدرونو طبي استعمال الکھول ، الیدهايدونه، کیتونونه ، عضوي تیزابونه ، استرونه ، امینونه ، امینو اسیدونه، قندونه ، پروتین ، شحمیات، ویتامینونه ، انزایمونه ، کو انزایمونه ، هورمونونه ، اروماتیک مرکبونه او هیترو سایکلیک مرکبونه د طبي اهمیت له مخي تر څیرني لاندې نیول شوي دي .

موخي : محصلین په طبي کيميا کې پدې پوه شي کوم عناصر د انسان په بدن کې ښه رول لري اود هغې کموالي کون نوع ناروغي پیداکوي اوپه همدې ډول سره محصلین به دالیفاتیک مرکباتو، اروماتیک مرکباتو ، هترو سایکلیک مرکباتو طبي اهمیت د انسان په بدن کې وپیژني .

برسیره پردې سره محصلین په دې پوه چې قندونه (کاربو هایدريت) ، پروتین ، شحمیات ، ویتامینو انزایمونه ، :وانزایمونه او هورمونونه د انسان په بدن کې کوم اهمیت لري

ددې لپاره چې د انسان په بدن د عناصرو اهمیت وپیژنو ضروري ده چې په اول قدم کې د عناصرو دوراني تر څیرني لاندې ونیسو.

اوله دوره = ۲ عناصر
دوهمه دوره = ۸ عناصر
دریمه دوره = ۸ عناصر
څلورمه دوره ۱۸ عناصر
پنځمه دوره ۱۸ عناصر
شپږمه دوره : ۳۲ عنا صر
اوومه = ۳۲ عناصر

د پورتنی جدول څخه داسې څر گند یږي چې تر اوسه پوري ۱۱۸ عناصر کشف شوي دي او په عمومي ډول سره په څلور لویو برخو یعنې فلزات ، غیر فلزات ، شبه فلزات داو نجیبه غونو ویشل شوي دي .


فلزات په (**1A,2A,3A,B GVOUPS and La,AC series**) گرو پونو او د **4A** لاندې برخه (قلعي او سرب ذ) فلزات دي ، غیر فلزات په **4A, 5A,6A,7A** گروپو کې موقیعت لري ، شبه فلزات په څلورم گروپ کې (سلیکان او جرمانیوم) کې شتون لري .
فلزات مهم عناصر دي چې په کیمیاوي تعامل کې الکترون دلاسه ور کوي او مثبت ولانس لري لکه سږدیم ، پو تاشیم ، کلسیم ، مگنیزیم اونور .
غیر فلزات هغه عناصر هغه عناصر دي چې په کیمیاوي تعامل کې الکترون اخلي او منفي ولانس لري لکه اکسیجن ، کلورین ، نایتروجن ، برومین اونور .
شبه فلزات هغه عناصر دي چې فلزي او غیر فلزي خواص لري لکه سلیکان او جر مانیموم .
نجیبه عناصر هغه دي چې په کیمیاوي تعامل کې برخه نه اخلي اود چارج له مخې خنثا وي .

ایونونه او کتیونونه

د دې لپاره چې د طبی کیمیا په اساسي مفاهیمو ښه روپو هیږو نو ضروري ده انیونونه او کتیونونه باید وپیژنو ځکه چې ټول عناصر د انسان په بدن کې د انیون او کتیون په ښکله سره وي چار ج لرونکي ذره دایون په نوم سره یادي.ي ، که چرچ یې مثبت وه کتیون او که ارج یې منفي وي انیون په نوم سره یادیږي . ځنې انیونونه او کتیونونه په لاندې ډول سره تر څیړنې لاندې نیسو.


ایونونه (Anions) :

هلوچنونه :کوم وحت چی هلو جنونه په تیزابی محیط کی (**HNO₃**) د **AgNO₃** سره یوځای شی نوپه صورت کی رسوب کوی




سلفیتونه (SO_4): کوم وحت چی په تیزابی محیط کې د HCl کې د باریم کلوراید BaCl یا باریم نایتریت سره یوځای شی په هغه صورت کې سپین رسوب د باریم سلفیت BaSO_4 جوړیږي.

نایتریتونه (NO_3): کوم وحت چې نایتریتونه د علیظ سلفوریک اسید سره یوځای کړل شي اوددوه ولانسه اوسپنی سلفیت هم ورسره زیات کړل شي په هغه صورت کې ډیر ورو په محلول کې حل کړی ددوه مایعودتماس په نقطه کې څرگندیږي چې بنفش رنگ هم اختیاروی NO_3 په NO ارجاع کیږي او یو کمپلکس د FeSO_4 جوړوی




COLORFUL CYCLE

فاسفیتونه (PO_4): کوم وحت چې فاسفیتونه د نیترومولبدیک معیار سره یوځای شي نو په هغه صورت کې زیر رسوب جوړوی اود رسوب رنگ د فاسفیتونو غلظت پورې اړه لري







کاربنیتونه (**Co₃**): کوم وخت چې کاربنیتونه د **HCl** سره یوځای شي دکاربن ډای اکساید غاز ازادیږي که دکاربن ډای اکساید غاز دباريوم هایدرواکساید څخه تیر کړل شي په هغه صورت کی دمحلول مکدر یاتاریک کیږي اوباریم کاربنیت رسوب کوي




دایونونوپيژندل:


بای کاربنیتونه (**Bicarbonats**):

کوم وخت چې بای کاربنیتونوته دومره تودوچه ورکړل شي ترڅو چې په جوش راشي نودکاربن ډای اوکساید غاز تولیدیږي چې دکاربنیتونوپيژندنه مثبت څرگندوي



سیانایدونه (**CN**): کوم وخت چې په سیانایدونو باندې **NaOH** او **FeSO₄** ورواچول شي اودحرارت ورکولووروسته د **HCL** په واسطه تیزابی شي اوڅوڅاڅکی **FeCl₃** هم ورزیات کړل شي آبی رسوب جوړیږي .





دکیتونوپيژندل :

ارسينک (As): **Bougoult** مصرف **H(H₂po₂)** دارجاع په واسطه پيژندل کيږي
پدی ډول چي په ارسنيک **As** لرونکي مرکب باندی مرف ورزيات کرل شی دقيقي
تودوحی وروسته یوزیر نصواری رنگ تولیديږي




همدارنگه ارسنيک د**AsH₃** په شکل هم څرگنديږي



عملیه داسی سرته رسيږي چي دارسنيک ارجاع د **H₂SO₄** او **Zn** په واسيټه په
مضر دالوتونکي **AsH₃** باندی بدليږي. کوم وحت چي دفلتر کاعذ چي دسيمابو په
کلوراید ککړ شوی وی او دتيوب حولی ته ونيول شی نصواری رنگ باندی بدليږي

سرب **Pb** اودرانه فلزات :

هغه معرف چي ددی فلزاتو په پيژندنه کی کارول کيږي هايډروجن سلفايد **H₂S** دی چي
داسټيک اسيد **CH₃COOH** په هغه محلول کی استعماليږي کوم چي **PH** یی 4 څلوروی




Lead Chromates

(زیررنگ)


اوسپنه Fe:

اوسپنه دپوتاسیوم فیروسیاناید و سره د HCl په محیط کی آبی رنگ تولیدوی .




زنک یاجست Zn:

کوم وحت چي دسودیم سلفاید Na_2S محلول سره یوځای کړل شی سپین رسوب جوړوی چي دنورودرنوفلزاتو سره فرق لری .



بسموت Bi:

کوم وحت چي بسموت په اسیدی محیط کی د KI سره یوځای کړل شی یونارنجی زیررنگه رسوب جوړوی اوپه اضافی معیار سره منحل شکل اختیاروی



(دزیرنارنجی رنگ)

سیماب Hg^{+2} او Hg^{+1} :

دسیمابودکیتونو لپاره دوه طریقې څخه استفاده کوو

۱: که چیری ۱۰ فصدہ محلول د **NaOH** سرہ یوخی کړل شی نوپه هعه صورت
Hg⁺² زیرسوب او **Hg⁺¹** توررسوب جوړوی





توررنگ





زیر

۲: کوم وحت چي دپوتاسیوم آیوداید **KI** ۱۰ فصدہ محلول سرہ یوخی کړل شی نو **Hg⁺¹**
 شین رنگ تولیدوی اووروسته آزاد شوی **Hg⁺¹** په توررنگ بدل شی او **Hg⁺²** سیماب
 سوررنگ تولیدوی



↓



Neslar reagent


نقره **Ag**:

کوم وحت چي دنقری محلول د **HCl** سره یوخی کړل شی نوسپین رسوب د **AgCl**
 جوړوی



مس (**Cu**):

مس دپوتاسیوم فیروسیاناید سره تیاره سور رسوب جوړوی



سورتیاره


کلسیم Ca :

کلسیم داکزالیک اسید اويا دامونیوم اکزالت سره داستیک اسید په محیط کی رسوب جوړوی



باریم Ba^{+2} :


باریم دسلفیتونوسره سپین رسوب جوړوی



مگنیزیم Mg^{+2} : مگنیزیم دمونوهایدرو فاسفیت سره د NH_4OH اوامونیوم


کلوراید NH_4Cl

په موجودیت کی په سپین کرسنل شکل سره رسوب کوی



دامونیاک مالکی NH_4 :

که چیری دامونیوم کلوراید محلول ته د NaOH القلی سره تودوچه ورکړل شی دامونیاک
عاز آزادیږی




سودیم Na^+ :

که چیری دسودیم مرکبونه وسوځول شی په زیر رنگ سره څرگندیږی

پوتاشيم K.

بي رنگه شعله په آبي بد لوی همدارنگه دسوديم استيت په شتون کی دتارتاريک اسيد سره مستقيماً رسوب جوړوی



دتعاملاتو تطبيق :

په اوبوکی منحل محصولات :په آبی محلول باندی مستقيماً تجزيه اجراکيري په اوبو کی عيري منحل اوپه تيزابوکی منحل محصولات : اوپدی صورت بايد مناسب تيزابونه دعملی داجر اکولو لپاره په نظرکی ونيول شی

د کيميا عمومي اصطلاحات او تجربی :

يوشمير اصطلاحات په طبي کيميا کی معمول دی نومجوريو چی هغه دڅيرنی لاندی ونيسو

۱. تحليلی تجربی: په هغه صورت کی چی شرایطی ذکر شوی نوی نوباید ذکر شوی تعاملات په ۲۰ فصده کی ترسره شی اوکم مقداروی

۲. هغه معيارونه (**Reagent**) چی دتخليل اوسنتيز لپاره کارول کيري بايد لرونکی دفارمکوپي اودرسمی کودکسونویوی

۳. په طبي کيمياکی دانهاليت اصطلاح په منحل او عيري منحل سره توضيع شوی دی چی په لاندی ډول سره دی

ډيرمنحل :ډيرمنحل مواد دوزن له محی **1g/ml** دی

په اسانی منحل :منحل په يوتر ۱۰ برحوکی **1g/10ml** دی

منحل :منحل په ۱۰۰ الی ۱۰۰۰ برحوکی **1g/100-1000ml**

عملاً غيرمنحل :زيات دلسوزروبرحو **1g > 10000**

غيری منحل هرکله چی يوگرام په يو ليتر کی حل شی

۴:دحامضيت اوقلويت اصطلاح چی دفارمسی په کيميا کی مراعات کيري

ډیر قوی تیزاب **PH<2**

قوی تیزاب **PH=2-3**

سپک تیزابی **PH=3-6**

خنثی **PH=7**

سپک قلو **PH=7, 5,8**

ډیره قوی قلو **PH=12, 13**

۵. رنگه کولو اصطلاح: دبی رنگه کولو اصطلاح معمولاً هغه وخت استعمالیږي چې درنگ شدت یی په لاندی محلولونوکی کم وی

زیر رنگ: آبی محلول د **3MgK2Cr2O7** او **5ml** سلفوریک اسید رقیق په **1000ml** کی

200Mg6H2OCO(NO3)2 نری

هایدروکلوریک اسید په **1000ml**

آبی رنگ: آبی محلول **500ml CuSO4.5H2O** او **5ml** نری سلفوریک اسید په **1000ml** کی

۶- شفافیت: هغه دی چې رسوب ونه لری اوشفاف محلول هغه محلولته ویل کیږي چې مکدریت (دتاریک والی) اضافه د **Suspension** څخه وی او **5** ملی گرام کاولین په **1000** ملی لیتره اوبوکی راڅرگندوی

۷- پاتی ماده: هغه ماده ده چې اندازه یی کم د **1/1000** څخه وی

۸- ضایع شوی ماده: هغه ماده ده چې دوچیدوروسته **100- 105°C**

صورت نیسی او **1/1000** حصه تفاوت په دوه دفعوکی ولری

۹- دناکی حد تعینول په فارمکوپي اوکورکس کی یادشوی دی

سوالونه :

۱. طبي کيميا تعريف کړی ؟

۳. دکلوراید ، سلفيت ، کلسيم ، اوسربوایونونه څرنگه پیژندل کیری ؟

۴-جست **Zn** په یودلاندی معیارونوسره پیژندل کیری ؟

الف. **Na₂S** ب **KI** ج **A.B** حجم دی د هیڅ یو

۵-درنگه کولواصطلاح څه شی دی واضح یی کړی ؟

۶-طبي کيميا له محی دشفافیت اصطلاح واضح کړی ؟

۷-**HCl** په دکاربنینوتحریک له لاندی مرکبونه ازادیږی

الف **SO₂** ب **CO₂** ج **NO₂** د ټول


لمري گروپ عناصر

هغه عناصر چې په دې گروپ کې شامل دي عبارت دي له لیتیم ، سودیم ، پوتاشیم ، ربیدیم ، سیزیم فرانسیم . چې د دغه عناصرو د جملې څخه سودیم او پوتاشیم مرکبونه د انسان په بدن کې ډیر اهمیت لري. خو د لیتیم ځنې مرکبونه هم طبي اهمیت لري.

لیتیم (**Li**) : دالقلي فلزاتو د جملې څخه دی چې د فعالو فلزاتو د جملې څخه شمیرل کیږي او په طبیعت کې په ازاد حالت سره نه پیدا کیږي مهم مرکبات یې چې په طبابت کې خاص رول لري عبارت دی له لیتیم کلوراید ، لیتیم کاربونیټ ، لیتیم سلفیت او نور .

لیتیم کار بونیت (**Li₂ CO₃**) :

لیتیم کار بونیت د لیتیم او کار برنیک اسید دتعامل څخه لاسته راځی .



خواص :

سپې کرسټلي شکل لري د پودر په شکل سره پیداکیږي ، سپک بي بویه د قلوي خوند لري په اوبو کې لږ حلېږي او د تودوخې په زیاتوالي سره یې انحلايت کمیږي او په الکولو کې نه حلېږي .

ددې لپاره چې دغه مرکب وپیژندل شي لمري یې په هایډروجن کلوراید کې حلوه او وروسته سودیم هایډروجن فاسفیت ور زیاتوو او تودوخه ور کوو نو وبه وینوچې سپین رسوب به جوړ شي .

چې ددغه سپین رسوب څخه لیتیم کاربونیټ پیژ ندل کیږي .

طبي استعمال :

ليٽيم کاربونيٽ د ليونتوب افسوردگي ناروغيو په درملنه کې او همدارنگه د دغه نوع ناروغيو به وقايع هم ترې کار اخستل کيږي .

د ليٽيم اکسايډونه د بېلا بېلو عقلي او رواني ناروغيو په درملنه کې کارول کيږي .


سوديم (Na)

سوديم هم ډير مهم عنصر دي چې دانسان په بدن کې د هغې مر کبونه ډير اهميت لري لکه سوديم کلورايد ، سوديم کاربونيټ ، سوديم سلفيټ ، سوديم فاسفيټ ، سوديم ايو دايد اونور .

سوديم کلورايد (NaCl)

سوديم کلورايد يو ډير مهم مرکب دي چې په طبيعت کې په زياته پيمانه سره پيدا کيږي معمولا په تجارتي سيستم کې سوديم کلورايد د بحر او کانونو څخه لاسته راوړي .

طبي سوديم کلورايد د سوديم کاربونيټ او هايډرو کلوريک اسيد د تعامل څخه لاسته راځي يعني :



فزيکي خواص :

ترش خوند لري په اوبو کې حلېږي او سپين جامد کرسټلي شکل لري .

طبي استعمال :

د سوديم کلورايد محلولونه له هغه اساسي تر کيب څخه عبارت دي چې د پلازماتيک مايعاتو د تعويض کونکي په توگه ترې کار اخستل کيږي . سوديم کلورايد د وينې په ترکيب او حجروي مايعاتو کې شامل دي. په وينه کې د سوديم کلورايد غلظت **0,5** فيصده دی او اساسي رول يې د وينې د فشار توزن يا نارمل ساتل دي .

د ايزو تانيک محلول په اور گانيزم کې د سوديم کلورايد د کموالي په صورت کې (۹) فيصده د هغو د زرقي لارې په وړيد او تريست لاندي اخستل کيږي اود سوديم کلورايد درې ډوله درملنه رسمي پېژندل شوي ده .

د سوديم کلورايد (۹) فيصده محلول د يوپيرنگه او شفافي مايع څخه عبارت دی چې مالگين خوند لري او د سوديم کلورايډ **5,3** فيصده او محلول د **10** ډيبيرون له طرطه د مکروبي زخمونو په ونځلو کې

کارول کيږي په همدې ترتيب د سوديم کلوراید محلول څخه د ستوني درد د مينځه وړلو لپاره هم کار اخستل کيږي .

پوتاشيم کلوراید (KCl)

پوتاشيم يو داخل الحجروي مهم ايون دی اودغه دسوديم په شان يو خارج الحجروي ايون هم دی . دغه دواړه ايونونه د حجروي ايزو تونیک په تنظيم کې مهم رول لري .

د پوتاشيم کلوراید څخه د زړه د ریتمونو د ګډوډیدو په صورت کې هم کار اخستل کيږي ، په ځانګړي ډول سره د زړه دا ندوکسیکیشن هیدروژیدونو اودغه راز په وینه کې د پوتاشيم ايون د کموالي په صورت کې چې دوامداره درملنه د یوریتیک رامنځ ته کوي ، ګټه ترې اخستل کيږي د (۱۰) فیصد ه محلول اوتابلېتو په شکل د خولي دلاري ناروغ ته ورکول کيږي .

تشخيص :

د پوتاشيم کلو رايد د پیژاندني معرف د پوتاشيم اسیتات په شتون کې د تار تاریک اسید د زیاتیدو په صورت کې د پوتاشيم اسیتات سپین رسوب جوړوي چې د هغې له مخې پیژندل کيږي .

د سوديم او پوتاشيم برومایدونه

د هغو رسمي درملونه عبارت دي له :

1: potassium bromid

2: Tab potassiumbromid 0,5

د اعصابو ارامونکی تاثیرات لري د مخلوط په شکل او د تابلېتو په شکل نارو غانو ته ورکول کيږي .

د سوديم او پوتاشيم ایوداید

د هایپر تائیریوز (**Hyper thyroses**) یا جاغور په درملنه کې ترې کار اخستل کيږي . کوم وخت چې په خوړو او اوبو کې په پوره اندازه وجود ونلري په ځانګړي ډول سره په ځینو غرنیو سیمو کې د هغې ځای خلق د جاغور په د ناروغي مبتلا کيږي .

ایو دین د داخل له لارې د محلول یا مخلوط په شکل سره نارو غانو ته ورکول کيږي .

فزیکي خواص

کلو رايدونه ، برومایدونه او ایودایدونه سپین جامد کرسلي شکل لري اود پودر په شکل سره پیدا کيږي خو یوازي ایوداید سپک زیر رنگ لري چې د کاربن داي اکساید او لنده بل سره په تماس کې شي ایودین ورڅه ازاډیږي .

د ټول په اوبو کې حلېږي خو په الکولو کې حلېدل سره فرق لري په دې ډول چې پوتاشيم کلورايډ په اوبو کې نه حلېږي ، سوديم برومايد او سوديم کلورايډ په الکولو کې لږ حلېږي اړ ايوډايډونه په الکولو کې منحل دي.

لاسته راوړلو طريقه :

سوديم کلورايډ د بحر او کانونو څخه په زياته پيمانه لاسته راځي او کلورايډونه ، ايډايډونه په مختلفو طريقو سره لاسته راوړي لکه :



وروسته په اوسپنه باندې د د سوديم کاربنات محلول ورزياتوي او په نتيجه کې برومايد او ايوډايډونه لاسته راځي په لوړو دوزونو سره د برومايدونو دوامداره کارول تسمات منځ ته راوړي لکه (ريزش، ټوخي ، د اعصابو کمزور تيا) د بروم د تسم لپاره معمولاً سوديم کلورايډ ورکول کيږي چې په زياته اندازه سره ۱۰-۲۰ گرامه پورې په ۲۴ ساعتونو کې د ۲-۳ ليتره پورې ورکول کيږي .

د دوهم گروپ عناصر (2A group Elements)

هغه عناصر چې په دې گروپ کې شامل دي عبارت دي له : بريليم ، مگنيزيوم ، کلسيم ، ستانشيم ، باريم او راديوم .

دا عناصر د ځمکې د القلي فلزاتو په نوم سره ياديږي چې د ځمکې په قشر کې دهغوي رکبات ډير پيدا کيږي د دې عناصرو د جملې څخه مگنيزيم او کلسيم طبي اهميت لري چې مرکبونه يې د انسان په بدن کې زيات ضتون لري .

مگنيزيم (Mg)

مگنيزيم د دوهم اصلي گروپ عناصرو د جملې څخه يو عنصر دی چې اتومي نمبر يې ۱۲ ، اتومي وزن يې ۲۴ او ولانس يې ۲ دی په طبيعت کې په مرکب شکل سره پيدا کيږي لکه مگنيزيوم اکسايډ ، مگنيزيم کاربونات ، مگنيزيوم سلفيټ ، مگنيزيوم فاسفيټ ، مگنيزيوم نايټريت اونور.

اکسايډ او مگنيزيوم هايډرو اکسايډ ($\text{MgO}, \text{Mg}(\text{OH})_2$)

مگنيزيوم اکسايډ د مگنيزيوم د سوزيدو څخه لاسته راځي اوکوم وخت چې مگنيزيوم اکسايډ ته په اوبو کې جوش ورکړل شي مگنيزيوم هادروکسايډ حاصلېږي .

خواص

سپين رنگه پود ر دي په اوبو کې لږ حلېږي خو په رقيق تيزابونو کې زيات حلېږي .

د رقيق نايټريک اسيد په اسطه پيژندل کيږي .

طبي استعمال

مگنيزيم اكسايد د ۵-۱۰ مليگرام پوري د انتي اسيد او رطوبت جذ بونكي مادي په حيث او مگنيزيوم هايډرو اكسايد د ارسنيك اكسايد تسمماتو ضد مادي په حيث استعماليري .

مگنيزيوم كار بونات ($MgCO_3$)

مگنيزيوم كار بونيت يو قلوي مالګه ده چې ۴۰-۴۵ فيصده پوري مگنيزيوم اكسايد لري اود سوديم باي كار بونيت او مگنيزيوم كلورايد د تعامل څخه لاسته راځي .



خواص

مگنيزيوم كار بونات په ۷۰۰ درجو د سانتیګراد کې مگنيزيوم اكسايد بد ليري .



مگنيزيوم كار بونيت يو انتي اسيد دی او خفيف مسهل (Laxative) په حيث ، دغذا زياتونكي او د مخ او غاښونوپه کريم کې شتون لري .

دغه مرکب په معده کې کاربن داي اكسايد ازادوي .

مگنيزيوم اكسايد (MgO)

دغه مرکب ۹۸ فيصده مگنيزيوم اكسايد لري ، سپين رنگه پودر دي په اوبو کې لږ حليري او القلي خواص لري .

د مگنيزيوم اكسايد طبي استعمال

مگنيزيوم اكسايد يو انتي اسيد دی اود معدې داسيدو د ورکولو لپاره هم استعماليري بر سيره پر دې سره د خوراكي مواد و په زيات خوراک کې هم استعماليري .

مگنيزيوم كلورايد ($MgCl_2$)

مگنيزيوم كلورايد يو خنثا مالګه ده چې يو اتوم مگنيزيوم او دوه اتومه کلورين لري ، بيرنگه جامد کرسټلي شکل لري او تريخ خوند لري په اوبو کې زيات حليري مگر په الکولو کې په مناسبه اندازه سره حليري .

که چيرې هايډرو کلوريک اسيد په مگنيزيوم کاربو نات باندې وا چول شي مگنيزيوم كلورايد لاسته راځي .



طبي استعمال

د بیرون له طرفه د زخمونو په درملنه کې کارول کیږي .

مگنیزیم اسیتات ($\text{Mg}(\text{CH}_3\text{COO})_2$)

سپین رنگه پودر دی په اوبو، الکولو او ایتر کې غیر منحل دي مگر په پیریدین کې حلېږي .
معمولا دا مرکب په طبابت کې د رطوبت جذبونکي مادې په حیث استعمالیږي .

کلسیم (Ca)

کلسیم د ځمکنۍ القلي فلزاتو د جملې څخه دی چې په عضویت کې ډیر مهم فزیا لوجیکي رول لري په مختلفو انسانو خصوصاً په هډکو کې زیات شتون لري . اټومي نمبر یې (۲۰) ، اټومي وزن یې (۴۰) او ولانس یې (۲) دی .


کلسیم په طبیعت کې په ازاد حالت سره نه پیدا کیږي بلکې په مرکب شکل سره پیدا کیږي لکه کلسیم اکساید (CaO) ، کلسیم هایډرواکساید ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) ، کلسیم سلفیت

(CaSO_4) ، کلسیم فاسفیت $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ ، کلسیم کلوراید اونور .

کلسیم د هډکو په ترکیب کې شتون لري چې د هغې د کموالي په صورت کې د هډکو دردونه احساس کیږي او په ماشومانو کې د هډکو د کور والي سبب کیږي .

کلسیم کاربونیټ (CaCO_3)

کلسیم کاربونیټ سپی رنگه پودر دی چې د ۹۵-۱۰۰ پورې خالص کلسیم کاربونیټ لري . که چېرې د کاربن دای اکساید غاز د کلسیم هایډرواکساید څخه تیر شي کلسیم کاربونیټ حاصلیږي .



طبي استعمال

کلسیم کاربونیټ د انتي اسید په ډول کارول کیږي همدارنګه په هډکو د کموالي په صورت کې هم کلسیم کاربونیټ استعمالیږي اود انتي بیټیک په شکل کارول کیږي.

باریم (Ba)

باریم هم یو ځمکنۍ القلي فلز دی چې پا طبیعت کې د مرکب په شکل سره پیدا کیږي

اټومي نمبر یې ۵۶ ، اټومي وزن یې ۱۳۷ او ولانس یې (۲) دی .

باريم سلفيت (BaSO₄)

باريوم سلفيت دد باريم ډير مهم مركب ديچي د باريوم او سلفوريك اسيد د تعامل څخه په اساني سره لاسته راځي. باريوم سلفيت يو سپين بېرنگه او بي خونده پودر د پيه اوبو كې غير منحل او الكولو او اسيترون كې حليري.

طبي استعمال

معمولا دكانترست موادو په شكل په راډيو گرافي كې كارول كيږي د معدې په داسيدي جوسونو كې منحل دي نو له دې كبله د سيستماتيک اغيز باعث نه كيږي.

زنك يا جست (Zn)


جست دانتقالي عناصرو د جملې څخه يو عنصر دي چې طبي اهميت لري اتومي نمبر يې (۳۰)، اتومي وزن يې ۶۵ او ولانس يې ۲ دی دكتالست په حيث او په كيمياوي تعاملاتو كمي د لمري مادي په حيث استعماليري.

دد جستو مهم مركبونه عبارت دي له د جستو اكسايد (ZnO)، د جستو كاربونيټ

(ZnCO₃)، د جستو سلفيت (ZnSO₄) او نور دي.

زنك اكسايد (ZnO)

د جستو اكسايد په زياته پيمانه سره د فلزي جستو د سوزيدو څخه د هوا په شتون كې لاسته راځي.



د جستو اكسايد يو سپين رنګه پودر دی د تودوخي په اثر تجزيه كيږي په اوبو كې غير منحل دي چې د تودوخي په اثر زير رنګ اختياروي او ورسته بيرته خپل اولني شكل ځانه نيسي.


د جستواكسايد د پيژندني لپاره هغه سوزوي اووروسته يو اندازه سوډيم هايډرو اكسايد ور باندې علاوه كوي چې په شنه رنګه رسوب سره پيژندل كيږي.

طبي استعمال

د جستو اكسايد عصبي ناروغيو په درملنه كې، د تشنج دمينځه وړلو لپاره د (۵۰) مليگرام څخه گار اخستل كيږي، مهم استعمال يې د پوستكي ناروغيو په درملنه كې دی برسيره پر دې سره د سترگو ناروغيو په درملنه كې د ملهونوپه شكل سره كارول كيږي او همدارنګه د ماشومانو په پودرونو كې هم ورڅخه كار اخستل كيږي.

د جستو سلفيت (ZnSO₄)

د جستو سلفيت د د فلزي جستو او سلفوريك اسيد د تعامل څخه په اساني سره لاسته راځي.



سپين کرسټلي شکل لري او دی شفاف معلوميزي په اوبو منحل مگر پا الکولو کې نه حليري
طبي استعمال

د ضد عفوني يا مکروب وژونکي مادې په حيث استعماليري ، يو (۱) فيصده محلول يې د سترگو نا رو
غيو په درملنه او د سترگو د التهابونو په منځه وړلو کې کارول کيږي .

د دوراني جدول 3A) گروپ عناصر

هغه عناصر چې پدې گروپ کې شامل دي عبارت دي له : بورون (B) ، المونيوم (Al) ،

گاليم (Ga) څيرنې لاندې نيسو . انديم (In) او تاليوم (Ti) . چې ددې عناصرو د جملې څخه
بورون او المونيوم طبي اهميت لري نو پدې اساس د دغه عناصرو ځني مهم مرکبات تر څيرنې لاندې
نيسو .

بورون (B)

بورون د دريم اصلي گروپ عناصرو د جملې څخه دی اتومي نمبر يې ۵ او اتومي وزن يې ۱۰ ولانس
يې ۳ دي او غير فلزي خواص يې زيات دي .

موهم مرکبونه يې بور تراي اکسايډ او بوریک اسيد او مالګي د بوریک اسيد دي .

بور تراي اکسايډ (B2O3)

بور تراي اکسايډ غير فلزي اکسايډ دی چې د بورون او اکسيجن د تعامل څخه لاته راځي که دغه
اکسايډ په اوبو کې حل شي بوریک اسيد تيزاب حاصليري . د بوریک اسيد مالګي
بور تراي اکسايډ د اوبو سره لاندې اسيدونه جوړوي .



بوریک اسيد يوه جامده ماده ده چې بيرنگه ، بي بويه او مر واريده ورته شکلونوسره بيدا کيږي .د
پاشيدونکو پودرونو او د کريمونو په جوړول کې خاص رول لري اوکه چيري ۱۰۰ د سانتيگراد تودوخه
ور کړل شي يو ماليکول اوبه د لاسه ورکوي .

بوریک اسيد يو ضعيف تيزاب دی چې په کمه فيصدي سره د هايډروجن ايون په محيط کې توليد وي .

بوريک اسيد په اوبو و الکولو ، او گلسرين کې حليري .

د بوريک اسيد طبي استعمال

د بوريک اسيد څخه د يو با کتريو ستاتيک او ضد عفوني مادي په کار اخستل کيږي او په موضوعي صورت سره د مالش او ستوني د رد اود خولي د مخاط د التهاب لپاره د غر غر ه کونکي په توکه کارول کيږي . د مسکن اړ قلري خاصيت د لرلو له کبله په عصبي عوارضو کې ، د پټ اشتهايي لپاره اود د معدې د ا سیدونو د پورته کولو لپاره هم استعمالیږي .

المونيوم (Al)

المونيوم هم د د ريم اصلي گروپ عناصرو د جملي څخه دی چې ازاد او مرکب ډول سره پيدا کيږي اتومي نمبر يي ۱۳ ، اتومي وزن يي ۲۷ او ولانس يي ۳ دی په صنعت کې زيات کارول کيږي او د هغې پودر په التهاب لرونکو زخمو با ندي پا شلذ کيږي .

د المونيوم مهم مرکبونه عبارت دي له المونيوم اکسايډ (Al_2O_3) ، المونيوم هايډروکساي

[$\text{Al}(\text{OH})_3$] ، المونيوم سلفيټ [$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$] او المونيوم فاسفيټ .

المونيوم هايډرواکسايډ ($\text{Al}(\text{OH})_3$)

المونيوم هايډرواکسايډ يوه ضعيغه القلي ده چې د المونيوم اکسايډ د حلید و څخه په اوبو کې لاسته راځي .



المونيوم هايډرواکسايډ يوه ډيره تاموثره انتي اسيد دي چې د معدې د در ملني په دوا گانو کې زکارول کيږي .

د المونيوم بل طبي اهميت لرونکي مرکب د المونيوم سلفيټ او پوتاشيم سلفيټ مخلوط دی چې د زمچ په نوم سره هم ياديږي د دې مرکب څخه د بيرون له لاري قابضمادي په حيث اود پودر په شکل د خولي د ا نتيستېک کولو لپاره کار اخستل کيږي .

د څلورم اصلي گروپ (4A) عناصر

پدې گروپ کې کاربن (C) ، سليکان (Si) ، جرمانيم (Ge) ، قلعي (Sn) او سرب (Pb)

شا مل دي چې پدې عناصرو کې کاربن غير فلز ، سليکان او جر مانيم شبه فلزات او قلعي ، سرب فلزات دي . ټول دغه عناصر په خپل اخيري سويه کې د انر جي څلور الکترونونه لري د دې گروپ عناصرو خواص سره فرق لري .

کاربن (C)

کاربن د څلورم اصلي گروپ یو عنصر دی چې غیر فلز دی او اساس د ټولو عضوي مرکباتو جوړوي او په عضوي مرکباتو کې کاربن څلور ولانسه دی چې څلور اشتراکي را بڼې جوړوي. هغه کاربن چې طبي اهمیت لري او په درملنه کې کارول کېږي د کاربنیټو په شکل، کاربونیکی انهایدرا ید گاز، او سیانیدونه دي. طبي کاربن په دوه ډوله سره دی یعنې حیواني کاربن او نباتي کاربن، حیواني دذغالو په واسطه د هډکو څخه په ۸۰۰ درجو د سانتیگراد کې لاسته راځي. حیواني کاربن تور رنګ لري په اوبو کې غیر منحل دی رطوبت جذبونکي خواص لري

طبي استعمال

د رنګ وړونکي او رطوبت جز بونکي مادې په حیث ور څخه کار اخستل کېږي.

نباتي کاربن:

په طبابت کې دوه نوع نباتي کاربن کارول کېږي یو نباتي کاربن او رسمي فعال کاربن فعال کاربن جاذب الرطوبه خاصیت لري په دې اساس په مسمومیتونو کې ور څخه کار اخستل کېږي، سره لدې چې د فلزاتو ذرات د خوب راوړونکي اورام بېنونکي خاصیت هم لري. عادي کاربن د نباتاتو د ټوټو څخه لاسته راوړي مګر فعال کاربن تور پودر دی په اوبو کې غیر منحل دی خوند او بوی نلري او جاذب الرطوبه خواص لري.

طبي استعمال

د گازونو د جذبونکي په توګه استعمالیږي برسیره پردې سره د کلمو دباد پد رملنه، داسهالاتو ضد مادې په حیث اود تسمماتو ضد مادې په حیث استعمالیږي.

کاربونیکی اسید (CO₂)

کاربونیکی اسید چې د کاربن ټیزابو په نوم سره هم یادیږي د کاربنیټو او عضوي ټیزابو اویا غیر عضوي ټیزابو د یو ځای کېدو څخه لاسته راځي. د مثال په توګه:



کاربن داي اکساید یو بیرنګه غاز دی بوی نلري په اوبو کې حلېږي اود کاربن ټیزاب جوړوي. که کاربن داي اکساید د فشار لاندې راوړل شي په مایع بدلیږي.

طبي استعمال

د کاربن داي اکساید څخه غاز په طبابت کې د موضوعي انستیتیک د کانګو ضد مادې په حیث ور څخه استفاده کېږي. برسیره پر دې سره کابن داي اکساید په بدن د انسان کې هم خاص رول لري په دې ډول چې د بدن د اوبو سره کاربونیکی اسید جوړوي چې کاربونیکی اسید دهضم په عملیه کې ښه رول لوبوي.

کاربن اساس د ټولو عضوي مرکبونو جوړوي چې اکثره عضوي مرکبونه طبي رول او اهمیت لري لکه هایډرو کار بنونه ، الکول ، گلسرول ، استرونه ، الډیهایدونه ، عضوي تیزابونه ، امینو اسیدونه ، قندونه ، پروتین ، شحمیات اونور .

سلیکان (Si)

سلیکان هم د څلورم اصلي گروپ عنصر دی چې شبه فلزي خاصیت لري اتومي نمبر يې ۱۴، اتومي وزن يې ۲۸ او ولانس يې ۴ دی. د ځمکې پر مخ تر ټولو زیات موندل کېږي لکه کوارتز (SiO_2) د ریښه په شکل د ځمکې پر مخ ډیر پیدا کېږي دسلیکان هغه مر کبونه چې طبي اهمیت لري په لاندې ترتیب سره یې تر څیړنې لاندې نیسو.

مگنیزوم ترای سلیکیت ($\text{Mg}_2\text{Si}_3\text{O}_8$)

مگنیزیم ترای سلیکیت په جامد کرسټلي شکل سره پیدا کيږي سپین رنګه پود ر ډيپوي او خوند نلري په اوبو او الکولو کې نه حلېږي د معدني تيزا بونو په واسطه په اسانې سره تخريب کيږي . په معده کې د هايډرو کلورېک اسيد سره جلا تيني ترای سلیسیک جوړوي .

طبی استعمال

مگنیزیم ترای سلیکیت یو انټی اسید دی چې په معده کې د اضافي هایډرو کلوریک اسید د خنثا کولو لپاره ورڅخه کټه اخستل کیږي ، د معدې او اثناعشر د قرحاتو (زخمونو) څخه درد ډډه لري کوي او په ممکنه ډول سره پیپسین جذبوي .

هر کله چې مگنيزيوم تر اړي سليکيت د خولي د لاري واخستل شي د خنثا کولو په محال مگنيزيوم کلورايډ جوړوي او د اوبه لرونکي سليکا د حليد و سبب کيږي وروسته اوبه لرونکی جل کلمو ته ځي اود جذب په شان عمل کوي اود يو انتي اسيد په حيث عمل تر سره کوي

تالک (Talc)

تالک داسي یو مرکب دي چې په طبعي ډول سره پیدا کیږي او په خپل تر کیب کې ۶۴ فیصده مگنیزیم اکساید لري او ۳۶ فیصده سلیکان دای اکساید موممممهم پکی شتون لري .

کیمیایو فورمول یی ($3\text{MgSiO}_3 \cdot \text{H}_2\text{SiO}_3$) دی اود تالک په تر کیب د المونیوم اکسایدونه هم مو جود دی .

خواص

میده کرسټلي سپین پودر دی د لاس د فشار په واسطه غوړ او بنویده خاصیت غوره کوي دا مرکب په اوبو او عضوی محلولونو کی غیر منحل دی نو ځکه په اسانۍ سره نه پیژندل کیږی

نو د دې لپاره چې حل شي سوديم کاربنات ور سره يو ځاي کوو او وروسته يو اندازه تيزاب ور باندې زياتوه چې په هغه صورت کې سليکان داي اکسايډ رسوب کوي او په محلول کې د مگنيزيم مالګه پاتې کيږي

کاولين (Al₂O₃.2SiO₂)


دالمونيم يو بل مرکب دی چې په خپل ترکيب کې المونيم اکسايډ او سليکان داي اکسايډ لري . رطبت جذبونکي مادي په حيث ، د اسهال ضد مهدي په حيث اود بيرون له طرفه د فاشونکي پودر په حيث ور څخه کار اخستل کيږي .

سرب (Pb)


سرب د څلورم اصلي گروپ يو بل مهم عنصر دي چې په طبابت کې ور څخه کار اخستل کيږي او مرکبات يې ډير مهم رول لري .

د سربو اکسايډ (PbO)

د سربو اکسايډ يو زير رنگه پودر دي چې د سربو د اکسيډيشن څخه لاسته راځي .



د سربو سلفايډو د اکسيډيشن څخه هم د سربو اکسايډ لاسته راځي .



برسيره پر دې سره د سربو د کار بنيتو د حرارتي تجزيي څخه هم د سربو اکسايډ لاسته راځي .

د سربو اکسايډ امفو تريک خواص لري يعنې تيزابي او القلي خاصيت د خپل ځان څخه څر گند وي .

د سربو اکسايډ طبي استعمال

د سربو د اکسايډ و څخه د طبي پلستر په جوړولو کې کار اخستل کيږي چې د دغه پلستر څخه د پوستکي د التهابي مکروبي ناروغيو په درملنه کې کار اخستل کيږي . او د سربو اکسايډ د محلول څخه د اکزيما د سو ځولو لپاره کار اخستل کيږي .

د پنځم اصلي (5A) گروپ عناصر

هغه عناصر چې په دې گروپ کې شامل دي عبارت دي له نایټروجن (N) ، فاسفورس (P) ، آرسنیک (AS) ، انټیموني (Sb) او بسموت (Bi) .

چې د دې عناصرو د جملې څخه نایټروجن او فاسفورس د یربښه طبي اهمیت لري .

نایټروجن (N)

نایټروجن د پنځم اصلي گروپ عناصرو د جملې څخه یو عنصر دی چې په خالص او مرکب ډول سره پیدا کیږي ، خالص نایټروجن ۲۸ فیصده په هوا کې شتون لري مرکبات یې عموماً په دوه ډوله دي یعنې غیر عضوي او عضوي مرکبونه .

د نایټروجن غیر عضوي مرکبونه لکه اکسایډونه ، نایټریتونه ، سیانایډونه ، تیو سیانایډونه ، امایډونه ، امونیا ، هایډرازین اود هایډرازین مشتقات .

د نایټروجن عضوي مرکبونه لکه : امینونه ، امایډونه ، امینواسیډونه ، نایټرو الکانونه و الکایل سیانایډونه او نور .

امونیا (NH₃)

امونیا یو بیرنگه غاز دی تیز او سوځیدونکي بوی لري په اوبو کې حلېږي اود ابي محلول په شکل سره کارول کیږي .



عادي مونیای د امونیا د حلیدو څخه په اوبو لاسته راځي چې ۲۰ فیصده غاز د امونیا لري اود بیرون له لارې کارول کیږي .

طبي استعمال

د امونیا انشقاق د تنفسي جهاز د تنبه کولو سبب کیږي او برعکس د د ماغ تنفسي مرکز اود زړه گرند یتوب تنبه کیږي اود خولې د لارې د خوله (عرق) کونکي مادې په حیث کارول کیږي .

امونیوم کلوراید (NH₄ Cl)

امونیوم کلوراید داسي مرکب دی چې دامونیا او هایډرو کلوریک اسید د یو ځای کیدو څخه لاسته راځي .



برسیره پر دې سره امونیوم کلوراید د د داي امونیوم سلفیټ او سودیم کلوراید د تعامل څخه هم لاسته راځي .



خواص

امونیوم کلوراید سپین جامد کرسټلي شکل لري بوي نلري که تو دوخه ور کړل شي د ویلي کیدو پرته الوزي ، په اوبو او گلايکولو کې په اسانې سره حلېږي . د هغې ۵ فیصده محلول **PH = 4,6 – 6** دی . امونیا په عضویت کې د کورین سره تعامل کوي اود کاربن داي اکساید د تولید سبب کیږي .

طبي استعمال

امونیوم کلوراید د وخیم میتا بولیزم د درملنې لپاره کارول کیږي ، د ادرار د اسیدي **PH** د ساتنې لپاره اود بولي لاري د ځنو ناروغانو د درملنې لپاره هم کارول کیږي ، دامو نیم اکسایدونه دمعدې په غشا باندې تخریش کونکي اغیزي لري او د زړه د بد والي سبب کیږی .

نایترس اکساید (N₂O)

نایټروجن مونو اکساید د کوتي په تو دوخه کې د غاز په حالت سره وي اود مایع په شکل سره په سلنډرونو کې د فشار لاندې ساتل کیږي .

د امونیوم نایټریت د حرارتي تجزیه څخه لاسته راځي .




نایټرس اسید یو بیبرنگه بی بویه اونه تخریش کونکي او نه کارونکي غاز دی په اوبه ، الکول او ایټرونو کې منحل دی که د ۵۰۰ درجو د سانتیگراد څخه لوړه تودوخه ور کړل شي په نایټروجن او اکسیجن باندې تجزیه کیږي .

طبي استعمال

نايترس اکسايډ د خنډيدونکي غاز په نوم سره هم يادېږي په خالص ډول سره په لنډ مهاله انستيزي کې او په مخلوط ډول سره په اوږد مهاله انستيزي کې کارول کېږي ګړندي اغيزي لري او ناروغ زر د بيهو شي څخه باسي .

سوديم نايترائيت (NaNO_2)

دغه مرکب د وچو شوو موادو د ريفرينس څخه توليد يږي ، بيرنگه زير ته مايل کرسټلونه جوړوي بې بويه او مالګين خوند لري ، په اوبو کې حلېږي او پا الکولو کې په سختي سره حلېږي . اوبلن محلول يې قلوي خاصيت لري اود سلفوريک اسيد په واسطه تجزيه کېږي او سوديم نايترائيت يوه اړ جاع کونکي ماده ده .



د بلې خوا سوديم نايترائيت د تحمض کونکي په حيث هم کار کوي .

طبي استعمال

د سوديم نايترائيت ايو نونه فار مو لوژيک فعاليتونه لري د زړه د کرو نار ګ په پراخوالي کې خاض اهميت لري نو په دې اساس دغه مرکب د سيني د ناروغيو په در ملنه کې ډير ښه رول لري .

عضوي نايترېتونه لکه ايتايل نايترېت و امايل نايترېت او ګلسرايل نايترېت د بدن د فشار په ټيټوالي کې ښه رول هم لري . سوديم نايترائيت د هيموګلوبين سره تعامل کوي اود سيانايډونو دتسم ضد مادي په حيث استعمالېږي اود انتي اکسيدانت ضد مادي په حيث هم کارول کېږي .

فاسفورس او دهغي مشتقات

فاسفورس د پنځم اصلي گروپ عناصرو د جملې څخه يو عنصر دی چې طبي اهميت لري او مرکبات يې د انسان په بدن کې خاص اهميت لري . فاسفورس په درې شکلونو سره پېداکېږي يعنې سپين ، سور او تور فاسفورس ، سپين فاسفورس د موم په شان وي او ډير مهم فزيالوژيکي اهميت لري .

فاسفورس د تودوخې په اثر د يوه حالت څخه وبل حالت ته بدلېږي ، معمولا سپی فاسفورس د اعصابو د مقوي مادي په نوم پېژندل شوي دی اود فاسفورس ځني مر کبونه په لاندي ډول سره تر څزرني لاندي نيسو .

سوديم هايپو فاسفايت (NaH_2PO_2)

دا مرکب د سوديم کاربنات او او کلسيم هايپو فاسفايت د تعامل څخه لاسته راځي او که چيرې فاسفورس د کلسيم هايډرو اکسايډ سره يوځاي کړل شي کلسيم هايپو فاسفايت حاصلېږي .



د فاسفورس د مهمو مرکباتو څخه فاسفوریک اسید دی چې د فاسفریک اسید مالګې د انسان په بدن کې بڼه رول لري چې په درې ډولونو سره فاسفوریک اسید پیدا کېږي یعنې :

Meta phosphoric acid HPO_3

Pyro phosphoric acid $\text{H}_2\text{P}_2\text{O}_3$

Ortho phosphoric acid H_3PO_4

د فاسفوریک اسید ۵۰ فیصده محلول ډیر اهمیت لري او په طبابت کې ورڅخه د مالګو په شکل زیات کار اخستل کېږي. او د فاسفوریک اسید مالګې په اوبو ، الکولو او تیزابونو کې حلېږي. چې ځنې مالګې یې په لاندې ډول سره دي .

طبي استعمال

د فاسفوریک اسید مرکبات د مرکزي اعصابو د تقویه کونکي په حیث ډیر بڼه استعمال لري او د نورو مقوي درملونو سره ورکول کېږي او ترای کلسیک مالګې یې د اسهالاتو ضد او د انتې اسید په ډول سره کارول کېږي .

بسموت (Bi)

بسموت هم د پنځم اصلي عناصرو د جملې څخه دی په ازاد شکل سره نه پیدا کېږي مګر په مرکباتو کې په شکل سره پیدا کېږي لکه بسموت اکساید ، بسموت سلفایډ او نور .

بسموت نایتریت ($\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$)

بسموت نایتریت د دوا گانو په جوړولو کې خاص رول لري دغه مرکب د بسموت او نایتریک اسید د تعامل څخه لاسته راځي .



بسموت نایتریت جامد کرسټلي شکل لري او د پودر په شکل سره پیدا کېږي په اوبو کې نه حلېږي او په معدني تیزابونو کې حلېږي که چېرې لتوس کاغذ په کې غوټه کړل شي سور رنګ اختیاري .

طبي استعمال

دغه مرکب د معدې په محاطي غشا باندې د یو ضعیف ساتونکي اغیزه لري او د درملونو سره یوځای تطبیق کېږي او انټی سپټیک خواص هم لري ، د اسهال یا پیچش ضد انټی سپټیک په حیث هم استعمالېږي د بیرون له لارې د پودر ، ملهم او محلول په شکل سره هم د زخمونو په ونځلو لپاره استعمالېږي .

د دوراني جدول شپږم (6A) گروپ عناصر



هغه عناصر چې په دې گروپ کې شامل دي عبارت دي له اکسیجن (O)، سلفر (S)، سلینیم (Se)، تلیریم (Te) او پلو نیوم (Po). د دغه عناصرو د جملې څخه اکسیجن او سلفر طبي اهمیت لري او مرکبات یې د انسان په وجود کې ډیر مهم رول لري بر سیره پر دې سره د درملونو په جوړولو کې هم ډیر استعمال لری .

اکسیجن (O)

اکسیجن د شپږم اصلي گروپ عناصرو د جملې څخه ډیر مهم عنصر دي هېڅ یو ژوندي موجود غیر د اکسیجن څخه ژوند نشي تر سره کولی ، اکسیجن په ازاد او مرکب شکل سره پیدا کیږي چې په خالص ډول سره ۲۱ فیصده په هوا کې شتون لري اود مایع هوا د تدریجي تقطیر څخه لاسته را ځي .

د اکسیجن مرکبات ډیر زیات دي لکه اکسایدونه (فلزي اکسایدونه ، غیر فلزي اکسایدونه ، پر اکسایدونه او امفو تریک اکسایدونه) تیزابونه ، او مالګي .

الف: فلزي اکسایدونه هغه دي د فلز او اکسیجن د تعامل څخه لاسته راځي اود القلي انهایدرايد پهنوم سره هم یادیږي لکه سودیم اکساید ، کلسیم اکساید ، مگنیزیم اکساید اونور . هر کله چې فلزي اکسایدونه په اوبو کې حل شي القلي جوړوي مثال:



ب: غیر فلزي اکسایدونه . هغه اکسایدونه دي چې دیو غیر فلز او اکسیجن د تعامل څخه حاصلیږي او هر کله چې غیر فلزي اکسایدونه په اوبو کې حل شي تیزابونه لاسته راوړي مثال :



ج: پر اکسایدونه . هغه مرکبات دي چې په هغې کې اکسجن منفي یو ولانس ولري لکه هایډروجن پر اکساید ، سودیم پر اکساید ، کلسیم پر اکساید ، مگنیزیم پر اکساید او نور .


هایډروجن پر اکساید

هایډروجن پر اکساید داسي یو کیمیاوي مرکب دی چې دوه اتومه اکسیجن لري او مکروب وژونکی خاصیت لري چې مکروب وژونکی خاصیت یې په لاندې تعامل کې څر گند یری .




د هیدروجن پر اکساید دلاسته روړلو لپاره دلاندې طریقو څخه کار اخستل کیږي .

۱: که چیرې بار یوم پر اکساید د سلفوریک اسید سره تعامل کړي هایدروجن پر اکساید لاسته را ځي .



۲: که چیرې پر اوکسي داي سلفوریک اسید د اوبو سره تعامل وکړي هایدروجن پر اکساید لاسته راځي .



هایدروجن پر اکساید مکروب وژونکی خاصیت لري چې ۳۰ فیصده محلول يي د بر هایدروکل په نوم سره یا ډیري او د پر ښه انټیسیټیک خاصیت لري چې د زخمونو په ونځلو کې کارولنډ کیږي .

پوتاشیم پر منگانیټ (KMnO4)

پو تاشیم پر منگانت د اکسیجن یو بل مرکب دی چې په حقیقت کې مضاعفه (دوه فلزه) مالګه ده او په خپل تر کیب کې څلور اتومه اکسیجن لري او دا مرکب هم مکروب وژونکی خاصیت لري چې په لاندې تعامل کې څر گند یري .




پوتاشیم پر منگانت د محلول په حالت کې مکروب وژونکی خواص لري چې اتومي اکسیجن تولیدوي دغه اتومي اکسیجن د مکروب وژلو باعث کیږي او که چیري پوتاشیم پر منگانت ته تودوغه ور کړل شي مالیکولي اکسیجن تولیدوي چې د اور اخستلو سبب کیوي نوهمدا سبب ډبی چې په کیمیاوي لابراتوار کې د اکسیجن لاسته راوړلو لپاره ور څخه کار اخستل کیږي . برسیره پردې سره اکسیجن نور داسي مر کیونه هم لري چې مکروب وژونکو موادو په حیث ور څخه کار اخستل کیږي چې په راتلونکی کې به تر څیرنې لاندې ونیول شي .

د هایدروجن پر اکساید د پیژند نې لپاره څو څاڅکي ایتر چې په سلفوریک اسید سره تیزابي شوي وي پرې اچوو اووروسته یو اندازه د پو تاشیم داي کرومات محلول ور اضافه کوه نو ابي رنگ به غوره کړي چې د هغې له رویه پیژندل کیږي .

د جستو پر اکساید (ZnO2)

د جستو پر اکساید د جستو د اکساید او هایدروجن پر اکساید د تعامل څخه لاسته را ځي .



په همدې ډول سره مگنيزيم پر اکسايډ د مگنيزيم اکسايډ او هايډروجن پراکسايډ د تعامل څخه لاسته راځي.

د جستو پراکسايډ او مگنيزيم پر اکسايډ سپين رنگه پودر دی ، بوي نلري په اوبو کې نه حلېږي مگر په عضوي محلول کې حلېږي ، په رقيقو معدني تيزابونو کې حلېږي او په نتيجه کې د مر بوطه مالګې او هايډروجن پر اکسايډ جوړوي.

برسيره پر دې سره اکسيجن دانسان په بدن کې ډير زيات روال او اهميت لري کوم وخت چې د تنفس عمليې په واسطه اکسيجن د سږو په واسطه واخستل شي د وينې د هيموگلوبين په واسطه جراتو ته انتقالېږي په جراتو کې د هضم شوو خوراکی موادو سره يو ځای کېږي او خراکي مواد په کاربن داي اکسايډ ، اوبه او انرژي بدلوي چې يو اندازه کاربن داي اکسايډ د بدن څخه د تنفس عمليې له لارې خارجېږي او يو اندازه يې په کاربونيک اسيد بدلېږي او د کار بو نیک اسيد څخه په بدن کې گټه پورته کېږي . يو انزه اوبه د ادرار او عرق په شکل د بدن څخه خارجېږي او زياته برخه يې په بدن کې پاتې کېږي چې د بدن ټول تعاملات د اوبو په شتون کې صورت نيسي او د انرژي څخه د انسان د بدن انساج گټه پورته کوي .

طبي استعمال

پراکسايډونه په انتيسپټيک ډول سره د بهر د لارې د پودرونو او خميرو په شکل سره استعمالېږي د سترگو مله مونه په شکل هم کارول کېږي . خو بر عکس مگنيزيوم پراکسايډ د داخل له طرفه کارول کېږي او د معايي انتيسپټيک په ډول د ۵ – ۲۰ گرام پوري په ورځ کې کارول کېږي .

سلفر (S)

سلفر هم د شپږم گروپ عناصرو د جملې څخه دی چې غير فلز دی په جامد شکل سره پيدا کېږي په خالص او مرکب شکل سره پيدا کېږي ، په خالص ډول سره سلفر دځمکې د ډيرو طبقو څخه لاسته راوړل کېږي او مرکبات يې هم ډير زيات دي او عموماً په دوه ډوله دي يعنې عضوي او غير عضوي مرکبات.

الف: د سلفر غير عضوي مرکبات لکه سلفر داي اکسايډ (SO_2) ، سلفر تراي اکسايډ (SO_3)

سلفورس اسيد (H_2SO_3) ، سلفوريک اسيد (H_2SO_4) او مالګې د هغوي .

خواص



سلفر زير رنگه کرسټلي شکل لري په اوبو او الکولو کې نه حلېږي مگر په زيتون او او بنزين کې حلېږي او په بيرنگه دشعله سوزي او په سلفر داي اکسايډ باندې بدلېږي .

طبي استعمال

د جنجيو د دفعي لپاره ، د مسهل (**Laxative**) لپاره د تابلت په شکل کارول کېږي او د بهر د لارې د بوستکي ناروغيو د درملنې لپاره د مله مونه او محلولونو په شکل کارول کېږي .

سودیم سلفایډ (Na₂S)

سودیم سلفایډ د هایدرو جن سلفایډ او سودیم هایدروکسایډ د تعامل څخه لاسته راځي.




بیرنگه بلورونه دي په اوبو کې حلېږي او محلول يې قلوي دی د هوا سره د تماس په صورت کې تخریبېږي او تيو سلفت جوړوي .

طبي استعمال

د تنفس لارو د تشوشات او روماتيزم لپاره د محلولونو اويا د معدني اوبو په شکل کارول کېږي اړد بیرون له لارې د پوستکي ناروغيو په درملنه کې استعمالېږي .

سودیم سلفایټ (Na₂SO₃)

سودیم سلفایټ داسې مرکب دی چې د سودیم هایدروکسایډ او سلفورس اسید د تعامل څخه لاسته راځي .



سودیم سلفایټ دپودر په شکل سره وي سپن رنگ لري او بوي نلري ، په اوبو کې حلېږي او په الکولو کې نه حلېږي دهوا سره د تماس په صورت کې اکسید یشن کېږي او سلفیټ جوړوي .


طبي استعمال

داسیدي محلولو نو ، ادرینالین محلولونو د نورو درملونو دساتنې لپاره کارو کېږي برسیره پر دې سره د پوستکي ناروغي پر ضد د انټیسیپټیک مادې په حیث استعمالېږي .

سودیم هایدرو سلفایټ سپی زیر رنگه پودر دی به اوبو کې حلېږي مگر په الکولو کې لږ شاني حلېږي او محلول يې د بد بويي په ضد کارول کېږي اود مله مونو په شکل هم استعمالېږي .

سودیم سلفیټ (Na₂SO₄)

سودیم سلفیټ یو ه خنثا مالګه ده چې د سودیم کلورایډ او سلحوريک اسید د تعامل څخه لاسته راځي .



سودیم سلفیټ په خپل تر کيېب کې ۱۰ مالیکول کرسټلي ابه لري چې د تودوخې په اثر دغه اوبه له منځه ځي بوي نلري ، رطوبت جذبونکي خواص لري ، مالګین خوند لري او په اوبو کې حلېږي .


طبي استعمال

اوبه يې د اسموتیک عمل په واسطه جذبېږي او معایې د محتوا دزاتوالي سبب کېږي د میلن (Emollient) او مسهل (Laxative, purgative) په ډول تطبیقېږي .

مگنیزیم سلفیت ($MgSO_4$) یو سلفر لرونکي مرکب دی چې د مگنیزیم کاربنات او سلفوریک اسید د تعامل څخه حاصلېږي . یوه غیر عضوي مالګه ده چې دمسهل موادو په حیث طبابت کې استعمالېږي .

سودیم تیو سلفایت ($Na_2S_2O_3$)

سودیم تیو سلفایت هم یو غیر عضوي مالګه ده چې د سودیم سلفایت او سلفر د یو ځای کېدو څخه لاسته راځي .



شفاف جامد کرسټلي شکل لري په اوبو کې حلېږي او تریخ خوند لري .

د نقرې د نایټریتو په واسطه په سپین رسوب سره پیژندل کېږي . د ارسنیک د تسمماتو ضد په حیث طبابت کې استعمالېږي یعنې ضد زهري مواد دي .

اووم اصلي ګروپ (7A) ګروپ عناصر

په دې ګروپ کې فلورین (F) ، کلورین (Cl) ، برومین (Br) ، ایوډین (I) او استاتین (At) .

د دې عناصرو د جملې څخه استاتین رادیو اکتیف عنصر دی او د خپل ځان څخه نه لیدونکي وړانګې تولیدوي او پاتې څلور عناصرو کې فلورین او کلورین د غاز په حالت ، برومین مایع او ایوډین د جامد په حالت سره وي چې د دې ګروپ ټول عناصر طبي اهمیت لري په دې ډول سره چې فلورین په غاښونو کې ، کلورین او برومین د انساجو په مایعاتو کې او ایوډین دتایرایډ په غده کې شتون لري چې په راتلونکي کې به پدې رابطه معلومات تر لاسه کړو .

فلورین ډیر توکسیک (زهري) خواص لري نو په دې اساس دومره طبي استعمال نلري .کلورین ، برومین او ایوډین اود هغې مشتقات زیات طبي اهمیت چې په لاندې ترتیب سره څرګند ېږي .

۱: د هلوځنو هایډروجن لرونکي مشتقات لکه د هلوځنو اسیدونه

۲: د هلوځنو اکسیجنې مشتقات لکه هیپو کلورید ونه ، هیپو برومایدونه او هیپو ایوډایتی اسدونه

۳: د هغو مشتقات له څلوي فلزاتو سره

د هلو جنو هایدرو جني مشتقات

د هغو د مشتقاتو له ډلې څخه هایدرو کلوریک اسید طبي اهمیت لري یوازینی غیر عضوي تیزاب دی چې په ازاد حالت سره دانسانانو او حیواناتو په معده کې پیدا کیږي ، د انسانانو په معده کې ۳ فیصد ه شتون لري . هایدرو کلریک اسید د معدې په شیرې کې دوه ډوله فعالیت په غاړه لري ، یو دا چې پیپسینوژن په پیپسین شکل باندې اړوي ابل دا چې په معده کې باکتر یاوي یا ناروغي له منځه وړي .

نو همدا سبب دي چې د معدې د تیزابو د کموالي په صورت کې د هایدرو کلوریک اسید څخه کار اخستل کیږی

کلورو هیدریک اسید (HCl.)

د دوه ډوله هایدرو کلوریک اسید څخه ګټه اخستل کیږي یو هایدرو کلوریک اسید او بل رقیق هایدرو کلوریک اسید چې دواړه اسیدونه یو نوع خواص لري یازي په غلظت سره فرق لري چې غلظت یې ۲۴،۸ فیصده باید کم نه وي اود ۲۵،۲ فیصده څخه زیات نه وي .

د مشبوع هایدرو کلوریک اسید غلظت ۴۲ فیصده اود لوګي ور ګونکې هایدرو کلوریک اسید غلظت ۳۷ فیصده وي.

خواص

هایدرو کلوریک اسید یوه شفافه مایع ده بیرنگه او په ځنې وخت کې زیر رنگ لري په اوبو کې حلیری اود لټمس کاغذ په وړاندې اسیدی وي .

طبي استعمال

په طبابت کې د رقیق هایدرو کلوریک اسید څخه کار اخستل کیږي دخولي د لارې د څاڅکي په شکل او د پیپسین سره دمخلوط په شکل دمعدې تیزابو د نه کفایت په صورت کې ور څخه ګټه اخستل کیږي په ځنې وختونو کې د د اوسپنې لرونکو درملونو سره یوځای کوي د دې لپاره چې دهغوي جذب بنځه تر سره شي . هایدرو کلوریک اسید چې په طبابت کې ساتل کیږي باید په سر تړلو بوتلونو کې او په ساړه ځای د کوتې په تو دودوخه کې وساتل شي .

د هلو جنو اکسیجني مشتقات (هایپو کلوریتونه)


هایپو کلوریتونه قوي اکسیدانتونه دي چې په طبابت کې دهغې د دې خواص څخه کار اخستل کیږي هر کله چې کلورین د سودیم هایدرو اکساید ، پوتاشیم هایدرو اکساید او کلسیم هایدرو اکساید سره تعامل وکړی دغه مر کبونه لاسته راځي .



همدارنگه د کلسیم هایدرو اکساید او کلورین د تعامل څخه کلسیم هایپوکلوریت لاسته راځي .
 هایپو کلوریتونه قوي اکسیدانتونه دي چې په لومړي نړیواله جگړه کې انتیسیپتیک موادو په حیث ور څخه کار اخستل شوي دی . پوتاشیم هایپو کلوریت د جاویل اوبو په نوم سره هم یادېږي .
 څرنګه چې دغه مواد تحمض کونکي خاصیت لري په دې بنا د زخمونو په ضد عفونی کولو کې ور څخه کار اخستل کېږي .

کلسیم هایپو کلوریت (CaOCl_2)

کلسیم هایپو کلوریت داسې مرکب دی چې مکروب وژونکی خواص لري او په دې ډول سره لاسته راځي چې لمړي منفي کلسیم اکساید د اوبو سره یو ځای کوي تر څو چې کلسیم هایدرو اکساید لاسته راځي شي وروسته د کلسیم هایدرو اکساید څخه د کلورین غاز تیروي او په نتیجه کې کلسیم هایپو کلوریت لاسته راځي



خواص

کلسیم هایپو کلوراید سپین رنګه پودر دي اود کلورین بوي لري پم اوبو کې حلېږي مکروب وژونکی (انتیسیپتیک) خاصیت لري .

طبي استعمال

مکروب وژونکو موادو په حیث استعمالېږي برسیره پردې سره د ودانیو او تشنابونو په تعقیم کولو کې ور څخه هم کار اخستل کېږي .

د هلوچنو فلزي مر کبونه

هلوچنونه داسې عناصر دي چې د فلزاتو سرزه په اسانې سره تعامل کوي او مر کبات جوړوي چې زیتره مر کبونه يي طبی اهمیت لري او دهغوي د جملي څخه ځنې مرکبات تر څیړنې لاندې نیسو .

سودیم کلوراید (NaCl)

سودیم کلوراید په معدانونو او دبحر په اوبو کې په زیاته پیمانه سره پیداکیږي چې دبحر اوبو دتبخیر څخه پیداکیږي هغه مالګې چې دبحر څخه لاسته راځي ځنې ناپاکی هم لري چې هغه ناپاکی عبارت دسودیم سلفیت Na_2SO_4 ،مګنیزیم کلوراید MgCl_2 ،مګنیزیم سلفیت MgSO_4 ،اوکلسیم کلوراید CaCl_2 ددی لپاره چې دغه ناپاکی ددی ملګو څخه لری کړواوسودیم هایدرواکساید اوالمونیم هایدرواکساید ورباندې علاوه کړو په نتیجه کې

ناپاکی رسوب کوی .کوم وحت چی شفاف محیط لاسته راشی نو هعی ته تودوچه ورکوی
ترخوچی علیظ محلول لاسته راشی .دسودیم کلوراید کرسئلونه چی وچ کرل شی په یخ
لوبنی کی رسوب کوی

ددی لپاره چی خالص سودیم کلوراید لاسته راوړوکوم چی دطبی مقاصدولپاره کارول کیږی
نوهعه سودیم کلوراید دسودیم کاربنیت اوهایدروکلوریک اسید تعامل څخه لاسته راوړو




فزیکي خواص:

سودیم کلوراید بیرنگه اویادسپین پودر په شان کرسئلونه جوړوی په اوبوکی ۱:۳ سره حلیری
اوپه الکولوکی سپک حلیری اوخلیدل یی د **HCl** په علاوه کیدوسره کمیږی اوتقریباً دعلیظ
هایدروکلوریک اسید په واسطه غیرمنحل کیږی .دسودیم کلوراید محلول پاک وی چی
یوایزوتونیک محلول دی په اوبوکی زرقي حالت احتیاری
پیژندنه :

۱. دسودیم آیون باندی تعامل :کوم وحت چی سودیم وسوخل شی په زیره لمبه سوخی

۲. دسودیم کلوراید تعامل دسلورنایتریت **AgNO₃** سره چی سپین رسوب جوړوی




پورته تعامل دهعه مرکبونوترکیب دی چی دتعویض کونکوپلازماتیک مایعاتوپه حیث
ورڅخه کار اخیستل کیږی .علظت یی په وینه کی **0.5** فصد دی اودوینی فشارپه نارمل
ساتلوکی خاص رول لری .په هعه صورت کی چی دسودیم کلوراید فیصدی په بدن کی کمه
شی نوپه همعه صورت کی په اورگانیزم دانسان کی **0.9** فصد ایزوتونیک محلول په ورید
اوپوستکی دلاری ورکول کیږی چی دری نوع دواگانی یی درسمی دواگانوپه نوم سره
یادیږی دسودیم کلوراید **0.9** فصد محلول چی ایزوتانیک وی یوبیرنگه اوشفافه مایع ده
دمالگی په شان خوندلری .برسیره پردی **5.3** او **10** محلول دسودیم کلوراید دزحمونوپه
ونخلوکی استعمالیږی اوهمدارنگه دسودیم کلوراید محلول دستونی دردلپاره هم استعمالیږی
چی مکروبوته دمینځه وری

پوتاشیوم کلوراید KCl :

په داخل دحجره کی یو آیون **K** اودسودیم آیون په شکل دامرکب هم دحجرو دایزوتنیک تنظیم کی ډیره بڼه رول لری . دپوتاشیم کلوراید دزړه ناروغي په درملنه کی کارول کیږی خصوصاً په انتوکسیکیشن دقلبی هیټروزیډونوکی حاصل اهمیت لری کوم وخت چی ددوام داره دتاوی ۱۰ فصدہ تابلیتونه له محی دحولی دلاری ورکول کیږی تشخیص یا پیژندنه :

۱. دپوتاشیم کلوراید تعامل دتارتاریک اسید سره چی یوسپین رسوب دپوتاشیم تارتات جوړیږی



۲. دکلورایدونو تعامل دنقری نایتريت **AgNO** سره چی نقره جواب ورکونکی اوسیږی

دسودیم (Na) اوپوتاشیم برومایدونه :

ددی مرکباتو رسمی دواگانوشمیرل کیږی **1Potassiumbrom**

2.Tob photassiumbromide 0.56 دخکلوپه اوبوکی دامواد ډیرلږشتون لری

3 Sodium bromide دامرکبونه اراموونکی خواص لری دتایلټوپه شکل په مخلوطی ډول سره دحولی دلاری ورڅخه استفاده کیږی



سودیم **Na** او **Sedative K** چی داعصابو اراموونکی خواص هم لری اوپه مخلوط شکل دایونو ډیپژندلوپه وخت کی استعمالیږی
یوډیم اوپوتاشیم ایوډاید:

په درملنه دهاییپرتایریوز **Hyper thyroses** یا جاعورکی کاراحیستل کیږی . هرکله چی په خوراکی موادو دخکلوپه اوبوکی په کافی اندازه سره ایوډین موجودنه وی خصوصاً دعرنی منطقوکی خلک زیاتره دجاعور په ناروغي اخته وی نودعه نارو عانوته ایوډین دداخل له طرفه دمحلول اومخلوط په شکل ورکول کیږی .


فزیکي خواص:

کلورایدونه یا برومایدونه او آیودایدونه سپین کرسټلی شکل لری یواځی آیودایدونه زیرنگه رنگ لری کوم وحت چی دکاربن دای اوکساید سره په تماس کی شی دهواپه رطوبت کی آیودین ازادوی داتول په اوبوکی په اسانی سره حلیری مگر انحلالیت یی په الکولوسره فرق کوی پدی ډول چی پوتاسیم کلوراید په الکولوکی نه حلیری ،سودیم کلوراید اوسودیم اوسودیم بروماید په الکولوکی لږ حلیری اوسودیم آیوداید په الکولوکی منحل دی لاسته راوړل :

سودیم کلورایدپه معدنونوکی اوپه بحرکی په طبعی ډول سره په زیاته پیمانه پیداکیږی اودهغه منا بغوڅخه یی ددواجوړونی لپاره لاسته راوړی برومایدونه او آیونونه .په همدی طریقې سره لاسته راځی اوداوسپنی په صنعت کی دبرومین داوبو او آیودین سره تعامل ورکوی او FeBr_2 او FeI_2 جوړوی . اودهغه حل لپاره برومین یا آیودین ورباندی زیاتوی یعنی



وروسته داوسپنی بروماید اوداوسپنی آیوداید ومحلول باندی سودیم کاربنات ورزیاتوی




که چیری Na_2CO_3 په ځای پوتاسیم کاربنات علاوه شی نوپه هغه صورت کی پوتاشیم بروماید او پوتاشیم آیوداید لاسته راځی .په دوام داره توگه دبرومایدونو استعمال کیدای شی چی زهریت مینځ ته راوړی (ریزش ،توخی اوداعصابوضعیفوالی) په هغه صورت کی چی کوم کس دبرومایدونوپه واسطه تسمیم شی نوپه هغه صورت کی په زیات مقدار سره


۱۰۰-۲۰ گرام پوری سودیم کلوراید په ۲۴ ساعتوکی دورید دلاری ۳-۵ لیتره پوری زرق کولی شو

آیودین: آیودین ۵۳ اتومی نمبر او ۱۲۶.۹ یی اتومی وزن لری اومختلف اکسیدیشن نمبر لری په طبیعت کی په بحری اوبو او بحری نباتاتوکی پیداکیږی. چیلی په نایتريت کی او هغه چینی چی دپترولو سره نږدی وی پیداکیږی او په مختلفو شکلونو سره دهمدی منابعوڅخه لاسته راځی


۱. په صنعت کی دچیلی نایتريت او کرسټلی نایتريتونوڅخه دمعدنی اوبوڅخه دآیودت په شکل لاسته راځی یعنی



هغه آیودین چی لاسته راځی یواندازه دآیودایت محلول سره یی یوځای کوی. که چیری داتعامل په تیزابی محیط کی ترسره شی عیناً دمربوطه تیزابوپه شان عمل ترسره کوی



۲. **Courtois.** په طریقه دبحری نباتاتوڅخه هم کولی شو چی آیودین لاسته راځی پدی ډول چی وروسته دسوځیدو دبحری نباتاتو (**Algae**) څخه چی ایره یی لاسته راځی اودهعی کلورین فازتیروی او آیودین لاسته راځی



۳. دمعدنونو او بحری اوبوڅخه آیودین پدی ډول سره لاسته راوړل کیږی چی ناپاکی یی د **Bisublimation** عملیې پواسطه لری کوی

خواص: آیودین دپولادی رنگه پانوپه شکل سره پیداکیږی مخصوصه ځلالری. مخصوص بوی لری په عادی حالت کی دتصعید **Sublimation** عملیه ترسره کوی او په اوبوکی لږ حلیری. په اکسیجن لرونکی عضوی محلولونوکی په سورنصواری رنگ او هغه عضوی محلولونه چی اکسیجن ونلری په بنفش رنگ سره څرگندیږی

استعمال: څرنګه چی آیودین مکروب وژونکی خواص اودتبخیر په جوړولوکی اوابی محلولونه یی دالکولیک په حیث کارول کیږی په ضد عفونی کولو دپوستکی کی دزحمونوپه درملنه کی، ستونی درد لپاره دهعی ۵ فصدہ محلول کارول کیږی اودگلسترین سره دمحلوط

کیدوپه صورت کی دملهمونوپه جوړولوکی استعمالیږی. په تنفس تنگی اوتایروټوکسیک لپاره ډیر موثر دی

د آیودین محلول :

د آیودین محلول آبی محلول لوگل محلول **Lugol's Solution** یواځی د آیودین داسی محلولونه دی چی په هغی الکول شتون نلری او په داخل د بدن کی توصیه کیږی لوگل محلول د آیودین اوسوډیم یا پوتاشیم آیوداید د حلیدوڅخه په اوبوکی لاسته راځی. د آیودین الکولی محلول نظر ابی محلولونو ته ډیر تخریش کوونکی وی

استعمال : آیودین **Anti-hyper-thyroids** په شکل په موضوعی ډول دانفکشن ضد اومکروب وژونکی مادی په حیث استعمالیږی

Povidone-Iodine : د آیودین یو کمپلکس دی چی ۹-۱۲ فصدہ آیودین لری

منگان یا منگنیز :

منگان د دورانی جدول په ۷ گروپ د **d** بلاک کی موقیعت لری او یوانتقالی فلز دی اتومی نمبر یی ۲۵ اتومی وزن یی ۵۴ دی اوداعنصر ۶، ۴، ۳، ۲، ۷ او ۷ ولانس لری منگان په کم ولانس یا اکسیدیشن نمبر سره القلی خواص لری. او په لوړ ولانس یا اکسیدیشن نمبر سره تیزابی یا اسیدی خواص لری ډیر مرکبونه لری چی پوتاشیم پرمنگانت یی طبی اهمیت لری

پوتاسیم پرمنگانت:

لاسته راوړل: د لاسته راوړلو لپاره د **Pyrolusite** د اکسایدونو او منگان مشتقات د طبی میزان څخه د **MnO₂** په شکل استفاده کوی د **MnO₂** ویلی کیدوڅخه د القلی سره په شین تیاره رنگ بدلیږی. کوم وخت چی یوقوی اکسیدانت ورباندی علاوه شی په

Permanganat باندی بدلیږی $2\text{MnO}_2 + 4\text{KOH} + \text{O}_2$



خواص : پوتاشیم پرمنگانت کرسټلی شکل لری سوربنفش تیاره رنگ لری اوفلزی خلاهم لری په اوبوخصوصاً په جوش اوبوکی ښه حلیری

کیمیاوی تعاملات :

پوتاشیم پرمنگانت یوقوی اکسیدیشن کونکی ماده ده او اکسیدانی حالت یی نظر په محیط سره فرق کوی . په القلی محیط کی قوی پوتاشیم پرمنگانت په پوتاشیم پرمنگانت بدلیری چی شین تیاره رنگ اختیار وی.




په حنثی محیط کی دمنگان ولانس **+7** څخه **+4** ته تنقیص مرمی اوبه **MnO2** باندی بدلیری



په تیزابی محیط کی په منگان دوه ولانسه **+2** باندی بدلیری اورنگ یی دمنځه ځی

ز



استعمال :

پوتاسیم پرمنگانیت دانتي سپتیک مادی په حیث دبیرونی علظت په اساس دهعی داوبلن محلول څخه کار اخیستل کیږی او همدارنگه دزخمونودونځلولپاره په ولادی نسایی کی دغر غره کولپاره هم استعمال کړه ۲-۵ فصده دسوځیدنی په وخت کی ورڅخه کار اخیستل کیږی د۰.۲ فصده محلول څخه دمعدی په ونځلوکی دتسمماتودمورفین اوترياکوکی کار اخیستل کیږی


هایدرو کاربنونه

هایدرو کاربنونه هغه عضوي مرکبونه دي چي د کاربن او هایدرجن څخه جکړ شوي دي او عمو ما په دوه لویو برخو ویشل شوي دي یعني الفاتیک او اروماتیک .

الياتيک هايډرو کاربنونه په څلور ډوله دي : الکانونه ، الکينونه ، الکاينونه او سايکلو الکانونه چې الکلونه او سايکلو الکانونه مشبوع دي ، الکينونه او الکاينونه غير مشبوع دي .

اروماتيک مرکبونه په څلور ډوله سره دي : بنزين سلسله ، نفتالين سلسله ، انتراسين سلسله او هترو اومات .

لاندې شکل د هايډرو کابنو طبقه بندي څر گندوي



الکانونه (**Alkane**) مشبوع مرکبونه دي چې دکاربن اتمونه يې د هايډروجن اتموپه واسطه مشبوع شوي دي او عمومي رفورمول يې $C_n H_{2n+2}$

الکانونه د ځينو خواصو سره په لاندې جدول کې څر گنديږي .

نوم	دوړليکيدوټکی [°C] فورمول	دایشيدوټکی [°C]
Methane	CH ₄	-184
Ethane	C ₂ H ₆	-89
Propane	C ₃ H ₈	-42
Butane	C ₄ H ₁₀	-0.5
Pentane	C ₅ H ₁₂	-36
Hexane	C ₆ H ₁₄	-69
Heptane	C ₇ H ₁₆	-98
Octane	C ₈ H ₁₈	-126
Nonane	C ₉ H ₂₀	-151
Decane	C ₁₀ H ₂₂	-174
Undecane	C ₁₁ H ₂₄	-196
Dodecane	C ₁₂ H ₂₆	-216
Tridecane	C ₁₃ H ₂₈	-230
Tetradecane	C ₁₄ H ₃₀	-251
Pentadecane	C ₁₅ H ₃₂	-268
Hexadecane	C ₁₆ H ₃₄	-280
Heptadecane	C ₁₇ H ₃₆	-303
Octadecane	C ₁₈ H ₃₈	-317
Nondecane	C ₁₉ H ₄₀	-330
Eicosane	C ₂₀ H ₄₂	-36
Pentacosane	C ₂₅ H ₅₂	-53
Triacontane	C ₃₀ H ₆₂	-66
Tetracontane	C ₄₀ H ₈₂	-81

الکانونه د پارافین په نوم سره هم یادېږي چې په جامد شکل سره پیدا کېږي او په طبابت کې استعمالېږي

د هایدرو کار بنو طبي استعمال

مشبوع هایدرو کاربنونه انتیسیپتیک خواص لري ، مشبع هایدرو کاربنونه چې د پارافین په نوم سره هم یادېږي په پازيو تراپي کې ورڅخه کار اخستل کېږي . برسیره پردې سره د مشبوع ایدرو کار بنو څخه په نیرو لوژی کې او په فرمسي کې د دواگانو په جوړولو کې هم کار اخستل کېږي ..

سايكلو پرو پان چې يو مشبوع کړېږي هایدرو کار بن دی یوه قوي انستيزي ده چې په لوړ غلظت د اکسیجن سره یو ځای استعمالیږي .


د هیدرو کار بنو هلو جنې مشتقات

کوم وخت چې د هایدرو کاربنو هایدرو جنونه په کلورن ، برمین اویا ایوډین باندې بدل شي د هایدرو کاربنو هلو جنې مشتقات لاسته راځي چې ځنې یې په لاندې ډول سره تر څیړنې لاندې نیسو .

ایټایل کلوراید (C₂H₅ Cl)

ایټایل کلوراید یوه بیرنگه مایع ده مخصوص بوي لري په اوبو کې په سختي سره حلېږي مگر په الکولو او ایتر کې په اسانۍ سره حل داو مخلوطیږي .

که ایتان د کلرین سره یوځای کړل دښي دغه مرکب لاسته راځي .



دایټایل کلوراید طبي استعمال

ایټایل کلوراید یوه لنډ مهاله انستيزي ده او ځنې وخت د لنډ مهاله انستيزي په شکل هم ترې کلر اخستل کیږي . باید په تیاره ځای کې وساتل شي و اور په وړاندې زیات خطر لري .

فلوتان یا هلو تان (C₂F₃ ClBr H)

فلو تان انستيزي ده چې په لمړنیو وختو کې د هغې څخه د بیهوشه کونکي مادې په حیث استعمالیده مگر اوس د فلوتان څخه کار نه اخستل کیږي .


ایود و فارم (CH₃I)

دایودو فارم په تر کيب کې کاربن هایدرو جن او ایوډین شتون لري ، ایودو فارم زیر کرسټلي پودر دی د جوش نقطه یې ۱۱۶- ۱۲۰ درجو د سانتيگراد پوري دی اومکروب وژونکی جاسیت لري په طبابت کې د زخمونو په ونځلو وړ څخه کار اخستل کیږي ، د پودرونو او ملهمونو په شکل وړ څخه اخستل کیږي .


ایوډین د پروتین سره کامپلکس جوړوي او د مایکرو اورگانیزم د مینځه وړلو سبب کیږي .

الکولونه (Alcohol):

هغه مرکبات دي چې په هغې کې د **OH** گروپ د کاربن سره اشتراکي رابطه نو لدې کبله الکولونه تیزابی او القلی خواص نلري مگر مکروب وژونکی خواص لري د الکولو مرکب وژونکي خواص د لارندې فورمول له مخې څرگندیږي.



Alcohol group Alcoho د مکروب وژلو باعث کېږي




Ethanol

Ethoxi- group

د مکروبونو په وژلو کې ډیر موثره دي نو ځکه ایتانول په طبابت کې استعمالیږي.
الکولونه عموماً په درې لویو برخو ویشل شوي دي


دریمی الکول $\text{R}-\text{R}^{\text{C}}-\text{OH}$ $\text{CH}_3\text{-CH}_{\text{CH}_3}^{\text{CH}_3}-\text{OH}$ Isobutanol	دوهمی الکول $\text{R}-\text{H}^{\text{C}}-\text{OH}$ فرمول $\text{CH}_3\text{-CH}_{\text{CH}_3}^{\text{OH}}$ Iso propanol	اولی الکول $\text{R}-\text{OH}$ $\text{CH}_3\text{-OH}$ Methanol $\text{C}_2\text{H}_5\text{-OH}$ Ethanol
---	---	--

گلسرین Glyceral: یو درې قیمتہ الکول دي چې د انسان د وجود په شحم کې د شحمی اسیدونو سره
د **Tri glyceride** ترای گلسرید په نامه **Ester** جوړیږي.




گلسرین شربنه مزه لري دا هم مکروب وژونکی خواص پوستکي په نوم ساتلوکي ډیر د اہمیت لري په اوبو
کې ښه حلېږي.

نوږدې اساس هغه بوتلونه چې الکول پکې ساتل کېږي.
باید رنگه وي له لمر څخه لږی وساتل کېږي.




Acetaldehyde

هغه الکونه چې نن ورځ ډیر استعمالیږي د نشایستی (**Starch**) د تحمر عملیه پواسطه الکول راسته
راوړه.






ایټایل الکول: یو اتمه الکول شیرینه مزه نلري مگر د **OH** په زیاتیدو سره د الکولو شیرینی زیاتیږي. ایټایل د نشایستی څخه لاسته راځي پدې ډول چې د نشایستی د تخمر څخه په **CO 140—150** کې د امیلسی **Amylase** انزایم په شتون کې چې د خمیر څخه لاسته راځي الکول حاصلیږي.




Starch

Maltese



Maltese


glucose



Glucose

Ethanol


ایټایل الکول په ترکیی یا (**Senthyse**) سنتیز په طریقه لاسته راځي.



خواص **Propertase**: الکول یو شفاف مایع ده مخصوص بوی لري، ترخه مزه لري په آبی رنگ سره چې رڼایي کمه وي سوزی او په اوبو، اتیر، استیون او گلسرول کې منحل وي. استعمال:

الکول فارمکولوژي تاثیرات لري، په لمړۍ مرحله کې په مرکزي عصبی سیستم تاثیر کوي او هغه ضعیفوی او همدارنگه په تنفیسی سیستم هم تاثیر لري، ایټایل الکول په **50--- 70%** پورې مکروب وژونکي خاصیت لري په اوبو کې ښه حلیري په **78Co** کې په جوش راځي که چیرې فیصدی د ایټایل الکولو د **80%** لوړیږي نو په هغه صورت کې الکول بسمو ښه کوونکی خواص اختیار دي چې د شرابو په نوم سره هم یادیري.

تشخیص یا پیژندنه: معمولاً ایټایل الکول د استیک اسید سره د تعامل په صورت کې ښه پیژندل کېږي ځکه استیک اسید د مرکبانو سره استر **Ester** جوړوي.





Acetic Acid

Ethanol

Ethyl -acetate (Ester)

گلسرین (Glycerin):

گلسرین یو درې قیمتہ الکول دي چې د پروپان تراپول **Propantrios** پنوم سره یادیري. گلسرین شیرینه مزه لري، په اوبو کې په هر نسبت سره حلیري یو لزوجه مایع ده چې مکروب وژونکی خواص هم لري، گلسرین د شخمیاتو څخه د القلی محلول د یو ځای کیدو په صورت کې اسانی سره لاسته راځي.






شحمیات glyxern Hydro xide (Eats) صابون (شحمی مالگه)

د گلسرین استعمال:

گلسرین په طبابت کې ډیر استعمالیږي معمولاً د پوستکي په نرمولو کې خواص لري چې د پوستکي نرمولو لپاره او د نراحبت پیدا کولو په فزیک کې راسته راځي
تشخیص یا پیژندنه: د گلسرین د پیژندلو کې مصرف پوتاشیوم بای سلفیات دي، کوم وخت چې د گلسرین څخه اوبه جلا کړل شي نو په هغه صورت اکرولین راسته راځي.



الديهيدونه (Aldehsds):

الديهيدونه هغه مرکبونه چې د کاربوسیل گروپ هم لري، د الديهيدونو گروپ ($\text{-C}^{\text{O}}\text{:H}$) دی د الديهيدونه په اليفالیک او اروماتیک او هیترو سایلکت په شکل پیدا کېږي.
معمولاً الديهيدونه مکروب وژونکي خواص لري الديهيدونه په اوبو کې منحل دی، د الکولو د شخم څخه په اسانۍ لاسته راځي.



Propanl ocl

فارم الديهيد 40% (Formalin):

فارملین ډیر ښه مکروب وژونکي ماده ده چې په طبابت کې د مکروب مادي په حیث د زخمونو په ونځلو کې استعمالیږي که چیرې متیایل الکول (Methanol) تحمض شي نو فارم الديهيد لاسته راځي.



Methanol

Formalin


د فارم الديهيد خواص: د فارم الديهيد بخارونه نامطبوع بوی لري، اوبو کې حلېږي او د الکولو سره په اسانۍ سره مخلوط کېږي د فارم الديهيد محلول شفاف، بی رنگه او مخصوص بوی لري فارم الديهيد په 9co کې پولیمیر کېږي او سپین رسوب جوړوي.

استعمال: فارم الديهيد د مکروب وژونکي مادي په حیث د باکتریا لرونکو پروتین په مکروب وژلو کې هم استعمالیږي 0,5% محلول يې په جراحی کې د مکروب وژونکي مادي په حیث استعمالیږي، شپږ


(6) مول فارم الديهاید چې د څلور مول امونیا سره مخلوط شي د (Urotropin) په نوم مرکب جوړوي چې ښه مکروب وژونکی ماده ده .



خواص: یو تروفین بی رنگه سپین کرسټلونه جوړوي اوبو الکول او نو عضوی محلولونو کې حلېږي د تودوخې د لوړېدو په صورت کې تجزیه کېږي نو د رڼا څخه باید لېرې وساتل شي .
کلورل هیدرنیت (Chlorol hexdrint): دا مرکب په حقیقت کې ترای کلوریو اسیت الديهاید د هایدرشین څخه لاسته راځي،



که چیرې دوه مول د پورته مرکب سره متراک شي نو ترای کلورید په استیک اسید، هایدرکلوریک اسید او اوبو باندې بدلیږي.




ترای کلورو استیک اسید دای کلورو اسیت الديهاید

استعمال:

کلورال هیدرات ډیر ښه د اعصابو ارامونکی دوا ده معمولاً په 200—500 ملی گرام پورې د ارامونکې دوا په حیث استعمالیږي او په 0,5-1g دوز سره په یوه ځل سره د خوب راوړونکې په حیث استعمالیږي او په زیات دوز سره په بدن باندې تارکونیک تاثیرات لري چې د لومړیتوب په درملنه کې استعمالیږي، د کلورای هیرات د استعمال وروسته په ډیر سرعت سره خوب په انسان باندې راځي او —6 8 ساعتو پورې دوام پیدا کوي.

کاربوکسلیک اسید CARBOXYLIC ACID او مشتقات:


کاربوکسلیک اسیدونه هغه مرکبات دي چې د هایډروکاربن یو اتوم هایډروجن په کاربوکسیل —COOH بدل شوي وي.



څرنگه چې عضوي تيزابو د کاربوکسيل $\text{OH}-\text{C}^{\text{O}}$ - گروپ د دوه گروپو يعني هايډروکسيل گروپ $\text{OH}-$ او کاربوسيل C^{O} - څخه جوړدی نوپدې اساس دا مرکبونه د کاربوکسليک **Carboxylic** اسيدو په نوم يادېږي. عضوي تيزابونه په څو برخو ویشل شوي دي لکه يو کابوکسله ، دوه کابوکسله ، درې کابوکسله ، هايډروکسي اسيدونه ، هلو اسيدونه ، امينو اسيدونه . څرنگه چې د کاربوکسيل گروپ د عضوي مرکبانو په ماليکول کې حلېدل د هغې په اوبو کې زياتوي او فزيالوجيک فعاليت د هغې کموي نو پدې اساس کاربوکسليک اسيدونه په دوا جوړونه کې لږ دی مگر په طبابت کې مالګې د هغې زيات استعمالېږي.

الف، پتاشيم استيت **Potassiumacetate** : **(CH₃-COOK)**

لاسته راوړل: پوتاسيوم استيات د استيک اسيد او پوتاسيوم هايډروکاربونات د تعامل څخه لاسته راځي.




اوبه کاربن دای اکسايډ پوتاسيوم استيک ----- پوتاسيوم هايډروکاربونات سرکي تيزاب

خواص:

پوتاسيوم استيک يو سپين رنگه پوډر دي د مالګې په شان خوند لري او سپک بوی لري په اوبو کې ډير حلېږي او بلن محلول يې خنثی وي او سپک قلوۍ خاصيت لري. استعمال:

پوتاسيوم استيت بې رنگه شفافه مایع ده % **33—35** پورې پوتاسيوم استيت حالص وي مقاومت يې لږ دي د کمې مودې لپاره جوړېږي او د خولۍ د لارې پتاسيوم استيت محلول (**33 - 35%**) د زړه ناروغۍ په درملنه کې استعمالېږي.

کلسيم استيت **CALCIUM ACETATE**



کلسيم استيت په خپل ترکيب کې **5** ماليکوله کرسټلی اوبه لري، کلسيم استيت استيک اسيد څخه د څو طريقو په لاسته راځي.

۱- که چيرېر فلزي کلسيم د استيک اسيد سره تعامل وکړي کلسيم استيت لاسته راځي.



۲- که چيرېر کلسيم هايډرواکسايډ **Ca (OH)₂** د استيک اسيد سره تعامل وکړي کلسيم استيت جوړوي.




۳- که چيرې کلسيم کاربنت د استيک اسيد سره يو ځای شي کلسيم استيت لاسته راوړي




په شمیک کې صابون داسې جوړوی چې شحمی مخصلات ته تودوخه ورکوي تر څو چې ویلی شو او په جوش راشي وروسته څاڅکي څاڅکي القلی ورزیاتوي.

او د دیترضیت مواد (**Deter gents**) چې پاکونکو موادو په صیفت په نړی د **80%** پورې استعمالیږي لکه **Sodium lauryl sulphet**


sulphet



چې معمولاً د یترجنیت مواد په اوبو کې د منحل راشي شکل یې:




معمولاً پاکونکي مواد (**Deter gents**) د الکولو او سلفوریک اسید د یو ځای کیدو څخه لاسته : (b)



کلسیم لکتیت **Calciam Lactate** **:(CH3-CH-COO)2 Ca.5H2O**

کلسیم لکتیت چې په ترکیب کې کلسیم او لکتیت شتون لري کلتیک اسید د شدو قند (**Lactose**) څخه د لکتیز **Lactase** انزایم پواسطه لاسته ډول راځي پدې چې لمړی د لکتوز قند په گلوکوز او گالکتوز باندې ماتېږي.



Lactose

glucose glucotose

وروسته د یو قیمته قند (**gluctoses**) څخه د انزایمونو په فعالیت سره کلتيک اسید لاسته راځي



COOH

لکتيک اسید **CH3-CHOH-COOH** د شرو تیزابو په نوم یادېږي چې د شډو د قرش والی سبب کيږي.

د لکتيک اسید **Lactic Acid** څخه د کلسیم فلز د زیاتیدو په صورت کې کلسیم لکتيک لاسته راځي. ۱- که چیرې د کلسیم فلز د لکتيک اسید یو ځای شي کلسیم لکتیت جوړېږي.



Calcium – Lactate

۲- د کلسیم هایډرواکساید او لکتيک اسید د تعامل څخه کلسیم لکتيک لاسته راځي:



۳- د کلسیم کاربنټ او لکتيک اسید د تعامل څخه هم کلسیم لکتیت جوړېږي:



H₂

Lactic acid


calcium- Lactate

چې پورته عملیه پدې ډول سره تر سره کيږي چې د کلسیم کاربنټ **Calcium Carbont** مشبوغ محلول جوړ وي او جوش ورکوي او لکتيک اسید محلول يې یو ځای کوي چې دا عملیه د یوه ساعت په موده کې تر سره کېږي وروسته یې سروبي تر څو چې اضافی کلسیم کاربنټ رسوب وکړي بیا یې فلتر کوي او په خپل حالت باید پرینودل شي تر څو چې کرسټلونه جوړ شي.

خواص: کلسیم لکتيک سپین رنګه پوډر دي څرنگه چې په خپل ترکیب کې کرسټلی اوبه لري نو پدې اساس ازاده هوا کې په ذرو، ذرو بدلیږي، په اوبو کې په اساني سره حلېږي روماتیک (مکدر) محیط جوړوي چې د گرمیدو په اثر یې دغه مکدریت له منځه ځي په داسې حال کې چې په الکولر ، اتیرو او کلوروفارم کې ډیر لږ حلېږي.

استعمال: کلسیم لکتيک د جراحي په عملیاتو کې د خون ریزی د مخنوی په عرض ورڅخه کار اخیستل کېږي. د الرژی په واقعاتو کې ورڅخه هم کار اخیستل کېږي. څرنگه چې کلسیم لکتيک په معده باندې تاثیر نلري.

نو پدې اساس د کلسیم لکتيک څخه نظر کلسیم کلوراید ته د استعمال لپاره زیات اهمیت ورکول کېږي.




OH

دا مرکب په خپل ترکیب کې د درې مالیلول کرسټلی اوبه لري.

د اوسپنې لکتیک لاسته راوړی (PREOARATION):


د اوسپنې لکتیک لاسته راوړلو لپاره لاندې طریقو څخه لاسته راځي:

۱- که چیرې کلسیم لکتیک د فرس سلفیت سره تعامل وکړي د اوسپنې لکتیت لاسته راځي.



کلسیم سلفیت داوسپنې لکتیت کلسیم لکتیت

۲- که چیرې د اوسپنې ذری (Fe) په لکتیک اسید کې واچول شي په نتیجه کې لږ مقدار سره د اوسپنې لکتیت لاسته راځي،



خواص: سپین کرسټلي پوږ دې شکل لري او شین پوښت لري شیرینه مزه لري په گرمو اوبو کڅ حلېږي او اړبلن محلول کې په ازاده هوا کې مقاومت نلري د محلول رنګ د شین څخه په زیر بدلیږي او په خاکی رنګ سره بدلیږي.

استعمال: د اوسپنې لکتیک د پټې کم خونی د منځه وړلو لپاره کارول کېږي د اوسپنیلکتیت نظر نور مرکباتو ته یې زیات استعمالیږي او د خولې د لارې مریض ته ورکول کیږي.


الیفاتیک امینو اسیدونه

ALIPHATIC AMINO ACID

امینو اسیدونه هغه عضوی مرکبونه دي چې د امین (NH₂) او کاربوکسیل (COOH) ګروپونه لري یعنې داسې مرکبات دي چې تیزابی او القلی خواص لري په حقیقت کې امفوتریک مرکبونه بلل کېږي.

د امینو اسید عمومي فورمول $R - \underset{NH_2}{CH} - COOH$ دي.

د امینو اسیدو امفوتریک خاصیت په لاندې تعاملاتو کې څرګندیږي.




تیزابی خاصیت



القلی خواص

د پورته تعاملاتو څخه داسې څرگندېږي چې د کاربوکسيل (**-COOH**) گروپ تيزابي خواص او د امين (**NH2**) گروپ القلي خواص لري.

امينو اسيدونه چې اساس د پروتين جوړوي يعنې د امينو اسيدو د تراکم څخه پروتين حاصلېږي



الکول د قوي فلزاتو او عضوي تيزابو د تعامل په صورت کې د الکولو د **OH** گروپ هايډروجن تعامل کې برخه اخلي.




Sod-

alcoholat



الکول د عضوي تيزابو د تعامل په صورت کې استروني لاسته راځي، استروني خوراكي مواد دي لکه:



اولی الکول چې تحمض شى الډيهايډ جوړوي او دوهمی الکول چې تحمض شى کتون حاصلېږي مثال:



الکول په الکولو کې حلېږي څخه چې د الکولو د **OH** د اوبو د **OH** گروپ سره نشابي دی د الکولو د جوش نقطه نظر مربوط هايډروکاربن ته مربوط دی ځکه چې د الکولو د ماليکولو په منځ کې هايډروجن رابطه جوړوي.

د پورته تعامل څخه معلومېږي چې د پېتا پدې رابطې پواسطه امينو اسيدونه سره متراکم شي او دای مير **Dimer**، ترای مير **Trimer** او پوليمير **Polymer** جوړوي. معمولاً امينو اسيدونه په لاندې برخو ويشل شوي.

۱- تيزابي امينو اسيدونه: هغه امينو اسيدونه دي چې د کاربوکسيل (**-CooH**) گروپو شمير يې نظر د امين (**NH2**) گروپو ته زيات وي لکه

۲- القلي امينو اسيدونه: پدې امينو اسيد کې د امين (**NH2**) گروپو شمير نظر کاربوکسيل ته زيات وي لکه:



۳- خنثی امينو اسيد: هغه دی چې د کاربوکسيل او امين گروپونو شمير يې سره مساوی وي لکه:

گلايسين

۴- اروماتیک امينو اسيدونه: هغه دی چې په خپل ترکيب کې د ارومات کړی لری لکه: فنيل الين



۵- سلفر لرونکی امینو اسید: هغه دی چې په خپل ترکیب کې سلفر لري لکه: **Cystine** امینو اسیدونه:

داسې مرکبات وي چې د کاربوکسیل (**-COOH**) او امین ګروپونه لري د انسان د بدن په بیولوژنیکي تعاملاتو کې ډیر ښه رول لري او د پروتین د لاسته راوړلو لپاره لمرني مواد ګڼل کېږي برسیره پدې د قندونو لپاره انزایمونو لپاره او هورمونو لپاره هم لمرني مواد ګڼل شوي دي امینو اسیدونه په طبیعت کې زیات پیدا کېږي او اساسی جز د پروتین دی چې زیاتره پروتین د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي یو شمیر امینو اسیدونه د انسان په عضویت کې په کافی اندازه جوړیږي چې دا نوع امینو اسیدونه د تعویضي امینو اسیدو په نوم سره یادېږي.

او یو بل ګروپ امینو اسیدونه هم شته دی چې د انسان په عضویت کې نه جوړیږي او دا ډول امینو اسیدونه باید د خوراکي موادو په واسطه واخیستل شي چې دا ډول امینو اسیدونه د غیر عضوي امینو اسیدونو په نوم یادېږي . غیردامینو

Glycine یا $CH_2 - NH_2$: څخه نور ټول امینو اسیدونه استمريک کاربن لري او پولرایز شوي

نور منعکسوي چې په نتیجه کې نورې ایزامیرونه جوړولی شي انور په چپ او ښی طرف منعکسولي شي.

ټول هغه امینو اسیدونه چې په ترکیب د پروتین کې شتون ولري یو لرایز شوي نور په چپ او ښی طرف منعکسوي ، هغه امینو اسیدونه چې انتیپوټیک **Antebatic** په ترکیب کې موجود دي د

Dyxtrogyrel په نوم یادېږي . یعنی پولرایز شوي نور په چپ او ښی طرف منعکسوي.

د امینو اسیدونو خواص: الیفاتیکی ، امینو اسیدونه او اروماتیک امینو اسیدونه خواص سره فرق لري.

۱- زیات امینو اسیدونه: په اوبو او عضوي محلولونو کې غیر منحل دي.

۲- تمام امینواسیدونه: امفوتریک خواص لري چې دا خاصیت د کاربوکسیل **-COOH** او امین **-NH2** ګروپونو پورې اړه لري.

۳- امینو اسیدونه: د القلی او عضوي تیزابونو سره تعامل کوي او مالګی جوړوي.

۴- یو د مهمو خواصو د امینو اسیدونو څخه دا هم دي چې په انساني سره اکسیزایز کېږي او په امونیا او کاربن ډای اکساید بدلیږي.

۵- امینو اسیدونو د مس د مالګی سره مخلق **Complex** رنګه مرکب جوړوي.

هغه امینو اسیدونه چې طبی اهمیت لري په لاندې ډول دي

امینولون **Aminolon** $[CH_3-CH_2-CH-COOH]$:
NH₂

سپین رنګه پوډر په شکل پیدا کېږي مخصوص بوی لري ترڅه مزه لري او په **200-205 CO** کې تخریب لري.

امینولین نیوروترفیک **Neurotropic** تاثیرات لري، د ضعف په حالت کې ساتل کېږي د شراينو په


نصاب کې (**Atherosclerosis**) د مغز په اوعیه کې او د وینې د دوران د منحل کېدو مخنيوي

لپاره په مغز کې استعمالیږي د خولې د لارې **250—500mg** ورکول کېږي.

اسید امینو کپرونیک (**Acid Amino Capronic**) $[CH_3-CH_2-CH_2-CH-COOH]$:
NH₂


بی رنگه بلوری شکل لري سپین رنگه لري د ویلی کیدو نقطه **200—206 CO** ده د خونریزی د بندولو لپاره د اسید امینوکیرونیک څخه کار اخیستل کېږي چې **Fibrinolysis** د زیاتیدو په اثر پیدا کېږي درې هدف لپاره استعمالیږي.

فینی بیوتام هایدروکلوراید **Phenybutam Hcl** :




سپین رنگه پودر دي چې د اعصابو ارامونکی خواص لري او په عصبي ناروغيو کې نظر په ضرورت **250-500-750mg** ورکول کېږي.

اسیدگلوتامینیک **Acid Glutaminic** :



خواص: سپین رنگه پودر دي تیزابي خوند لري په سرو اوبو کې لږ حلېږي مگر په گرمو اوبو کې زیات حلېږي په عضوی محل کې نه حلېږي څرنگه چې اسید گلوتامینیک امفوتریک خواص لري نو پدې اساس په تیزابو او القلی کې حلېږي او مالګی جوړوي او د پروتینو مرکباتو په ترکیب کې شامل دي. استعمال: اسید گلوتامینیک د مرکزي عصبي هیاجانا توکی استعمالیږي د استابلیت په ډول د خولې د لاري ورکول کېږي او **1%** د عضلې د لاري ورکول کېږي.


سیستین **(Cystine)** :



سپین رنگه کرسټلی شکل لري او مخصوص بوب لري او مخصوص دورتي **15%** دي **(-9)-(-13)** درجې دی.

استعمال: د سترګو ناروغی په درملنه کې مثلاً **Cataract** په شکل د **2-5%** محلول په ډول ورکول کېږي.

استایل سیستین **(Acetyl systin)** :



خواص:

سپین کرسټونه لري او سپکه ځلا هم تولید وي د ځلا رنگ زیږو ته ورته دي مخصوص بوی لري په **105-110C°** کې ویلی کېږي او دوراني توان یا قدرت یې په سودیم هایدرواکساید کې **(+21)** **(+ 26)** درجې دي.

استعمال

: اسیتایل سیستین د سوخونکی بلغم تاثیرات لري (**Mucolytique**) او د بلغم د منځه وړلو باعث کيږي د تنفس په اسانۍ کې کمک کوي **20%** محلول په عملیاتو کې د تنفس د لارې ورکول کيږي او د تنفس تنگی (**Asthma Broncnie**) د هغې څخه هم کار اخیستل کيږي.


میتونین (METHIONINE):

سپین رنگه پوږ دی چې کرسټلی شکل هم لري نامطلوب بوی لری او لږ خورځوند لري په ترکیب کې یې پروتین او د هڅی په البومین کې پیدا کيږي. میتونین د پروتین د هیدرولیز څخه لاسته راځي.


استعمال: میتونین د ځیگر په ناروغيو کې د خولې د لارې ورکول کيږي او اندازه یې **1gr/day** ده

استرونه (Estres):

استرونه هغه مرکبونه دی چې د الکول او تیزابونو د تعامل څخه لاسته راځي چې سلفوریک اسید **H2So4** پدې تعامل کې د کتالیست په حیث وظیفه تر سره کوي.




مثال:



استرونه په حقیقت کې د عضوی تیزابو یو اتوم هایډروجن په عضوی دا ډیکل (**Alkyl**) عوض شوي وي د اسرو عمومی فورمول (**R-COOR**) شکل نیسی.

په طبابت کې د معدنی تیزابونو استرونه هم کارول کيږي که چیرې دوه مالیکول الکولو څخه اوبه ویستل شي نو استیرونه لاسته راځي.



Ether

هغه دواګانۍ چې په هغې کې کیمیاوي جوړښت د ایتر او یا استر شتون لري عبارت دی له: ایتر اتیلیک دای ایټین هیترامین، نایټرو ګلسرین، مایل نایټریت او نور...

الف: رسمی ایتر **Ether off icinalise**: (**C2H5-O-C2H5**):

اتیراتیلیک په صفت د ایټایل الکولو درې هایډرشین (**Dethydration**) څخه د المونیوم اکساید په موجودیت کې چې المونیوم اکساید پدې تعامل کې د کتالیست په حیث وظیفه ترسره کوي.



لاسته راغلی ایتر پدې طریقه سره لاسته راځي چې د تصفیه کولو په **34-35 Co** کې تقاطع کوي تر څو چې خالص ایتر لاسته راشي.

خواص:


خالص ایتر یو بی رنگه مایع ده په روښانه شعله سره سوځي او د هوا سره د مخلوط کیدو په صورت کې پارچه کيږي یعنی چاودنه کوي په اوبو کې نه حلېږي مګر په عضوی محلول کې حلېږي.

پیژندنه: ایتر معمولاً د فزیکي خواص له مخی پیژندل کیږي پدې ډول چې په اوبو کې نه حلېږی او په عضوی محلل کې لکه بنزین او الکولو کې حلېږي د جوش نقطه یې ټیټه ده (**34-35 Co**) ځکه ایتر هایدرو جن رابطه نشوی جوړولې ایتر بی هوشه کونکی خواص لري ځکه چې د عصبي رشتو شخم منحلوی او کثافت یې **0,715-0,718 g/cm3** ده.

استعمال:

ایتر انتیلیک (**Anastitic**) خواص لري او په موضعی انستیزی کې کارول کیږي. برسیره پردې ایتر (**oli ethyl ether**) د ښه محلل په حیث هم استعمالیږي.


دایفین هیدرامین هایدروکلوراید **:Dither Hydramin. Hcl**



سپین رنګه میده پودر په شکل پیدا کیږي. ترڅه مزه لري بی حس کونکی خواص لري په اوبو، الکول او کلوروفارم کې په اسانۍ حلېږي.

استعمال:

دایفین هیدرامین کلوراید د حساست ضد دوا په حیث استعمالیږي او خوب راوړنکی خواص لري. امایل نایتریت (**Amyl Nitrate**): کیمیاوی فورمول په لاندې ډول دي




امایل نایتریت یوه شفافه مایع ده او الوتونکی خواص لري، زیر روښانه رنګ لري، مخصوص بوی لري او په اوبو کې نه حلېږي په الکولو کلوروفارم او په بنزین کې حلېږي برسیره پردې په اسانۍ سره سوځي او لمبه تولید وي.

استعمال: امایل نایتریت د تشبېح ضد (**Spasolytic**) مادې په حیث او زړه رګونو په پراخوالی کې ښه رول لري معمولاً د زړه د حملې په وخت کې دوه الی دریو ځاڅکي په پنبه یا مالوچو باندې اچول کیږي او په پوزو د ناروغ استعمالیږي.


نایټروګلسرین (**Nitroglycerin**) **C3H5 (NO3)3**

لاسته راوړنۍ: نایټروګلسرین د ګلسرین او بنوري تیزابو د تعامل څخه د لاندې تعامل په اساس لاسته راځي.





خواص: نایتروگلسرین یوه غوره درنه مایع ده کثافت یې په **5Co** کې **1.6gm/cm3** دی شیرینه مزه لري په اوبو کې حلېږي او په عضوی محلول کې منحل دی د فشار او تودوخي لاندې اچوي .

پېژندنه: د نایترو گلسرین د پېژندنې مصرف القلی لکه **KOH** او **NaOH** دی چې د قلوۍ سره د تعامل په وخت کې گلسرین او مربوطه فلز نایتریت جوړوي. مثال: که چیرې نایتروگلسرین د پوتاسیوم هایډرواکساید سره یو ځای کړو په نتیجه کې گلسرین او پوتاشیوم نایتریت د لاندې تعامل په اساس راسته راځي.



CH-OH

پوتاشیوم نایتریت گلسرین پوتاشیوم هایډرو اکساید نایتروگلسرین که چیرې په پورته محصول باندې پوتاشیوم بای سلفیت ور زیات کړو او په **180 CO** کې تودوخه ورکړو نو په هغه صورت کې گلسرین خپلې اوبه د لاسه ورکوي اکرولین لاسته راځي چې اکرولین د خپلې خراب بوی له مخې پېژندل کېږي.



پوتاسیوم بای سلفیت اوبه اکرولین پوتاسیوم بای سلفیت گلسرین استعمال:


نایتروگلسرین د امایل اسیت په شان د نشنچ ضد مادی او د زړه ناروغۍ په درملنه کې استعمالېږي او د زړه په حملو کې د تابیلېت په شکل ورکول کېږي د امایل اسیت په نسبت ډیر تاثیرات لري او ډیرو تاثیر کوي او تاثیر یې نسبت اوږ وخت کې صورت نیسی. د کارب امینو او کارب امایډو مشتقات

Carbamines and Carbamids

پدې برخه کې د یوریتان **Clethane** او هغه زنځیری او حلقوي یوریدونه چې د کاربونیکی اسید مرکبونه او حلقوي یوریدونه چې د کاربونیکی اسید مرکبونه او حلقوي یوریدونه چې د کاربونیکی اسید مرکبونه جوړوي مطالعه کوو. کاربونیکی اسید **H2CO3** د نورو تیزابو په شان کولی شي چې استرونه امایډونه او نور مشتقات جوړ کړي مگر په خپله کاربونیکی اسید په آزاد شکل موجود ندې ځکه چې د

کاربن دای اکساید **CO2** او اوبو **H2O** د مخلوط په شکل سره وي په طبابت کې د کاربونیکی اسیداسترونه ډیر اهمیت لري چې د یوریتان په نوم سره یادېږي او خوب راوړونکي تاثیرات لري هغه ډیره مهمه دوا چې د یوریتان د مشتقاتو څخه شمیرل کېږي او په طبابت کې استعمالېږي د کاربولین سپروبان (**Carbolen sporobate**) په نوم سره یادېږي.


برسیره پردې د کاربو نیک اسیدونه امایډونه چې په طبابت کې خاص رول لري استایل یوریا ده. که چیرې دواړه گروپونه د امین په یوریا کې د دوه کاربوکیسل گروپونو د یو دوه کاربو کیسل تیزاب (مالونیک اسید) نوم سره یو ځای شي حلقوی یورید جوړوي لکه: باربیتوریک اسید **Barbithoric Acid** درې د تیزاب د هایډروجن اتمونه د متلین (**-CH2-**) گروپ یې فعال دی او د مختلفو گروپونو سره عوض کیدلی شي او باربیتورات مشتقات جوړوي چې خوب راوړونکي تاثیرات او د تشوشاتو ر منځه وړلو باعث هم کېږي کیمایوی تعامل یې دا دي:



Barbithoric Acid

کاربوکولین کلوراید (**Carbocholine chloride**) :

د کاربوکولین کلوراید مشرح فورمول دا دي:




خواص

رنګه پوډر دي کرسټلی شکل لري سپک بوی لري په اوبو کې په اسانۍ سره حلېږي مګر په الکولو کې په سختۍ سره. سپین حلېږي خو په ایتري او کلوروفارم کې غیر منحل دي. استعمال: کاربو کولین د وینې فشار په ټیټولو کې ښه رول لري یو ثابت مرکب دی او محلول یې د تودوخې په اثر نه تخریب کېږي. د معدې په تیزاب (**HCl**) باندې کوم تاثیر نلري نو سبب یې دا دي چې د تابلیت ، پوډر او د پوستکي لاندې زرق کېږي چې **0,1** فیصدی محلول څخه یې کار اخیستل کېږي.

میپروبامات Meprobamate

د میپروبامات ساختمانی یا مشرح فورمول دا دي:



خواص:

سپین پوډر په شان کرسټلی شکل لري بوی یې مخصوص خوند لري په ایتري **Ether** کې او اوبو کې لږ حلېږي مګر په الکولو کې **95%** حلېږي او په امیتون کې هم حلېږي. پیژندنه: میپروبامات د نورو یوریتانو په شان دالقلې په واسطه تخریب کېږي، امونیا آزادوي اود خپل مخصوص بوی له مخې پیژندل کېږي. استعمال

: میپروبامات د فارماکولوژي تاثیراتو له مخې د ارامونکي دوا په گروپ کې شامل دی او د ارامونکي یعنی خوب راوړونکي دوا په صفت استعمالېږي (**C.N.S**) د عصبی ناروغیو په درملنه کې کارول کېږي.

د طبي کيميا د و همه برخه

سريزه

په دوهمه برخه د طبي کيميا کې هيترو سايکليک مر کبونه اود هغوي طبي اهميت ، دانسان په بدن کې د اسيدونو رول ، بفر محلول اود هغي اهميت دانسان بدن کې ، د منرالونو ميتابوليزم ، کاربو هايډریتونه او طبي اهمت يې د قند ونوميټا بوليزم ، امينواسيد ، پروتين اود انسان بدن کې د هغي رول . لپيد (شحم) اود هغي طبي اهميت ، نکلويک اسيدونه او طبي اهميت يی .

د PH بفر اسيد او القلي توازن (PH Buffers and Acid - Base) (balance)

اسيد او قلوي موازنه د عضويت د هموستاسيس (ثابت حالت) ساتلو لپاره ډير ضروري دي او همدارنگه ټول فزيالوژيکي فعاليتونه د عضويت د اسيد او القلي سويي پورې اړه لري ، اسيد په ثابت توگه په عضويت کې توليد يږي او هر کله چې د اسيدو توليد د قلوي د توليد په واسطه بلاانس شي نو د عضويت اسيد او القلي توازن را منځ ته کيږي ،

الف: اسيد پروتون (H) ورکونکي خاصيت لري او ويلي شو تيزاب هغه مواد دي چې هايډروجن ايون توليد وي لکه هايډروکلوريک اسيد ، سلفوريک اسيد و فاسفوريک اسيد اونور .

ب: القلي پروتون اخستونکي خاصيت لري او يا ويلي شو هغه مواد دي چې د هايډروکسيل (OH-) ايون توليد وي لکه امونيا ، سديم هايډراکسايډ ، پوتاشيم تيډرو اکسايډ ، کلسيم هايډرو اکسايډ او نور .

د هايډروجن ايون يواځې پروتون لري او د هايډروجن ډير کم مقدار په عضويت باندې ډير زيات تاثير لري په عضوين کې د هايډروجن نور مال غلظت ۳۸-۴۲ مانو متر (nm) دی .

څرنگه چې د هايډروجن غلظت په بدن کې خاص اهميت لري نو په دې اساس د PH په برخه کې معلومات ضروري نو هغه بايد وڅيړو .

پي اچ (PH) Potential of Hydrogen

د هايډروجن د ايون غلظت د پيدا کولو يوه بله لاره ده او هغه د PH په نوم سره تر بحث لاندې نيسو .


تعريف: د هايډروجن ايون غلظت په يو ليتر محلول کې د PH په نوم سره ياد يږي .

$$PH = - \log [H]$$

د انسان د بدن بنسټیز اسیدونه

د انسان بدن بنسټیز اسیدونه عبارت دي له هایدرو کلوریک اسید (HCl) ، کار بونیک اسید (H_2CO_3) او منرال اسیدونه لکه فاسفورژیک سید او سلفوریک اسید .

کار بونیک اسید د کاربن دای اکساید او اوبو د یوځای کید و څخه جوړیږي.



نو ویلي شو چې کار بن دای اکساید تیزابي خواص لري اود اسید انهایدرايد په نوم سره هم یادېږي .

د بدن عضوي تیزابونه لکه بايروئیک اسید ، لکتیک اتسید ، اکډالو دسیتیک اسید ، مالیک اسید او ستريک اسید دي .

د تیزاب قوت د د هایدرو جن ایون د غلظت پورې اړه لري په هره اندازه چې یو تیزاب د هایدرو جن ایون په زیات غلظت سره تولید کړي په هغه اندازه قوي تیزاب بلل کیږي .

د انسان بدن بنسټیز قلیات

د انسان د بده بنسټیز قلیات عبارت دي له :

- باي کاربو نیټ (HCO_3)

- هیمو گلو بین (Hb)

- اکسي هیمو گلوبین (HbO_2)

- پرو تینونه

- فاسفیټ (HPO_4)

- دعضویت د اسیدونو انیو نونه لکه دپایرو ئیت ، لکتیت او ستريت

قوي اسیدونه د ضعیف القلي سره هغه مر کبونه دي که په اوبو کې حل شي د هایدرو جن ایون تو لیدوي نو قوي اسید ونه ضعیف القلي لري ، ضعیف اسیدونه په مکمل ډول سره د هایدرو جن په ایونو نه بد لیږي یعني د ضعیف اسید سره قوي القلي شتول لري .

PH چې د هایدروجن ایونو د منفي لوگاریتم څخه عبارت دی .

- $PH = 7$ محیط خنثا دی

- $PH < 7$ محیط تیزابي دي

- $PH > 7$ محیط القلي دي $H + Hb \rightarrow H.Hb$

دې اکسي هيموگلوبين څخه کار بن دای اکساید د بفر په ساتلو کط دیر اغیز من دی .


- په سږو کې معکوس تعامل تر سره کېږي او په دې ډول د بدن څخه کاربن دای اکساید اطراح کېږي .

د اسید و نو په وړاندې د بفر محلولو نو عمل

- د $\text{HCO}_3\text{H}_2\text{CO}_3$ بفر سیستم د فیکسید اسیدونو په وړاندې یو مهم رول او د دفاعي کرښې عمل تر سره کوي .

- هایدرو کلوریک اسید یو اساسي تیزاب دی

- هایدرو کلوریک اسید په لاندې سیستم سره په بفر بد لیري



- په دې ترتیب هایدرو کلوریک اسید چې یو قوي اسید دی په ضعیف تیزاب د کار بو نیک او کار بو نیک اسید په کاربن داي اکساید او اوبو بدلیږي
- کار بن داي اکساید د تنفسي سیستم له لارې اطراح کېږي .

تنفسي سیستم

- PH په بدلون سره د تنفس پراخوالي هم تغیر کوي
- د کاربن داي اکساید په زیاتید و سره تنفس زیا تیږي په دې ډول سره چې د کاربن داي اکساید د بدن څخه ازادیږي او د وینې PH نور مال ساتل کېږي .

اسیدو سیس (Acidosis)

- د بدن په مایعاتو کې په غیر نورمال ډول سره د اسیدونو زیا تیدل دي چې په لاندې لارو تنظیمیږي .
- د تنفس ریټ او ژور والي زیاتیږي ، کاربن دای اکساید په انساجو کې تولیږي او په پایله کې د H_2CO_3 جوړیدل زیا تیږی .

- $\text{HCO}_3\text{H}_2\text{CO}_3$ نسبت کښته کېږي په پایله کې PH کښته ځي اود وینې PH نور مال حد ته راگرځي .

بولي تناسلي سيستم (Urogenital system)

پښتورگي د وينې PH په لاندې ډول سره تنظيموي .

الف: د HCO_3 بيرته جذ بيدل

- په نورمال ډول سره د پښتورگو گلو ميروول په وسيله HCO_3 سل په سلو کې بيرته جذ بيري .
- په اسيدوزيس کې د HCO_3 جذ بيدل زياتيري او دباي کاربونيت اطراح کميري چې په دې ډول سره د وينې PH لوړوالي ته ميلان پيدا کوي .
- په الکلو زيس کې د HCO_3 بيرته جذ بيدل کميري او اطراح يي زياتيري . چې په دې ډول سره د وينې PH کښته کيدو ته ميلان پيدا کوي .

د تشو ميتازو اسيدي فيکيشن (Acidification)

- $\text{HPO}_4 \backslash \text{H}_2\text{PO}_4$ نسبت چې 10:1 دی به نور مال حالت کې د تشو ميتازو PH تنظيموي .
- په اسيدوزيس زيات مقدار رفاسفيت د H_2PO_4 په شکل د ځاند سره د هايډروجن ايون هم خارجوي . د دې لامل کيري چې د تشو ميتازو PH نور مال بيرته لوړوي .
- په الکلو زيس کې نموري پرو سه سر چپه کيري .

د امونيا (NH_3) جوړيدل

- په اسيدوزيس کې د امونيا جوړيدل ډير زياتيري . داچې د هايډروجن ايون بفر کوي او په دې ډول په NH_4 باندې بد ليري او په تشو ميتازو کې د بدن څخه وزي .
- په الکلو زيس کې د NH_3 جوړيدل ډير کميري .

د هايډروجن (H) اطراح د يو ازاد اسيد په شکل

- په کيتو اسيدونو کې په زياته اندازه اسيد ونه جوړيږي لکه اسيتو اسيتيک اسيد ، بيتا هايډروکسي بيو تاريک اسيد .
- د ا کيتون بادي دهايډروجن ايون سره يو ځاي کيږي او تيزاب دجوړوی .
- په دې لاره سره د هيډروجن ايون نونه د بدن څخه خارجيږي . اسيدوزيس بيته نور مال ذحالت را گر زوی .
- د پوتشيم او هايډروجن ايونو تبا د له د سوديم سره .
- په اسيدوزيس کې د پښتورگو په ديسټل ټيو بو لونو کې د سوديم سره د تبا دلی لباره موجود وي په دې ډول سره د پو تاشيم ايون په بدن کې پا تي کيږی .

- په الكوليزس کې د هايډرو جن ايون د پښتور گو په Distal يو بو لونو کې لږ وي په پايله کې د سوديم او هايډرو جن تر منځ تبادله نه وي او په تشو ميتا زو کې د پوتاشيم اطراح زياتيږي .

اسيد وزيښ

۱: ميتا بوليک اسيدوزيس

- تنفسي اسيدوزيس
- ميتا بوليک اسيدوزيس
- ميتا بوليک اسيدوزيس د بدن په مايعاتو کې د فيکسيډ اسيدونو د تلید له کبله له منځه ځي.
- د پلا زما د HCO_3 کچه را کښته کيږي . دا له دې کبله چې نو موري په بفر کې له منځه ځي .
- په اسيدوزيس کې تنفس تنبه او په پايله کې P CO_2 ښکته ځي .
- په تشو ميتازو کې په زياته اندازه هايډرو جن ايون په امونيوم ايون په ښکل اطراح کيږي .

لاملونه

- د ې هايډريشن د نس ناستي ، د بدن څخه د صفرا د پنکراس عصاري ضايع کيدل چې لدی سره د بدن څخه د باي کابو نيټ ضيع کيدل تر سره کيږي .
- ها بيو کسيا چې د ځينو تنسي ناروغيو سبب کيږي او په زياته اندازه د لکتیک اسيد د توليد سبب کيږي چې پدې اندازه سره په زياته نداخه سره لکتیک اسيد تو ليږي
- د نا کنترول شوي شکرې نارو غي په زياته انزه سره کنيون با ېي چوروي
- په دې حالت کې د هايډرو جن د کنترول نيمگر تيا موجود وي

در ملنه

- که شونې وي دلامل در ملنه دې وشي
- د خولي يا وريد دلاري دې HCO_3 ور کرل شي
- تنفسي اسيدوزيس
- د PCO_2 او H_2CO_3 زياتوالي منځ ته راځي
- دا يو بيري حالت دی
- څرنگه چې په معالجوي ډول سره هايډروجن (کاربو نيک اسيد) د جذب لباره په مصرف رسيږي او په پايله کې د پلرما د اسيد (HCO_3) سويه زيا تيږي

- د سودیم تبادلہ د کلوراید په ایون .
- په پلازما کې د کلوراید ایون کموالی د پلازما د HCO_3 زیاتوالي باعث کیږي .
- پدې ډول سره تنفسي اسیدو زیس په کمه اندازه د میتا بولیک الو لوزیس سره ور ته وي

لاملونه

کیدای شي د تنفسي لارې بند ش ، تنفسي نارو غي ، د اسکلیتي عضلاتو کمزوري ، انسټیزیا (بیهوشي) اونور .

- د سږو دیوي برخي اوهیي خرابوالي اوپه نمونیا کې د PCO_2 زیاتوالي منځ ته راځي .

درملنه

- که د ناروغ تنفسي لار خلاصه وي ناروغ ته دي اکسیجن تقبیق شي .
- مصنوعي تنفس اجرا شي
- د تنفس مرکز تنبه کونکي درملونه دي تطبیق شی .

الکلوزیس (Alklosis)

: میتابولیک الکلوزیس

۲: تنفسي الکلوزیس

الف : میتابولیک الکلوزیس

- دا په پلازما کېد بای کاربونیټ د تولید اود پلازما څخه د هایدرو جن ایون د ضایع کیدو له امله منځته راځي .
- نموري عمل تنفس نهی کوي اود PCO_2 د کموالی لامل کیږي.
- د PCO_2 کموالي رپه تیو بولر حجرو کې د هایدروجن ایون د زیاتوالي لامل کیږي
- د هایدروجن ایون د بای کاربونیټ په بیرته جذ بیدو کې په مصرف رسیږي
- د Na-H د تبا دلي کموالي له کبله په تشو میتازو کې د سودیم اطراح کمیږي
- د هایدروجن ایون د کموالی له کبله په تشو میتازو کې زیات مقدار د پو تاشیم ایون ضایع کیږي
- په وینه کې د سودیم کموالي (Hyponatremia) د سودسم د زیت جذ بیدو لپاره یو تنبه ده او په همدې ترتیب سره په تشو میتازو کې د هایدرو جن ایون اطراح کیږي

- داچې دهايډروجن ايون پا الكلوزييس كې زيات ضايع كيږي په همغه اندازه الكلوزييس نور هم تشد يد كيږي.

لا ملونه

- دهايډرو كلوريك اسيد ضايع كيدل اود كانگو او كاسترك جوس ويستل
- د ډيو ر يتيكونو تطبيق په ځانگړي ډول سره Thiazide ډيوريتيک چې د پشتورگو دلاري د پوتاشيم او كلورايد ايون د ضيايع لامل كيږي اد دې سره يو ځاي په تشو ميتازو كې دهايډروجن ايون ضايع كيوي اود تشو ميتازو PH كبنته ځي .
- د پوتشيم كمبنت په تشو ميتازو كې په پايله كې د هايډرو جن اطراح زياتوي
- د ادر ينال ستر ايدونو تطبيق لكه
- د سودييم ستر يت تطبيق لكه د وينې ترانسفيو زن څخه وروسته

د رملنه

- د اسبابو در ملنه ورشي
- كه الكلوزييس د بوتاشيم او يا كلورايد اينو له كبله ږي نو پو تا شيم كلورايد بايد تطبيق شي .

ب: تنفسي الكلوزييس

- PCO_2 د او H_2CO_3 د كموالي له كبله د وينې PH زيا تيږي
- د وينيليشن زياتوالي (دتنفس ريټ او عمق زياتوالي) چې په پايله كې PCO_2 كميري
- د پښتور گو په تيو بيو لر برخه كې د هايډرو جن ايون كموالي ، د دې سبب كيږي چې د باي کاربو نيټ بيرته جذ بيدل را كم كړي او په دې ډول سره د وينې د PH د ښكته كيدو لامل كيږي
- د پښتور گو په تيو بو لر برخه كې د سودييم سره د تبادلې لپاره د هايډرو جن ايون شتون نلری په پايله كې د كلورايد ايون بيرته جذب زيا تيږي او د پو تاشيم اطراح كميري
- پور تني فكتورونه د پلزما د باي کاربونيټ د كموالي او كلورايد اون د زياتوالي او پو تاشيم ايون د كموالي سبب كيږي .

لاملونه

- د ځيگر په عدم كفايه كې چې هايپر امو نيميا مينځ ته راځي
- د مر كزي عصبي سيستم تروما
- مصنوعي تنفس هم د هايپر وينيليشن لامل كيږي
- تبه

درملنه








- د الكلو زيس شدت پورې اړه لري
 - خفيفې پيښې درملنې ته اړتيا لري
 - هايپر وينيليشن پيښې ځنې وخت په ښځو كې منځ ته راځي راني ستونځو له امله نارو غانو ته سايكو ترا پي اړينه ده
 - شديد تنفسي الكلو زيس خراب را تلونكي لري
- د اسيدوزيس او الكلو زيس لنډيز په لاندې جدول كې ښودل شوي دي.

معا و ضوي اغزه	Primriy defecit	Hydrogen ion	PH	حالت
Low pco2	LOW PCO2	1	1	ميټابوليک اسيدو زيس
High p co2	High HCO3	1	1	ميټا بوليک الكلو زيس
High HCO3	High pco2	1	1	تنفسي اسيد و زيس
LOW HCO3	LOW PCO2	1	1	تنفسي الكلو زيس

هيترو سايکليک مرکبونه (Hetro cyclic Compound)

هغه مرکبونه دي چې په کري کې غیر د کار بن څخه نور عناصر لکه اکسیجن ، سلفر ، نایټروجن ، افسفورس او نور ولري ځنې هيترو سايکليک مرکبونه پلانډي ډول سره دي په دې ډول چې اکثره هيترو مرکبات طبي اهميت لري.

څرنگه چې د هیتروسکلیک مرکبات د پخوا زمانې نه معلوم وو او د کیمیا پوهانو ورسره دلچسپی درلوده نو له همدې سببه د هیتروسکلیک ډیر مرکبات مروج نومونه لري چې ځینی یې د مثال په توګه ذکر کېږي.



د هیتروسکلیک مرکباتو سیستماتیک نوم ایښودنه د هیترو اتومو په نظر کې نیولو سره د هغوی د حلقو د شمیر او د مشبوعیت د درجې پر اساس ترسره کېږي.

1.4.12. یوه حلقه یې (مونوسکلیک) هیتروسکلیک:

د مونوسکلیک حلقو د نوم ایښودنې لپاره ضروری ده چې د حلقې غټوالی او د غیر مشبوعیت درجه، د هیترو اتومو شمیر، ډولونه او د هغوی ځای (موقعیت) په حلقه کې په نظر کې ونیول شي. د مونوسکلیک حلقو د نومولو لپاره د لاندې قاعدو څخه ګټه اخیستل کېږي:

- 1- د 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 او 10 ضلعی حلقو غټوالی په ترتیب سره د on, oc, ep, in, ol, et, ir او ec حروفو په واسطه ښودل کېږي.
- 2- د مختلفو هیترو اتومو لکه اکسیجن، سلفر او نایتروجن موجودیت په حلقه کې په ترتیب سره د thia, oxa او aza مختاری (پیشاوند) په واسطه ښودل کېږي. د dithia, dioxa او diaza مختاری په ترتیب سره د دوو اتومو اکسیجن، سلفر او نایتروجن موجودیت په حلقه کې ښایي. که چیرې په حلقه کې دوه او یا زیات هیترو اتومونه وجود ولری نو اکسیجن د

سلفر نه د مخه او سلفر د نایتروجن نا د مخه ذکر کیږي د مثال په توګه د oxaza مختاړی (پیشاوند) په واسطه د یوه اتوم اکسیجن او یوه اتوم نایتروجن موجودیت په حلقه کې او د thiaza مختاړی په واسطه د یوه اتوم سلفر او یوه اتوم نایتروجن موجودیت په حلقه کې ښودل کیږي.

(1.12) جدول: د ځینو عناصرو سمبول او مختاړی:

مختاړی Prefix	عنصر Element
Oxa	O
Thia	S
Aza	N
Selena	Se
Tellura	Te
Sila	Si
Phosphora	P
Arsa	As
Stiba	Sb
Bisma	Bi

3- د حلقې د غیر مشبوعیت درجه په عمومي ډول د وروستاړی (پساوند) په واسطه تعیینېږي په (2.12) جدول کې د حلقې د غیر مشبوعیت درجه، د حلقې غټوالی او د مختلفو هیټرو اتومو موجودیت په حلقه کې په ښه ډول ښودل شوی دی. لکه څنګه چې له جدول څخه معلومېږي وروستاړی (پساوند) د نایتروجن په موجودیت او نه موجودیت کې لږ څه توپیر کوي.

(2.12) جدول:

د حلقې غټوالی (د حلقې د اضلاعو شمیر)	نایتروجن لرونکي حلقې		نایتروجن نلرونکي حلقې	
	غیر مشبوع	مشبوع	غیر مشبوع	مشبوع
3	-irine	-iridine	-irene	-irane
4	-ete	-etidine	-ete	-etane
5	-ole	-olidine	-ole	-olane
6	-ine	a	-in	-ane

- د الكلو زيس شدت پورې اړه لري
- خفیفې پېښې در ملنې ته اړتیا لري
- هایپر وینیلیشن پېښې ځنې وخت په ښځو کې منځ ته راځي رانې ستونځو له امله نارو غانو ته سایکو ترا پي اړینه ده
- شدید تنفسي الکلو زيس خراب را تلونکي لري

د اسیدوزيس او الکلو زيس لنډيز په لاندې جدول کې ښودل شوي دي

حالت	PH	Hydrogen ion	Primriy defecit	معا و ضوي اغزه
میتابولیک اسیدوزيس	1	1	LOW PCO2	Low pco2
میتا بولیک الکلو زيس	1	1	High HCO3	High p co2
تنفسي اسید و زيس	1	1	High pco2	High HCO3
تنفسي الکلو زيس	1	1	LOW PCO2	LOW HCO3

- د الكلو زيس شدت پورې اړه لري
- خفیفې پېښې در ملنې ته اړتیا لري
- هایپر وینیلیشن پېښې ځنې وخت په ښځو کې منځ ته راځي رانې ستونځو له امله نارو غانو ته سایکو ترا پي اړینه ده
- شدید تنفسي الکلو زيس خراب را تلونکي لري

د اسیدوزيس او الکلو زيس لنډيز په لاندې جدول کې ښودل شوي دي

حالت	PH	Hydrogen ion	Primriy defecit	معا و ضوي اغزه
میتابولیک اسیدوزيس	1	1	LOW PCO2	Low pco2
میتا بولیک الکلو زيس	1	1	High HCO3	High p co2
تنفسي اسید و زيس	1	1	High pco2	High HCO3
تنفسي الکلو زيس	1	1	LOW PCO2	LOW HCO3

- د الكلو زيس شدت پورې اړه لري
- خفیفې پېښې در ملنې ته اړتیا لري
- هایپر وینیلیشن پېښې ځنې وخت په ښځو کې منځ ته راځي رانې ستونځو له امله نارو غانو ته سایکو ترا پي اړینه ده
- شدید تنفسي الکلو زيس خراب را تلونکي لري

د اسیدوزيس او الکلو زيس لنډيز په لاندې جدول کې ښودل شوي دي

حالت	PH	Hydrogen ion	Primriy defecit	معا و ضوي اغزه
میتابولیک اسیدوزيس	1	1	LOW PCO2	Low pco2
میتا بولیک الکلو زيس	1	1	High HCO3	High p co2
تنفسي اسید و زيس	1	1	High pco2	High HCO3
تنفسي الکلو زيس	1	1	LOW PCO2	LOW HCO3

- د الكلو زيس شدت پورې اړه لري
- خفیفې پېښې در ملنې ته اړتیا لري
- هایپر وینیلیشن پېښې ځنې وخت په ښځو کې منځ ته راځي رانې ستونځو له امله نارو غانو ته سایکو ترا پي اړینه ده
- شدید تنفسي الکلو زيس خراب را تلونکي لري

د اسیدوزيس او الکلو زيس لنډيز په لاندې جدول کې ښودل شوي دي

حالت	PH	Hydrogen ion	Primriy defecit	معا و ضوي اغزه
میتابولیک اسیدوزيس	1	1	LOW PCO2	Low pco2
میتا بولیک الکلو زيس	1	1	High HCO3	High p co2

High HCO ₃	High pco ₂	1	1	تنفسي اسيد و زيس
LOW HCO ₃	LOW PCO ₂	1	1	تنفسي الكلو زيس

- ها پيو كسيا چي د خينو تنسي ناروغيو سبب كيږي او په زياته اندازه د لكتيك اسيد د توليد سبب كيږيچي پدې اندازه سره په زياته ندائخه سره لكتيك اسيد تو ليږي
- د نا كنترول شوي شكري نارو غي په زياته انزه سره كتيون با ډي چوروي
- په دې حالت كې د هايډرو جن د كنترول نيمگر تيا موجود وي

در ملنه

- كه شونې وي دلامل در ملنه دې وشي
- د خولي يا وريد دلاري دې HCO₃ وړ كړل شي
- تنفسي اسيدو زيس
- د PCO₂ او H₂CO₃ زياتوالي منخ ته راځي
- دا يو بېرني حالت دی
- څرنگه چي په معالجوي ډول سره هايډروجن (كاربو نيك اسيد) د جذب لباره په مصرف رسيږي او په پايله كې د پلزما د اسيد (HCO₃) سويه زيا تيږي
- د سوديم تبادله د كلورايد په ايون .
- په پلازما كې د كلورايد ايون كموالی د پلازما د HCO₃ زياتوالي باعث كيږي .
- پدې ډول سره تنفسي اسيدو زيس په كمه اندازه د ميتا بوليک الو لوزيس سره وړ ته وي

لاملونه

كيداي شي د تنفسي لاري بند ش ، تنفسي نارو غي ، د اسكليتي عضلاتو كمزوري ، انسټيزيا (بيهوشي) اونور .

- د سږو ديوي برخي او هبي خرابوالي او په نمونيا كې د PCO₂ زياتوالي منخ ته راځي .

درملنه

- كه د ناروغ تنفسي لار خلاصه وي ناروغ ته دي اكسيجن تقبيق شي .
- مصنوعي تنفس اجرا شي

- د تنفس مرکز تنبه کونکي در ملونه دي تطبيق شي .

الکلوزيس (Alklosis)

: ميتابوليک الکلوزيس

۲: تنفسي الکلوزيس







الف : ميتابوليک الکلوزيس

- دا په پلازما کېد بای کاربونيټ د توليد اود پلازما څخه د هايډرو جن ايون د ضايع کيدو له امله منځته راځي .


7	-epine	a	-epin	-epane
8	-ocine	a	-ocin	-ocane
9	-onine	a	-onin	-onane
10	-ecine	a	-ecin	-ecane

(a) د "Perhydro" مختاری د غیر مشبوع مرکب نام سره اضافه کیږي.


4- د هیتروسکلیک حلقې شمیرنه (نمبرگذاری) د هیترو اتوم څخه شروع کیږي او پدې ډول دوام کوي چې معوضي (یا نوره هیترو اتومونه) کوچنۍ عدد اختیار کړي. که چیرې په یوه حلقه کې څو ډوله هیترو اتومونه موجود وي نو اکسیجن د سلفر په پرتله او سلفر د نایتروجن په پرتله کوچنۍ عدد نیسي د مثال په توګه:




5- هیتروسکلیک مرکبات چې قسمي او یا کامل هایډروجنیشن شوی وي د هغې د غیر مشبوع مرکباتو د "dihydro" او یا "tetrahydro" اودغسې نورو مشتقاتو په نوم یادېږي. همدارنګه د هیتروسکلیک مرکباتو مشبوع شوي حالت د 1H، 2H او دغسې نورو په څیر ښودل کیږي د مثال په توګه:




(2,3- Dihydrazole)



(2,5- Dihydroxole)



(2H-oxine, alfa-pyran)









3H-1,2-Diazole

که چیرې دوه غږ لرونکي (واول) حروف د هیتروسکلیک مرکب په نوم کې څنګ پر څنګ راشي نو د مختاری (پیشاوند) اخیری "a" له منځه وړل کیږي د مثال په توګه د مرکب نوم باید aziridine وي، لیکن څرنگه چې د aza مختاری اخیری "a" له منځه وړل کیږي نو د مرکب صحیح نوم aziridine دی ځینی نور مثالونه یې په لاندې ډول دي





7	-epine	a	-epin	-epane
8	-ocine	a	-ocin	-ocane
9	-onine	a	-onin	-onane
10	-ecine	a	-ecin	-ecane

(a) د "Perhydro" مختاړی د غیر مشبوع مرکب نام سره اضافه کیږي.

4- د هیتروسکلیک حلقې شمیرنه (نمبرگذاری) د هیترو اتوم څخه شروع کیږي او پدې ډول دوام کوي چې معوضې (یا نوره هیترو اتومونه) کوچنۍ عدد اختیار کړي. که چیرې په یوه حلقه کې څو ډوله هیترو اتومونه موجود وي نو اکسیجن د سلفر په پرتله او سلفر د نایتروجن په پرتله کوچنۍ عدد نیسي د مثال په توګه:



5- هیتروسکلیک مرکبات چې قسمي او یا کامل هایډروجنیشن شوي وي د هغې د غیر مشبوع مرکباتو د "dihydro" او یا "tetrahydro" اودغسې نورو مشتقاتو په نوم یادېږي. همدارنګه د هیتروسکلیک مرکباتو مشبوع شوي حالت د 1H، 2H او دغسې نورو په څیر ښودل کیږي د مثال په توګه:



که چیرې دوه غږ لرونکي (واول) حروف د هیتروسکلیک مرکب په نوم کې څنګ پر څنګ راشي نو د مختاړې (پیشاوند) اخیری "a" له منځه وړل کیږي د مثال په توګه د  مرکب نوم باید azairidine وي، لیکن څرنگه چې د aza مختاړې اخیری "a" له منځه وړل کیږي نو د مرکب صحیح نوم aziridine دی، ځینی نور مثالونه یې په لاندې ډول دي

- ها ښو کسيا چي د ځينو تنسي ناروغيو سبب کيږي او په زياته اندازه د لکتیک اسيد د توليد سبب کيږي چي پدې اندازه سره په زياته نډاخه سره لکتیک اسيد تو ليري
- د نا کنترول شوي شکرې نارو غي په زياته انزه سره کتيون با ډي چوروي
- په دې حالت کې د هايډرو جن د کنترول نيمگر تيا موجود وي

در ملنه

- که شونې وي دلامل در ملنه دې وشي
- د خولي يا وريد دلارې دې HCO_3 ور کرل شي
- تنفسي اسيدو زيس
- د PCO_2 او H_2CO_3 زياتوالي منځ ته راځي
- دا يو بيري حالت دی
- څرنگه چي په معالجوي ډول سره هايډروجن (کاربو نیک اسيد) د جذب لباره په مصرف رسيږي او په پايله کې د پلزما د اسيد (HCO_3) سويه زيا تيږي
- د سوديم تبادلې د کلورايد په ايون .
- په پلازما کې د کلورايد ايون کموالی د پلازما د HCO_3 زياتوالي باعث کيږي .
- پدې ډول سره تنفسي اسيدو زيس په کمه اندازه د ميتا بوليک الو لوزيس سره ور ته وي

لاملونه

- کيداي شي د تنفسي لارې بند ش ، تنفسي نارو غي ، د اسکليتي عضلاتو کمزوري ، انسټيزيا (بيهوشي) اونور .
- د سږو ديوي برخې او هيبي خرابوالي او په نمونيا کې د PCO_2 زياتوالي منځ ته راځي .

درملنه

- که د ناروغ تنفسي لار خلاصه وي ناروغ ته دي اکسيجن تقبيق شي .
- مصنوعي تنفس اجرا شي
- د تنفس مرکز تنبه کونکي در ملونه دې تطبيق شي .

الكلوزيس (Alklosis)

: ميتابوليك الكلوزيس

٢: تنفسي الكلوزيس

الف : ميتابوليك الكلوزيس


- دا په پلازما کېد بای کاربونیټ د تولید اود پلازما څخه د هایډرو جن ایون د ضایع کیدو له امله منځته راځي .




Oxetan



Thietan



Pyrrol



Pyrrolidin



Furan



Tetrahydro-
furan



Thiophen



Imidazol
(1,3-Diazol)



Oxepin




Oxepan




Thiepin



Thiepan



1H-Azepin




Azepan

هغه حلقوی مرکبات چې د هغوی په حلقه کې دیوه ساختمانی جز په توګه پر کاربن سربیره یو هیترو اتوم او یا څو هیترو اتومونه موجود وي، هیتروسکلیک مرکبات شمیرل کېږي. په عمومي توګه هغه هیترو اتومونه یعنې د کاربن څخه بې غیر بیګانه اتومونه چې په حلقه کې وجود لري نایتروجن، اکسیجن او سلفر دي. ځینی وختونه په حلقوی جوړښت کې د هیترو اتوم په توګه P، Si، As او Se هم برخه لري. د هیتروسکلیک په مرکباتو کې کیدای شي یو هیترو اتوم او یا څو یوشان (همنوع) او یا څو رقمه (مختلف النوع) هیترو اتومونه وجود ولري.

هیتروارومات (Heteroaromaten)


13. سریزه :







زیاتره پنځه او شپږ ضلعی هیتروارومات د فورمول له لحاظه د Cyclopentadienid (Anion) او بنزین څخه سرچینه اخلي. د Methin د کاربن پرځای زیاتره نایتروجن، اکسیجن او سلفر ځای نیسي د مثال په توګه:



دیوه حلقه یې هیترواروماتو لپاره زیاتره معمولی نومونه (Trivialnamen) پکاروړل کېږي چې اکثره د دغه مرکباتو د طبیعي پیدایښت سره رابطه لري. په سیستماتیکي ډول پنځه ضلعی هیتروارومات چې یو نایتروجن او یو بل هیترواتوم ولري د ازول (Azole) او شپږ ضلعی هیتروارومات چې یو نایتروجن او یو بل هیترواتوم ولري د ازين (Azine) په نوم یادېږي. د ځینو یوه حلقه هیترواروماتو نومونه په لاندې ډول دي:


(a) پنځه ضلعی چې یو د هیترواتوم (بیګانه اتوم یعنې د کاربن څخه بې غیر اتوم) ولري:





هغه حلقوی مرکبات چې د هغوی په حلقه کې دیوه ساختمانی جز په توګه پر کاربن سربیره یو هیترو اتوم او یا څو هیترو اتومونه موجود وی، هیتروسکلیک مرکبات شمیرل کېږي. په عمومي توګه هغه هیترو اتومونه یعنې د کاربن څخه بې غیر بیګانه اتومونه چې په حلقه کې وجود لری نایتروجن، اکسیجن او سلفر دي. ځینی وختونه په حلقوی جوړښت کې د هیترو اتوم په توګه P، Si، As او Se هم برخه لری. د هیتروسکلیک په مرکباتو کې کیدای شی یو هیترو اتوم او یا څو یوشان (همنوع) او یا څو رقمه (مختلف النوع) هیترو اتومونه وجود ولری.

د يوه څخه زيات د هيترو اتومونه




Pyrazol
(1,2-Diazol)



Isoxazol



Isothiazol



Imidazol
(1,3-Diazol)




Oxazol



Thiazol



Selenazol




1,2,4-Triazol




1,2,4-Oxadiazol



1,2,4-Thiadiazol




Tetrazol



Pentazol

(b) شپړ ضلعي چې يو د هيترو اتوم لري



Pyridin



Phosphabenzol



Pyrylium Ion



Thiapyrylium Ion


شپړ ضلعي چې د نايټروجن زيات اتومونه ولري (Azine):



Pyridazin
(1,2-Diazin)



Pyrimidin
(1,3-Diazin)



Pyrazin
(1,4-Diazin)



1,2,3-Triazin



1,2,4-Triazin



1,3,5-Triazin



1,2,3,4-Tetrazin




1,2,3,5-Tetrazin




1,2,4,5-Tetrazin


1.13. د بنزین پر حلقې وصل هیتروارومات: ددغه سلسلې په مرکباتو کې د هیتروارومات حلقه د بنزین د حلقې سره وصل وي او د (Benzologe) په نوم هم یادېږي او زیاتره یې معمولی نومونه لري کوم مرکبات چې معمولی نوم نلري نو پدې حالت کې د اساسی هیتروارومات (stammheterocyclus) او د بنزین د حلقې ترمنځ وصل کوونکی اړیکه چې د هیتروارومات اولي موقعیت ته نږدې وي په قوس کې لیکل کېږي د مثال په توګه:




Indol
Benzo[b]pyrrol




Cumaron
Benzo[b]furan




Thionaphthen
Benzo[b]thiophen




Carbazol (Dibenzopyrrol)




Dibenzofuran




Dibenzothiophen




Isoquinoline




Benzo[g]isoquinoline
(2-Aza anthracen)




Chinazolin




Benzo[f]Chinazolin




Quinoline




Acridin
(Benzo[b]Quinoline)
(Dibenzo[b,e]Pyridine)




Cinnolin




Phthalazin




Chinazolin




Chinoxalin




Phenazin



Benzo[g]cinnolin



Benzo[g]chinazolin



Benzo[g]chinoxalin

2.13. د هیتروسیکل سره وصل هیتروارومات: په دغه سلسله کې اساسی هیتروارومات (Stammheterocyclus) د یوې هیترواروماتیکې حلقې سره وصل وي او ځینی مرکبات یې په معمولی نومو سره مشهور دي د مثال په توګه Pyrido[b]pyridine او Pyrido[c]pyridine د Naphthyridin او Phenanthroline په نامه شهرت لري.

دهيترو ساپکلیک مر کباتو طبي اهميت

اهيترو ساپکلیک مرکبونه په طبابت کې زیات استعمال لري چې د نمونې په توګه يې ځنې مثالونه تر څیرني لاندې نيسو .

پنسلین وي (Phenoxyndthylpenicillin)

داسې کیمیاوي مرکب دي چې په خپل تر کيب کې په کړي کې دوه هيترو اتمونه (سلفر، نایټروجن) لري او انتي بیوتیک دي چې د penicillin - v په نوم سره شهرت لري داسې درمل دي چې د معدې اسیدو په وسیله غیر فعالیږي د مثبت ګرام باکټریاو لکه ستر پټو کوک ، ستا فلیکوک ، او نومو کوک د کنټرول لپاره ډیره مهمه ادویه ده .

سیفرا دین (Cephadrin)

سیفرا دین هم یو نوع درمل دي چې په خپل تر کيب کې هيترو اتمونه لري ، یوزیر رنگه پودر دي په اوبو کې لږ حلېږي ، په الکول او لیتر کې نه حلېږي .

تنفسي سیستم د لارو سفلي انتا ناتو (سینه بغل) اود وینې په انتا ناتو کې ورڅخه کار اخستل کیږي .

سیر یاکسون سودیم (Ceftriaxon e sodium)

دامرب هم یو هيترو مرکب دي زیر کرسټلي شکل لري په اوبو کې په اساني سره حلېږي او په الکولو کې لږ حلېږي . په انتاني نارو غیو کې لکه د مفسلون درد ، د هډکو درد ،

سیپرو فلو کسا سین (Ciprofloxacin)

کمرنگه سپین پودر دي چې په اوبو کې په عملي توګه غیر منحل دي ، په الکول او میتایل کلوراید کې لږ حلېږي او په رقیق اسیتیک اسید کې منحل دی .

طبي استعمال :

سیپرو فلو کسا سین یو ډیر مهم مرکب دي چې په پراخه پیمانه سره په طبابت کې استعمالیږي د مثال په ډول د مفسلونو او هډکو په انتاناتو کې ور څخه زیاته ګټه اخستل کیږی .

ا و فلا کساسین (Ofloxacin)

کمرنگه زیر کرسټلي شکل لري او د پودر په شکل سره پیداکیږي په اوبو کې لږ حلېږي او په اسیتیک اسید کې ښه حلېږي .

طبي استعمال :

په انتاني نارو غیو کې ، د بولي لارو په لږ او متوسطو انتاناتو (UTI) ، جلدي انتانات اود پرو ستات په التهاب کې کارول کیږي.

د منرالونو استقلاب (Metabolism of Minerals)

منرالونه غیر عضوي مواد دي چې د بدن د وزن ډېره کمه برخه جوړوي چې د

بدن په ټولو برخو کې شتون لري. کلسیم د بدن 2 فیصده او کوبالت 0.00004 فیصده د بدن جوړوي.

منرالونه د انسان د بدن په عضویت کې ډیرې موهمې دندې ترسره کوي او د منرالونو موجودیت د بدن لپاره ډیر ضروري دی لکه د هډکو طبقه بندي، د

ویني لخته کیدل د قللي او تیزابو توازن، د مایعاتو او اسموتیک فشار توازن او تنظیم. ځنې منرالونه د ډیرو مهمو بیولوژیکي مرکبونو د یو برخې په ډول وظیفه اجرا کوي لکه هیموگلوبین کې اوسپنه، تایروکسین کې ایوډین، په انسولین کې جسته، په ویتامین B₁₂ کې کوبالت او کو انزایم په جوړښت کې سلفر شتون لري.

ځنې منرالونه د مرستندو په علومو په حیث د انزایمونو سره دنده سرته رسوي لکه Cu, Mn, Mg, Zn او پوتاشیم (K). او ځنې منرالونه د انزایمونو یو ضروري برخې په توګه دنده سرته رسوي لکه Mo, Co او سلینیم (Se).

د منرالونو طبقه بندي

منرالونه په بنسټیز ډول سره په ماکرو منرالونو او میکرو منرالونو ویشل شوي دي.

ماکرو منرالونه هغه منرالونه دي چې د بدن لپاره یې ورځنې اړتیا د ۱۰۰ ملیګرام څخه کم وي او په لاندې برخو ویشل شوي دي.

✓ Essential Trace Elements په دې ګروپ کې نکل، مولهډین، وناډیم، کډمیم او باریم شامل دي.

✓ Non Essential Elements په دې ګروپ کې کالیمونیم، سرب، سیماب، بورون، بسموت او نور شامل دي.

اوه (۷) اساسي عناصر یا ماکرو منرالونه چې د بدن د غیر عضوي موادو 60-86 % جوړوي عبارت دي له Ca, P, Mg, Na, K, Cl او سلفر.

د ماکرو منرال او مایکرو منرال ځانګړ تیاوي په لاندې جد ول کې ذکر شوي دي .

نوي سر چيني ور ځيني اړ تيا د کمښت ناروغي بنسټيزي دندي منرالونه
ما کرو منرالونه

Ca	د هډکو او غاښونو په جوړښت کې د عضلاتو په تقلص کې اود عصبي سيالي په انتقال کې رول لري	Rickets Osteomalacia Osteoporosis	0.8 – 1 gr\day	شدي او د شدي محصولات لوبيا ، او پاڼه لرونکي سبزیجات
P	د هډکو او غاښونو په ترکیب کې ، هستوي اسیدونه ، کو انزایمونه اونور	Rieckets,Osteomalacia	0,8 – 1gr\day	شدي اود شدي و محصولات
Mg	د هډکو او غاښونو په جوړښت کې اود انزایمونو مرستندوی لکه کینیز انزایم	Neuromuscular Weaknessand irritation	300- 350mg\day	شدي ، میوي او سبزیجات
Na	د خارج الحجروي مایعاتو په تنظیم کې ، د عضلاتو او عصبي حجرو په وظیفه کې ، او اسموتیک فشار ، اسید ، بیز په تنظیم کې رول لري	Muscular Weakness,MentalCOFUSION	5 – 10gr \ day	عادي د خوړو مالګه
K	د داخل الحجري مایعاتو اساسي برخه	عضلي کمزور تیا او دماغي تشوش	300- 35gr	حبوبات میویاو سبزیجات
	د اسیدو زیس په توازن کې ، اسموتیک فشار او نور			
Cl	د تیزابو او القلي په توازن اود HCl په جوړولو کې	که غذايي رژیم نارمل وي هېڅ اعراض نلري	5-10 gr\day	عادي د خوړو مالګه
S	د سلفر لرونکو امینواسیدونو په جوړولو کې اود ځینو ویتامینونو په جوړښت کې ښه رول لري	ندي پیژندل شوي		سلفر لرونکي امینو اسیدونه

Fe	د Mb ، Hb او سايټو کروم په جوړښت کې رول لري	مايکر و منرالونه Hypp chromic ,Microcytic Anemia	10 – 15mg\day	غوښه ، خېگر ، زړه ، پاڼه لرونکي سبزيجات
Cu	Cytochrome-c ,oxidas,catalas,Tyrosi nase انزايمونوپه جوړښت کې او د اوسپنې په انتقال کې رول لري	Anaemia,Menkes Dises	10- 15 mg\day	غوښه ، خېگر ، زړه ، پاڼه لرونکي سبزيجات
I	Thyroxin and tri iodo tyronine	Cretinism,Goiter,Myexede	150-200\day	شنو پاڼو لرونکي سبزيجات
Mg	Pyruvate carboxylase, Arginase,Glycoprotei n په جوړېدنه کې	ندي پېژندل شوي	2-9 mg\day	شنو پاڼو لرونکي سبزيجات
Zn	Alcohol Dehydrogenase,Carbo nic Anhydrase and N.D.H انزايمونوسره مرستندوي عامل	Growth Rtardation ,poor WoundHeaiing	10-15mg\day	شيدې ، غوښه، هگي
Mb	Xanthin oxidase په جوړښت کې رول لري	ندي پېژندل شوي	75- 250 microgr\day	سبزيجات
Co	Vit B 12 په جوړښت کې رول لري	خبيسه کم خوني	5-8 microg \day	هغه خواړه چې حيواني منابع لري
F	د هډکو او غاښونوپه سالمه وده کې مرسته کوي	Dental Carries,Osteoprosis	2-4 mg\day	د څښلو اوبه
Se	د وېټامين (E) سره يو ځاي د انتي اکيډانت د نده تر سره کوي	Macular , Degeneration,Cardiomyop athy	50-200 microg\day	غوښه ، خېگر او زړه
Cr	د انسولېن د دندې په سرته رسولو کې مرسته کوي	Impaired Glucose ,TOLERANCE	10-100 mg \ day	خمير ما يه، حبوبات او غوښه

کلسیم (Calcium)

د منرالونود جملې څخه کلسیم هغه منرال دي چې د انسان په بدن کې زیات شتون لري اود بدن د وزن 1 – 5 Kg جوړوي چې (۹۹) فیصده یې په هډکو او غاښونو کې شتون لري او یو اځي یو سلنه یې په عضویت کې ډیرې مهمې دندې سر ته رسوي .

د کلسیم بیو شیمیایي دندې

- ۱: د هډکو او غاښونو ارتقا . کلسیم د فاسفورس سره یو ځای د هډکو د جوړې د نې او فزیکي کلکوالي لپاره ضروري دی ، هډکې منظم نسجونه دي چې کلسیم یې دینامیکي حالت دی .
- ۲: د عضلاتو تقلص . کلسیم د Troponin - c سره یو ځای کيږي اود عضلاتو د تقلص د تشدیدو سبب کيږي . همدا رنگه ATP فعالوي.
- ۳: د وینې لخته کیدل . د وینې د لخته کیدو د پروسي د زیاتو تعاملاتو د منځ کړي او حاکي سبب کيږي
- ۴: Nerve Trans amination: کلسیم د عصبي سیالۍ د انتقال لپاره ضروري دی
- ۵: د غشا د نیمه نفوذ وړتیا په ساتلو کې : کلسیم د غشا د جوړښت په نارمل ساتلو کې او همدا رنگه د غشا څخه د اوبو او ځینې ایونونو په انتقال کې مهمه دنده سرته رسوي.
- ۶: د انزایمونو فعالیتدل . کلسیم نیغ په نیغه د ځینو انزایمونو په فعالیت لپاره ضروري دی لکه : ATP Pancreatic Lippase , او نور
- ۷: کلسیم د داخل الحجروي پیغام وړونکي په ډول
- ۸: دهورمونونو په ازادیدلو کې د مثال په ډول د اندوکراین غدې څخه د اناسولین اونورو هورمونونو په ازادیدلو کې فعاله ونډه اخلي .
- ۹: په زړه باندې عمل : کلسیم د زړه په Myocardium باندې عمل کوي اود Systole مرحلي د اوږدوالي سبب کيږي .

په غذايي موادو کې یې اړتیا

کامل نارینه او ښځې لپاره د ورځي (۸۰) ملی گرام ضرورت دي.

د امیدواري په دوران کې او هغه میندې چې ماشوم ته شیدي ورکوي 1,5g\day

• کوچنیا نو ته چې عمر یې ۱ – ۱۸ کلو پوري وي 0,8 – 1.2g\day

• هغه کوچنیا چې عمر یې د یوه (۱) کال څخه کم وي 300- 500mg\day

• عالي منابع : شیدي او دهغې منابع

- بني منابع . ماهي لوبيا ، كرم ، دهگي زير ، پانه لرونكي سبز يجات

جذب

د كلسيم جذب په زياته اند ازه سره په اثنا عشر كې صورت نيسي نو موري يوه فعاله پرو سه ده چې انر ژي نه ضرورت لري اود زياتو عواملو په واسطه اغيزمنه كيږي چې ځني عوامل ئي په لاندې په لاندې ډول كيږي .

۱: هغه عوامل چې د كلسيم جذب زياتوي

Vit - D دنموري ويتامين فعال شكل Calcitriol پو سيله سرته رسيري په دې ډول چې د كلسيم نېټلونكي كلسيم نېټلونكي پرو تين (Calcium Bindang Protien) جوړيدنه د كلمو په Epithelial حجر وكي زياتوي اود كلسيم د جذب د زياتوالي سبب كيږي .
برسيره پر دې سره نور عوامل په لاندې ډول سره دي .

- پارا تايرايډ هور مون : PTH د Calcitriol د جوړيدني د زياتوالي دلاري د كلسيم جذب زياتوي.

- PH : په ټيټ PH لرنكي محيط كلسيم ډير ښه جذب كيږي

- لكتوز : لكتوز د كلسيم اخستنه د كلمو د حجرو په واسطه زياتوي

- امينو اسيد : لايسين او ارجينين امينو اسيدونوپه وسيله كلسيم جذب زياتيږي.

۲: هغه عوامل چې د كلسيم جذب نه كوي

- اكډلات اونوري غير منحل ما لگو جوړيدل دكلسيم جذب نه كوي

- په غذائي رژيم كې د فاسفيټ زياتوالي : د فاسفيټ زياتوالي د كلسيم جذب نه كوي

- ازاد شحمي اسيدونه د كلسيم سره يو ځاي كيږي او په غير منحل موادو بد ليږي چې په نتيجه كې د شحم جذب خرابيږي نو د كلسيم جذب هم خرابيږي

- په القلي محيط كې د كلسيم جذب ښه صورت نه نيسي

د پلازما كلسيم

په وينه كې په زياته اندازه كلسيم شتون لري خو د وينې د حجرو په جوړښت كې د كلسيم اندازه ډيره كمه ده . په وينه كې د كلسيم نار مل غلظت $11 - 9 \text{ mg/dl}$ دې چې (۵) فيصده يي ايونايز شكل لري او دغه ايونايز كلسيم ډير فعال دې ($1 \text{ mg} \setminus \text{dl}$) د دغه مقدار څخه لږ د كلسيم فاسفيټ او كلستم ستريت په شكل او (۱۰) فيصده يي چې تقريبا 4.5 mg/dl كيږي د پروتين سره چې په زياته اندازه د د البومين اوپه كمه اندازه د د گلو بو لين سره يو ځاي شوي وي .

ایونایز کلسیم ، کلسیم فاسفیت او کلسیم ستریت ددط ورتیا لری چې د وینې د لارې حجرو ته او انساجو ته تیر بڼې خو د پروتین سره یو ځای کلسیم ددې ورتیا نلری چې جراتو ته تیر شي . په لابراتوار کې د کلسیم دریواړه شکلونه اندازه کیږي.

هغه عوامل چې د پلازما کلسیم اندازه کنترولوي ، ټول کلسیم د هضمي سیستم څخه جذبیږي او په دوران کې د ځینو هورمونونو لکه: Calcitonine, Calcitriol, Parathyroid په وسیله په نارمل اندازه سره (9 – 11 mg\dl) ساتل کیږي .

د پارا تایروئید هورمون (Parathyroid Hormone (PTH) مو همه دنده د وینې دکلسیم د لوړیدو ده چې د عمل لپاره درې مختلف نسجونه یعنې : د هډکو، کلمو او پښتورگو څخه عبارت دي .

الف: په هډکو باندې عمل . PTH په هډکو باندې د دې کلسیفیکیشن (Demineralization) سبب کیږي ، پارا تایروئید په کلسیم باندې تاثیر کوي اود کلسیم د ضایع کیدو سبب کیږي خصوصاً په هغه خوراکی موادو باندې چې د کلسیم اندازه یې کمه وي .

ب: په پښتورگو باندې عمل : PTH په وسیله د پښتورگو په تیو بیو لار برخه کې د کلسیم دوباره جذب زیاتوي او په دې اساس د وینې د کلسیم سویه زیاتیږي .

ج: په کلمو باندې اغیزه . PTH په کلمو باندې غیر مستقیمه اغیزه لري په دې ډول چې کلسیتی ریول د لارې د کلسیم جذب زیاتیږي .

د: Calcitonine . نو موږ یو پیپتاید هورمون دی چې (۳۲) امینو اسیدونه لري د تایراید غدې د Parafollicular حجرو څخه افرازیږي . د کلسیو تیونین اغیزې د کلسیم په استقلال باندې په خلاف د PTH عمل کوي او په دې ډول سره د کلسیم مقدار په ادرار کې زیاتیږي او په وینه کې د کلسیم اندازه کميږي .

په غاښونو کې کلسیم لکه چې مو دهډکو کلسیم ولیده چې په دینامیک حالت کې دی خو د غاښونو کلسیم په دې ډول نه دی چې یو ځل د کاهلانو غاښونه جوړ شوه بیا پکې

Decalcification صورت نه نیسي د بلې خوا په ودې کونکو کوچنیانو کې د غاښونو ښه او مناسب دیکالیکیفیکیشن ډیر اهمیت لري .

ریکیټس (Rickets) : ریکیټس یوه ناروغي ده چې په دې کې د هډکو په کالیکیفیکیشن کې ګډوډې شتون لري کیدای شي چې نموري په عضویت کې د ویتامین دي کموالي او یا په غذايي رژیم کې د کلسیم او فاسفیت اود دواړو د کمښت له کبله وي . کیدای شي چې د وینې د کلسیم او فاسفیت غلظت یې نارمل وي خو ځانګړي منظره یې د Alkaline

Phosphatase فعالیت زیاتوالي دي چې د ریکیټس په پیژندنه کې مرسته کوي .

Renal Rickets رينال ريکيتس

ريکيت د پښتورگو د تخريب سره يو ځای وي چې لدې کبله د کلسيټرول په جوړيدنه کې نيمگړتيا پيدا کيږي نوموړی د ويتامين د ي د عادي مقدار سره ځواب نه وائي چې نوموړی د ويتامين ريسيسټن رکيت D پنوم سره يا د وي .

ر ينل ریکيت کولي شو چې د کلسيټرول په وسيله کنترول کړو.

اوستو پروسیس (Osteoporosis)

استيو پرو سيس د هډکو ديمنراليزيشن په وسيله مشخص کيږي چې په دوامدار ډول سره د هډکو کتله د لاسه ورکوي هغه اشخاص چې عمر يې د (۶۰) کلو څخه زيات وي (دواړه جنسه) د اوستيو پرو سيس د خطر سره مخ دي چې نموري پيښي زياتي په Post Menopause (کومي بنځي چې ماشوم ته تي ور کوي) بنځو کې ليدل کيږي .

پدې ناروغانو کې د هډکو ماتيدنه را مينځته کيږي چې د امريکا په متحده ايالاتو کې ۵۰ ميصد پيښي د همدې گډوډي له مخې پيدا کيږي .

اوستو پروسيس د ديو خاموش يا پټ غله په نوم سره هم ياديږي چې د دغه گډوډي اسباب په سم ډول سره نه پيژندل کيږي بيا هم لاملونه شته د دهغي په پيژندنه مرسته کوي لکه :

- دويتامين دي څخه د کلسټروئيل جوړيدنه د غمر په زياتيدو سره کميږي په ځانگړي ډول په شيدو ورکډو نکو بنځو کې .
- د حرکت کموالي اود منظم تمرين نه شتون د دواړه د هډکو د کتلې د کموالي سبب کيږي .
- دپه بنځو کې د جنسي هورمون کمښت هم د شيدې ورکونکو بنځ، د پر مختگ لامل کيږي.

د رملنه

شيدو ورکونکو بنځو ته داستروجن ، کيسيم جمع ويتامين دي سره يو ځای تو صيه کوي اود هډکو ماتيدو خطر به کم شی او زړو خلکو ته په لوړ مقدار سره کلسيم توصيه (1.5 mg\day)

فاسفورس (Phase Phosphor)

د يو کاهل بدن يو کلو گرام فاسفورس د فاسفيټ په شکل لري چې نموري د عضويت په ټولو حجرو کې پيدا کيږي چې د دې جملې څخه زياته برخه د کلسيم سره (۸۰) فيصده د کلسيم سره يو ځای د هډکو او غاښونو په جوړښت کې برخه لري او (۱۰) فيصده د بدن فاسفيټ په عضلاتو او وينه کې شتون لري . د قندونو، شحمياتو او پرو تين سره يو ځای وي او پاتې (۱۰) فيصده په عضويت کې په مختلفو کيمياوي مرکبونو کې تو زيع شوي دی.

بیو شیمیکی و وظیفی

د فاسفورس بیو شیمیکی وظیفی په لاندې ډول سره دي

- فاسفورس د هډکو او غاښونو د ارتقاع لپاره ډیر ضروري دی. د کلسیم د اخستني پوري اړه لري
- د لوړي انرژي لرونکو مرکباتو لکه ATP او GTP په جړیدنه او مصرف کې رول لري .
- د فاسفو لیپید او فاسفو پروتین او هستوي پروتینو (RNA,DNA) لپاره ډیر ضروری عنصر دی.
- د ځینو نکلويک اسید کوانزایم لکه : AMP,DMP,NADP,NAD,Pyridoxa-p کې هم یو ضروري او اساسی دندې تر سره کوي .
- زیات انزایمونه او پرتینونه د فاسفو ریلیشن په واسطه فعالیت لري .

غذائي ضرورت

د فاسفیټ غذايي ضرورت د کلسیم د اخستني پوري اړه لري چې $Ca:P = 1:1$ سره دی ، ورځیني ضرورت یې (۸۰۰) ملیگرام دی چې په شیدو خوړونکو کې 2:1 دی نموري نسبت د انسانانو په شیدو

جذب

د فاسفیټ جذب د وړو کلمو Jejunnum په برخه کې صورت نیسي .

✓ کلسیټریول د فاسفیټ اخستنه د د کلسیم سره یو ځای سرته رسوي

✓ د کلسیم او فاسفورس جذب هغه وخت په ښه ډول سره صورت نیسي چې د کلسیم او فاسفورس نسبت ۱:۲ او یا ۲:۱ سره وي .

✓ تیزابیت یې جذب زیاتوي او PH ylate د لمو په وسیله جذب کوي .

د ویني فاسفیټ

د ویني د فاسفیټ سویه (۴۰) گرام فی ډیسی لیتر ده خو په سیروم کې (۴) ملیگرام فی ډیسی لیتر ده

چې RBC او HBC په زیاتره پیمانه سره فاسفیټ لري د ویني فاسفیټ (۴۰) فیصده د ایون په شکل ، (۵۰) فیصده د نرو منرالو په شکل لکه سوډیم، مگنیزیم ، کلسیم او پوتاشیم سره په کامپلکس شکل سره شتون لري. پاتې (۱۰) فیصده د سیروم فاسفیټ یې د پروتین سره په Bound شکل سره شتون لري . داباید په یاد ولرو چې د ویني فاسفیټ سویه د ولري په حالت کې لوړه وي او وروسته د غذا خوړلو څخه یې اندازه ټیټه وي دا لدې کبله چې د قندونو گلوکوز د خوړلو څخه وروسته فاسفیټ په

Phosphorylation Reaction کې په مصرف رسیږي .

ا طراح

د ورځي (۵۰۰) مليگرام پوري فاسفيټ په ادرار کې خارجيږي. اود پښتورگو قد مه (Threshold) د فاسفيټ لپاره 2mg/dl د PTH په وسيله دغه فاسفيټ دوباره جذب د پښتورگو په تيو بولار برخه کې نهې کيږي .

مرضي حالتونه

- ✓ د سيروم فاسفيټ اندازه په هيا پو فارا تايروديزم کې لوريږي او په هايپر فارا تايروديزم کې کميږي .
- ✓ د پښتورگو په شديدو ناروغيو کې د سيروم فاسفيټ سويه لوريږي اود تيزابيت سبب کيږي .
- ✓ په رينال ريکټ ناروغيو کې د سيروم فاسفيټ اندازه کمه او د الکلي فاسفيټ فعاليت اندازه لوړه وي .
- ✓ د شکرې په ناروغيو غانو کې د عضوي فاسفيټ اندازه ټيټه او د غير عضوي فاسفيټ اندازه لوړه وي .

مگنيزيم (Magnesium)

د يو کاهل شخص په بدن کې (۲۰) گرام مگنيزيم شتون لري چې له دې جملې څخه (۷۰) فيصده يې په هډکوکې د فاسفورس او کلسيم سره يو ځاي وي او ديرش (۳۰) فيصده يې په نرموانساجو او مايعاتو کې شتون لري .

د مگنيزيم بيو شيميکي دندې

- مگنيزيم د هډکو او غاښونو د جوړښت لپاره ضروري دي.
- مگنيزيم د ځينو انزايمونو سره چې ATP ته ضرورت لري د يو کرمکي عامل په ډول دنده اجرا کوي لکه فاسفو فرکتو کيناز (Phospho Fracto kinase) انزايم او نور .
- د مگنيزيم ورځيني ضرورت د نارينو لپاره (۳۵۰) مليگرام في ديسي ليلر اود ښځينو لپاره (۳۰۰) مليگرام في ديسي ليتر دي .
- د مگنيزيم جذب په کلمو کې د يو خاص پروټين په وسيله صورت نيسي چې په نارمل حالت کې (۵۰) فيصده وي .

د زيات کلسيم او فاسفورس اخستنه او الکول د مگنيزيم جذب کموي اود PTH په وسيله يې جذب زياتيږي .

د سیروم مگنیزیم اندازه $2-3\text{mg/dL}$ ده چې (۶۰) فیصده یې ایو نایز شکل وي ، (۱۰) فیصده یې د نورو ایونوسره په ترکیبي ډول او (۳۰) فیصده یې د پرو تینو سره شتون لري .

مرضي حالتونه

- ✓ د مگنیزیم کموالي د ضعیفي او اختلاص سبب کیږي اعراض یې د کلسیم کمښت سره مشابه دي اود مگنیزیم د تطبیق په صورت کې له منځه ځي .
- ✓ په خوا ځواکي اود ځیگر په سیروزیس کې د مگنیزیم کمښت را مینځته کیږي
- ✓ د مگنیزیم د سویی کوالي کیدای شي په لاندې نارو غانو کې ولیدل شي.

Uremia , Rickets , Abnormal Pregnancy

سودیم (Sodium)

سودیم د خارج الحجروي مایعاتو د اساسي کتو نو څخه د ی چې (۵) فیصده په هډو و کو ، (۳۰) فیصده په جارح الحجروي مایعاتو کې او (۱۰) فیصده یې په ورو نسجونو کې شتون لري .

د سودیم بیو شیمیکی د ندي

- د کلوراید او باي کاربو نیت سره یو ځای د تیزابو او القلي توازن په کنترول کې مهمه ونډه اجرا کوي .
- د اسموتیک فشار په نارمل ساتلو کې او د مایعاتو په توازن کې مهم رول لري .
- د حجرو د نفوذ په وړتیا او د عضلا تو د نارمل دندو د اجرا لپاره ضروري دي .
- د گلو کوز ، گلکتوز او امینو اسیدونو په جذب کې برخه اخلي .
- د نارمل کاهل اشخاصو لپاره ور ځیني مصرف $5-10\text{g/day}$ چې د سودیم کلوراید د خوړلو څخه یې پوره کوي . هغه خلک چې دلور فشار تاریخچه ولري په ورځ کې باید (۵) گرام سودیم واخستل شي او کوم کسان چې لوړ فشار لري باید د ورځې یو (۱) گرام سودیم واخلي .
- سودیم په هاضمي سیستم کې ښه جذبیږي او (۲) فیصده د غا یطه موادو سره جارجیږي خو په اسهالاتو کې زیات اطراح کیږي .

پلازما سودیم

په پلازما کې د سودیم اندازه $135 - 145\text{mEq/L}$ ده اود ویني په حجرو کې 35mEq/L ده .
منرال کترو کو ئید چې دجې د ادرینال غدې د قشري برخې څخه افرازیږي اود سودیم په میتا بولیزم باندې اغیزه لري .

اطراح : د سوديم د اطراح لويه لار د پښتورگو څخه عبارت دي چې د ورځي ۵۰۰ گرام سوديم فلتر کوي او ۹۹ فيصده ه يي په فعال ډول سره د تيببو لار په برخه کې دوباره جذ بيري چې نموري پروي د الد ستيرول هور مون په وسيله کنترولوي ،

مرضي حالتونه

- ✓ هايپو نيتريميا : دهغه حالت څخه عبارت دي چط د سيروم سوديم اندازه د نارمل حالت څخه کمه شي چې اکثره د اسهالتو ، کانگو و د پښتورگو د مزمنو نارو غيو له کبله منځ ته راځي .
- ✓ هايپر نيتريميا . کله چې د سيروم سوديم اندازه د نارمل حالت څخه لوړه شي د
- Hyper Natriemia په نوم سره ياديري . اعراض يي د ويني د حجم زياتوالي اود فشار لوړوالي څخه عبارت دي .
- ✓ کله چې په چټک ډول سره دسوديم مالگه تطبيق شي په هغه صورت کې د سوديم سويه لوړيري .
- ✓ دابايد په ياد ولرو چې د حاملگي په وخت کې د د ستريود هور مونونه اود پلا سيتا هورمونونه د سوديم او اوبو د احتباس سبب کيري او دازيما منځته را ځي .

پوتاشيم (Potassium)

پوتاشيم يو داخل الحجروي اساسي کتيون دي اود حجري په خارجي برخه کې هم دندي سرته رسوي.

د پوتاشيم بيو شيميکي د ندي

- دتيزابو،القلي اود اوبو د توازن لپاره ضروري دي
- د داخل الحجروي ازموتيک فشار په تامين کې رول لري
- پايرو ات کينيز انزايم (Pyruvate Kinase) انزايم د خپل فعاليت لپاره پوتاشيم ته ضرورت لري .
- د صعبې سيالو د انتقال لپاره پوتاشيم ضروري دي
- خارج الحجروي پوتاشيم د زړه عضلات د تاثير لاندې راولي
- د پوتاشيم ور ځيني شورت 3- 4 gr پوري دي .
- منابع يي کيله، نارنج، لوبيا، چور گوري او ځيگر دي .
- د پوتاشيم (۹۰) فيصده په کلمو کې جذ بيزايووازي (۱۰) فيصده د غايطه وادو دلاري اطراح کيري

د پلازما پوتاشيم

په وینه کې د پوتاشيم اندتزه 3.5- 5 mEq \L دي نموري منرال په بنسټيز ډول سره په ادرار کې اطراح کيري چې اطراح ئي د نيزابو او القلي د توازن لپاره اغيزمنه ده .

د پوتاشيم اطراح د الدو ستورو نيز (Aldosterones) انزايم په واسطه اسانيږي .

مرضي حالتونه

په سيروم کې د پوتاشيم اندازه په ټاکلي حد کې ساتل کيږي چې د پوتاشيم د غلظت زياتوالي يا کموالي دواړه د خطر څخه ډک دي دا ځکه چې د زړه په عضلاتو باندې اغيزه کوي.

✓ هاپو کلا ميا (Hypo Kalemia) د سيروم غلظت کموالي ته وائي چې د لاندې عوا ملو پورې اړه لري .

- دادرينال کار تکس زياتوالي
- د زياتي مو دي لپاره د کارتيزون تطبيق
- د داسي ريډي مايعاتو تطبيق چې پو تاشيم ونلري .
- د انسولين په وسيله Diabetic Coda په تداوي کې

اعراض اعلا يم

د عضلاتو کمزور تيا ، د E,C,G تيرات ، د پو تاشيم سيروم د غلظت لووالي او د هغه ما يعاتو تطبيق چې د پو تاشيم مالګي ولري .

کلورين (Chlorine)

کلورين د سوديم کلورايد يوه برخه ده اړو کلورين استقلال د کلورين پوري تړلي دي .

د کلورين بایو کیمیکل فور ميشن په لاندې ډول سره دي.

- کلورايد د تيزاب او القلي توازن ، د تايورايد توازن او ازموتيک فشار په تنظيم کې رول لري چې نموري دندي يي د سوديم او پوتاشي سره د تعامل په نتيجه کې سرته رسيږي .
- د معدې عصاري د هايډرو کلوريک اسيد د جوړونې لپاره ضروري دي
- د لارو اميلاز انزايم د کلورين ايون په وسيله فعالیږي

دکلورين ايون ورځيني ضرورت د سوديم کلورايد په شان (۵-۱۰) مليګرام دي چې په کاپي اندازه سره د سوديم کلورايد اخستل د کلورين ضرورت پوره کوي . اود کلرين ايون په نارمل حالت کې تقريبا ټول جذبیږي .

د پلازما کلورايد

د پلازما کلورايد غلظت 105 – 95 mEq/L دی په C.S.F کې اندازه 125 mEq/L اطراح کيږي .

دکلورين ايون د پينستورګو 10mEq/L دي .

مرضي حالتونه

نسناسټي ، کانګي ، تنفسي اسيدوسيس اوزياتي خولي .

سلفر

سلفر په عضويت اکثره په عضوي شکل سره وي ، پروتين په خپل جوړښت کې سلفر لري ، هغه پروتين چې په عضويت کې شتون لري نموري د وزن له مخې يو (۱) فيصد سلفر لري .

د سلفر بيو شيميکي د ندي

د سلفر بيو شيميکي د ندي په لاندې ډول سره دي .

- سلفر لرونکي امينو اسيدونه د جوړښت اود پروتينود بيو لوژيکي دندو (انزايمونه ، هور مونونه ، ساختماني پروتينونه او نور) خورا ښه اهميت لري .
- سلفر د Lipoic acid , Biotin, Thaimin او Pantothenic Acid په جوړښت کې رول لري .
- گلو تا تايون ، کنډرو تين سلفيت ، هپارين او نور سلفر لرونکي مرکبونه دي .
- فاسفو ادينوسين فاسفو سلفيت (PAPS) يو فعال فاسفيت دي چې په ځينو تعاتلاتو کې په مصرف رسيري ..

د سلفر ورځيني ضرورت په ځانګړي ډول سره معلوم ندي په کافي اندازه دسلفر لرونکوامينواسيدونواخستل نموري ضرورت پوره کوي .

اطراح

د مختلفو مرکبونو څخه چې د سلفر اکسيدايز شکل د سلفيت په ډول ځيګر کې م.

منځته راځي او په ادرار کې اطراح کيږي په ادرار کې (۸۰) فيصده غير عضوي سلفيت اطراح کيږي ، عضوي يا مز د رج سلفيت ۱۰ فيصده جوړوي او پاتي ۱۰ فيصده غير اکسيدايز سلفر دي چې د سلفر لرونکو امينو اسيدوپه شکل اطراح کيږي .

اوسپنه

د يو کاهل شخص په عضويت کې ۳-۵ گرام پوري اوسپنه شتون لري چې ۷۰ فيصده د نموري اوسپني په ايروترو سيتيزد هيموګاو بين په جوړښت کې برخه لري. د ۵ فيصده څخه لږ اندازه په ميو گلو بين کې برخه لري .

هيم د اوسپني لرونکي ډير مهمخ مرکب دي چې د زنتو بين ، سايتو کروم ، مايو گلو بين او نورو کې د انزايمونو په جوړښت کې شتون لري .

د اوسپنې بيو شیمیکي دندې

داوسپنې بيو شیمیکي دندې په لاندې ډول سره دي .

- اوسپنه خپله د هغه مر کبون دلارې سرته رسوي چې په هغې ې شون لري لکه هیموگلو بین ، مایو گلوبین چې ډاکسیجن او کاربن ډاي اکساید په انتقال کې رول لري .
- سایتو کروماوسپنې او ځنې ان هیم پرو تینونه په الکترون چن او او کسیداتیو فاسفو ریلیشن کې ضرورت دي.
- پر اکسیداز او او لیسو سو میل انزایم د نیو ترو فیل پوسیله ډباکتریو وژنې لپاره ضروري دي .

ورځني ضرورت

د اوسپنې ور ځیني ضرورت په لاندې ډول سره دی.

- ✓ په کاهلا نو کې (۱۰) ملیگرام په ورځ کې.
- ✓ د غیر حامله ښځو لپاره ۱۸ ملیگرام في ورځ کې
- ✓ د حامله او شیدو ورکونکو ښځو لپاره ۴۰ ملیگرام في ورځ کې

سر چیني

- غني منابع : د غړو غوښه، ځیگر ، پښتور گي او زړه
 - متوسط منابع: سبزیجات، ماهي ، مڼه ، وچي او تازه میوي
 - فقیر منابع : شیدي او گوره
- اوسپنه په معده او اثنا عشر کلمو کې جذب بیږي ، په نارمل انسا نانوکي ۱۰ فیصده اوسپنه جذب بیږي او هغه کسانچې د وینې کموالي لري اویا کوچنیان چې د ودي په حالت وي بیا دهغوي لپاره زیته اوسپنه ضرورت ده.

هغه عوامل چې د اوسپنې په جذب با ندي تاثیر لري په لاندې ډول سره دي.

- سیستین ، اسید یتي ،او ویتامین سی د اوسپنې په جذب کې ښه رول لري
- په کم خونې کې د اوسپنې جذب ۲-۱۰ جنده صورت نیسي .
- فایټیټ او اکذالت چې په سبزیجاتو کې پیداکیږي د اوسپنې په جذب کې ښه رول لري .
- هغه غذایی رژیم چې زیات مقدار فاسفیټ ولري د اوسپنې جذب کموي او بر عکس که د فاسفیټ مقدار یې کم وي د اوسپنې جذب یې زیات دي .

- په هغه نارو غانو کې چې په هغوي کې یوه برخه د کلمو یا د معدې د جراحي عمليې په واسطه لرې شوي وي په هغې کې د اوسپنې جذب کم صورت نیسي .

اوسپنه په مخاطي حجرو کې

اوسپنه په مثبت دوه ولانس (بيروس) په شکل سره جذبېږي د ننه مخاطي حجرو ته ځي د بر اوکسیداز انزایم په واسطه په درې ولانسه اوسپنه (فرک) باندې بدلېږي بیا د ا فو فر میتیم سره یو ځای کېږي او په فر میتین بد لیږي چې دا یو لنډ مهاله ذخیروي شکل دي د مخاطي حجرو څخه پلا زما ته داخلېږي اودا د عضویت د ضرورت په اساس صورت نیسي اوروسته اوسپنه ور څخه ازادیږي .

په پلا زما کې د اوسپنې انتقال

په دې وخت کې د مخاطي حجرو د پرېتین څخه او دوران کې وسپنه ازادیږي او دوران کې د فرس په شکل وي په دې ځای کې د مس لرونکي پرو تین (سیلورو پلا سمین) پوسیله د اوسپنې اوکسیدیشن صورت نیسي او په درې ولانسه اوسپنه (فرک) بد لیږي لدې نه وروسته د فرک شکل یو ډول پروتین سره یو ځای کېږي چې د Transferrins په نوم سره یادېږي چې دا یو گلايکو پروتین تر ۹۰۰۰۰ پوري مالیکولي وزن لري اود هر مالکول سره دوه اتمه د فرک اوسپنې سره یو ځای کېږي د پلزما ترانسفیرین غلظت 250 mg\dl دي کیدای شي چې 400mg\dl اوسپنه ور سره یو ځای شي چداد Total Plasma Binding Capacity په نوم سره یادېږي .

د اوسپنې ذخیره

اوسپنه په ځیگر توري اود هډ کو په مغز کې ذخیره کېږي (Feritin په شکل) ، په مخاطي حجرو کې د اوسپنې ذخیره په موقتي ډول سره وي د ا پو پرو تین یو مالیکولي وزن د ۵۰۰۰۰۰ پوري دي چې د ۴۰۰۰ پوري د اوسپنې مالیکولونه ور سره یو ځای کیدای شي . هیموسیدرین د اوسپنې یو بل ذخیره وي پرو تین دي کولي شي چې د دوران په اساس ۳۵ فیصده او سپنه ذخیره کړي ..

هر کله چې د اوسپنې ذخیره د ضرورت څخه زیاته شي پهتوري او ځیگر کې تراکم را منځته کېږي .

د اوسپنې انقلاب په تړلي شکل سره تر سره کېږي یعنې په موثر ډول سره مصر فیږي او بیا د مصرف شوي اوسپنې څخه دوباره عضویت ور څخه استفاده کوي . د عضویت څخه دورځي یو ملی گرام څخه کمه اوسپنه ضایع کېږي چې معمولا د ادرار له لاري خارجېږي ..

اوسپنه د ویتامینواو نور عضوي او غیر عضوي موادو سره فرق لري دځکه چې نور مواد داستقلاب وروسته غیر فعالېږي اود وجود څخه اطراح کېږي مگر اوسپنه داسي نده ځکه چې داوسپنې څخه دوباره هڅه اخستل کېږي.

په حامله بنځو او ماشومان چې د ودي په حالت کې وي د اوسپنې مصرف زیا تیږي .

مرضي حالتونه

Iron Defiancy Anemia دا په ټوله نړي کې د تغذي يو عام تشويش دي حتا په لوړو پر مخ تللو هيوادو (USA) کې هم واقعات ليدل کيږي. هغه عوامل چې له دي سره مرسته کوي دادي.

- په کا پي اندازه د اوسپني جذب نه اخستل
- Chronic BloodLoes
- کلک Vegeterian خلک هم د اوسپني د کمبود سره کمخوني ته ميلان پيدا کوي .
- د انهيياتور شتونچي د اوسپني د جذب مخه نيسي.

مس (Cupper)

مس هم ډيو مهم عنصر دی چې په عضويت تقر بيا ۱۰۰-۱۵۰ ملي گرام پوري مس شتون لري . Adult
----- 100- 150 mg

65 mg ----- in muscles

23 mg ----- bones

18 mg ----- liver

Erythrocupriein يو بیرنگه پرو تين دي چې دوه اتومه مس لري ماليکولي وزن يي تقريبا ۳۳۰۰۰ زرو پوري رسيږي . ايسور بشن په اثنا عشر کې جذب کيږي ، د خوراكي موادو ۳۳ فيصده مس جذب کيږي .

نقره ، کی ميم ، مولبدین ، جست او سیماب او د زیات ویتامین سي شتون د مسو جذب نهی کوي .

د مسو جذب د يو ځانگړي ميکانيزم په وسيله صورت نيسي په دې ډول چې د لارو او دمعدې په عصاره کې يو ځانگړي پروتين شتون لري چې د مسو سره يو مقلق جوړوي اود کلموپه PH کې مس منحل ساتي وروسته لدې څخه د کلمو مخاطي حجرو ته ننوځي او د ننه په حجرو کې

Metalothionine په نوم پروتين سره يو ځاي کيږي چې دا يو داخل الحجروي پروتين دي مس د حجروي غشا تير کيږي او دوران ته ننوځي په دامينواسيد (هستيدين) او دوراني البومين سره يو ځاي کيږي ، جذب شوي مس د يوه ساعفت څخه په لږ وخت کې د دوران څخه لري کيږي اود ځيگر په وسيله اخستل کيږي چې په لاندې ډول سره دوه لاري سرته رسوي .

۱: مس دهاضمي لاري ته د صفرا لاري اطراح کيږي نموري د دوهم ځل لپاره نه جذب کيږي بلکي په نور مال ډول سره بدن کې پاتي کيږي . او د زيتوالي په صورت کې مس د غايطه موادو له لاري اطراح کيږي .

۲: په ځيگر کې يو نوع پروتين جوړيږي چې د گلايکو پرو تين په نوم سره يادېږي اود مسو لير ديدنه اسانوي .

سيروم مس $90 \text{ micgm} \backslash \text{dl}$ پوري دي

$\text{RBC} = 93 - 115 \text{ micgm} \backslash \text{dl}$

د اميد واري په حالت کې د بنځو د وجود مس زياتيږي او په RBC کې نار مل حالت لري .

اطراح

خوړل شوي مس ۹۹.۷۵ فيصده د غايظه سره د بدن څخه وځي او د تشو ميتازو سره ۱۵.۱ و ځي .

ور ځيني اړتياوي يې دادي .

- مس د زياتو انزايمونو د برخي په توگه دنده تر سره کوي لکه : او کسیداز ، سايکلو کروم او نور
- مس د هيموگلوبين د جوړيدني لپاره ضروري دي .
- مس د ليسايل اکسيداز په انزايم کې شامل دي
- د ميلنين د جوړيدني لپاره مس ضروري دي
- د هډ کو او عصبي سيستم د ارتقاع لپاره مس ضروري دي
- هيموکوپرين په خپل جوړښت کې مس لری .

غذا يي ضرورت

د ځوانان ورځيني ضرورت $2-3 \text{ mg} \backslash \text{day}$ دي اود کوچنيان لپاره چې عمر يې ديوه کال څخه زيات اويا کموي $0.5 - 2 \text{ mg} \backslash \text{day}$ دي

منابع

د مسو منابع عبارت دي له ځيگر ، پښتورگي ، غوښه د هگي زير ، زړه او شنه پاڼه لرونکي نباتات ،

د پلا زما مس

په پلزمه کې د مسو اندازه $100 - 200 \text{ mic gr} \backslash \text{DI}$ ده چې ۹۵ فيصده يې سيلورو پلازمين سره يو ځاي شوي او ۵ فيصده يې د البونين سره د سست په ډول اتصال لري .

په وینه کې د زیلو رو پلازمین اندازه $25 - 50 \text{ mg/dL}$ ده او هر مالیکول یې 0.34% مس لري .
په هر مالیکول کې یې د ۶-۸ پوري دمس اتمونه سره یو ځای کیږي چې ۵۰ فیصده یې د د مس مثبت دري او ۵۰ فیصده یې د مس صفر شکل لري .

د مسو دکمښت لکبله د هډکو او عصبي نسجونو ناروغي پيدا کیږي . برسره پر دې سره د بدن دوزن کموالي او ځنې وخت د مړینې سبب کیږي .

علاوه پر دې سره ځنې نوري گډ وډي لکه دویشتانو د رنگ بدلون ، ارثي گډ وډي ، د پښتورگو تخریب او نور منځ ته راوړي .

درملنه : په درملنه کې Pencillamine ور کول کیږي .

ایودین (Iodine)

ایودین یو هلوجن دی په جامد شکل سره شتون لري په عضویت کې د ۲۵ ملیگرام پوري دي چې ۸۰ فیصده یې په تایراید غده کې او پاتې یې په عضلاتو، دلاړو په غدو کې ، او تخمدانو کې شتون لري .

د ایودین بیو شیمیکی دندې

دا یو دین بیو شیمیکی د ندي په لاندې ډول سره دي .

یوا ځینې دنده د ایودین چې پیژندل شوي ده هغه هغه دتایراید هورمون د جوړیدنې لپاره ضروري دی چې د Thyroxine (T_4) او Tri Iodothyronine (T_3) په جوړښت کې برخه لري چې ډیرې موهمي پتالو ژیکي دندې سرته رسوي .

ورځینې ضرورت

د ځوانانو لپاره $100 - 150 \text{ mg/day}$ اود حامله ښځو لپاره 200 mg/day ضرورت دي.

د ایودین جذب ، د خیره او اطراح

په کوچنیو کلمو کې ایودین د ایو دايد په شکل جذب بیږي . په نارمل حالت کې د غذايي رژیم (۳۰) فیصده ایودین په وړو کلمو کې جذب بیږي ، همدارنګه دایودین جذب د سږ و او پوستکي په واسطه هم صورت نیسي ، دایودین (۸۰) فیصده د ایودو تایرو گلو بیولین سره یو ځای دي اکثره د پښتورگو دلاړې اطراح کیږي .

د پلا زما ایودین

د بلا زما ایودین $4 - 10 \text{ mg/dL}$ دي چې اکثره یې Protein Band Iodin (PBI) دي او دوراني تایراید هور مونوګي هم ایودین شتون لري .

منگانيز (Manganese)

منگانيز يو انتتالي فلز دي په مجموعي ډول سره په عضويت کې ۱۵ مليگرام شتون لري ، ځيگر او پښتورگي د منگانيز څخه غني دي اود حجرو په هسته کې د هستوي اسيدونو سره يو ځاي شتون لري د منگانيز بيو شيميکي دندې

- اکثره انزايمونوسره د مرستند و په عامل په توگه دنده سرته رسوي لکه : Arginase , Pyro vat, Dehydrogenase اونور .

- منگانيز د هډکو جوړيد ني ، مناسب تکثر اود عصبي سيستم په نارمل دندو سرته رسولو کې ښه رول لري

- د هيموگلوبڼه کې ښه رول لري

- د شحم پر اکسيد يشن لپاره ضروري دي

- د کو لسترو ل جوړيدني لپاره منگانيز ضروري دي .

غذائي ضرورت

د منگانيز ور ځيني ضرورت په قطعي ډول سره معلوم ند دي 2-9 mg\day کاهل انسان لپاره دي .

منابع : چاي ، پانه لرونکي سبزيجات ، ميري او زري

جذب : د خوراكي موادو ۳-۴ فيصده پوري منگانيز په نارمل حالت کې د کوچنيو کو لمو په وصيله جذبيري او اوسپنه يي جذب نهې کوي .

د پلا زما منگانيز

د سيروم منگانيز اندازه 5 – 20 mg \ dL ده دغه سيروم کې د يو ځانگړي انتقال انتقال د پروتين سره يو ځاي دي .

مر ضي حالتونه

- په ځيگر کې د شحمو تجمع
- د پانکرانس ډ بيتا د حجرو د فعاليت د کموالي سبب کيري .

جست

د انسان په عضویت کې تقریبا ۲ گرام مجموعي مقدار د جستو رسیري چې د پرو تاست غده د جستو څخه غني دي چې د ۱۰۰ ملي گرام پوري جست لري . په بنسټیز ډول سره جست یو داخل الحجروي فلز دي .

د جستو بیو شیمیکی د ندي

- جست د انزایمونوسره د یوې برخې په توگه دنده سرته رسوي لکه :الکلین ، یسمي تاز ، سو پر اکساید، کار بونیک ، انهایدريز ، الکول دې هایدرو جیناز او نور
- دا چې جست د سو پر اکساید دسمتیز انزیم په جوړښت کې شامل دي او نموریانزایم حجري د ازادو رادیکالو د خطر څخه ژغوري نولدي کبله جست د انتي اکسیدانت دنده هم تر سره کوي .
- د پا نکراس په بیتا حجرو کې د انسولین د جوړید نی او ذخیري لپاره د جستو شتون ضروري دي لکه Globin Zn Insulin او Protamine Zn Insulin کې.
- د انسولیدن افراز په زیاتوالي سره د پانکراس د جست د کموالی سبب کیږي او همدارنگه د شکري په نارو غي کې د جستو مقدار په پانکراس کې کمیږي .
- جست په ځیگر کې د ویتامین A سویه نارمل ساتي
- د جستو شتون دمناسب تکرر لپاره ضروري دي

منابع : دجستو منابع عبارت دي له : غو ښه ،هگي ،شیدی ، لو بیا او زري .

جذب : جست په اثنا عضو کې جذبیږي ، د جستو ذ خیره د حیواني منابع څخه په تنباتي منابع کې ښه صورت نیسي اود جستو جذب دمیتال تو نین پوري اړه لري .

د سیروم جست : په سیروم کې 100mg\dl جست شتون لري . په RBC کې جست د 1.5 mg\DI موجود دي .

مر ضي حالتونه :

- د جستو له کمښت له کبله Loos, Anemia , Poor Wound Healing او روحي تشوشاتو سبب کیږي .
- هغه روحي تشوشات چې په مزمنو الکولیک خلکو کې لیدل کیږی امکان لري چې د جستو د کمښت له کبله وي .

قندونه (Carbohydrate)

مونږ په دې څپرکي کې قندونه ، د قندونو پیدایښت او اهمیت ، د قندونو ډولونه ، مونوسکرایډونه ، ساده قندونو جوړښت ، د قندونو تعاملات ، د قندونو ارجاع ، د قندونو تحمض ، د قندونو تعامل دهایډروکسل امین سره ، د قندونو تعامل دهایډروجن سیاناید سره ، د قندونو تعامل د فینیل هایډرازین سره ، د اسیدونو عمل په قندونو باندې ، د گلوکوز تعامل د هایډروجن سیانایدو سره ، د گلوکوز تعامل دهایډروکسیل امین سره ، او د گلوکوز ارجاع په ساربیټول باندې ، د ساربیټول اهمیت د انسان په وجود کې ، د گلوکوز تحمض یا Oxidation په نتیجه کې گولوکونیک اسید جوړیدل ، د گولوکونیک اسید اهمیت او رول د انسان په بدن کې ، د گلوکوز تعامل د فینیل هیدرازین سره ، د گلوکوز تبادله په فرکتوز باندې ، د یو قیمت قندونو څخه ډای سکرایډ جوړیدل ، د یو قیمت قندونو څخه پولي سکرایډونو جوړیدل ، د گلوکوز اهمیت په عصبي سیستم کې ، د سکروز ماتیدل په گلوکوز او فرکتوز ، د مالتوز ماتیدل په دوه موله گلوکوز باندې ، د لکتوز ماتیدل په گلوکوز او گلکتوز باندې ، د قندونو مهم بیولوژیکي مشتقات ، پولي یول ، پنتوزونه ، ډای اکسی شوگر ، ډی مانوز ، نیورامیک اسید ، سیالیک اسید ، د قندونو او نورو موادو نسبتی خوږوالی ، د سکروز او نورو اولیگو سکرایډونو څیرنه ، کپټین ، نشایسته ، د نشایستی طبعی منابع ، گلایکوجن پارچه کېدل ، د کسټرانوز ، مخلوط پولي سکرایډونه ، گلایکوسایډونه ، په قندونو باندې د القلی تاثیرات ، ایټرجوړیدل ، د قندونو پیژندل د فېلنګ او بندکت محلولونو په واسطه ، د قندونو استر فکېشن ، د قندونو فاسفوریلېشن ، د یورانیک اسید ، نیورامیک اسید ، ډای اکسی شوگر ډای سکرایډونه ، سکروز ، مالتوز ، د شیدو قند یا لکتوز ، تټراسکرایډونه ، پولي سکرایډونه ، نشایسته او ډولونه یې ، د قندونو انقلاب ، د گلوکوز انقلاب ، فرکتوز انقلاب ، گلایکولایز ، گلایکوجن جوړیدل ، د گلایکوجن ماتیدل ، د گلایکوجن ذخیروي ناروغی ، سټریک اسید سایکل ، په تنفسی زنځیر کې د الکترون ترانسپورت سیستم ، په بدن کې د گلوکوز سوځیدل

په بدن کې د گلوکوز د سوځیدو تعاملات ، د پنتوز انقلاب ، گلاکتوز انقلاب ، د امین لرونکي قندونو انقلاب ، د کاربو هایډرینو د انقلاب نورې لارې ، د گلوکوز څخه د یست (خمیرمایه) په واسطه د الکولو جوړیدل ، د گلایکولایز زمعکوس عملی گلوکوز ترکیب ، د گلایکوجن ترکیب او د گلایکوجن ماتیدل ، د گلایکوجن د جوړیدو او ماتیدو کنټرول ، پنتوز فاسفیت ، گلوکونیوجنیشن ، د گلوکوز د انقلاب نورې لارې ، د گلکتوز انقلاب ، لابراتواری څیرنه ، څیرنیزه تجربه ، د شکرې ناروغی په برخه کې تدابیرونه ، او په اخر کې په عملی توګه په ۳۰۰ کسانو باندې د گلوکوز عملی څیرنه او د شوګر معیار په واسطه د گلوکوز مقدار معلومول شامل دي . پټه دې پاتې نه وی چې زما دغه څیرنیزه موضوع د ښوونې او روزنې پوهنځی دریم صنف ، د کرنې پوهنځی دریم صنف او د طب پوهنځی د دوهم صنف د بیوشیمی مضمون د درسي مفرداتو سره مطابقت لري او عملاً تدریس کېږي. د حیواني او نباتي پروتوپلازم جامدو موادو غوره برخه د عضوي مرکباتو درې مهم ټولګي جوړوي چې هغوي عبارت د قندونو، شحمیاتو او پروټینو څخه دي . حیوانات تل نباتات او نباتي محصولات او د نورو حیواناتو نسجونو څخه ګټه اخلي او قندونه د حیواناتو لویه غذايي برخه جوړوي ، څرنگه چې دا ډول مواد د عضوي مرکباتو ډیره مهمه برخه په حیاتي کیمیا کې ده. لدې کبله پوهیدل او څیړل یې په دې څیر نیزه رساله کې ډیر ضروري دي . (78:6)

26. 1. د قندونو پیدایښت او عمومي اهمیت

قندونه نسبت ټولو عضوي مرکباتو ته په طبیعت کې په زیاته پیمانه پیداکېږي، ځکه چې دا د نباتاتو ډیره لویه ساختماني برخې جوړه وي او هم تر یوې اندازې پورې د ټولو حیواناتو په عضویت کې پیدا کېږي، Cellulose یو ډیر مهم قند دی چې د لرګي او نباتي الیافو په جوړښت کې پیدا کېږي. نشایسته هم په زیاته اندازه په طبیعت کې شهرت لري. مخصوصا دا مواد په حبوباتو، میوه جاتو او نباتي ریشو کې د غذا یې ذخیرې په حیث پخپله د نباتاتو لپاره او هم د لویو قندي منابعو په حیث د انسانانو پواسطه په کارورل کېږي. sucrose یا بوره دگلانو په عصاره، میوه جاتو او په ډیرو نباتاتو کې مخصوصا په گڼیو او چغندرو کې پیداکېږي او په صنعت کې په زیاته اندازه د همدې منابعو څخه لاسته راځي پنتوز Pentosans په زیاته اندازه د نباتاتو د دانو په پوستکو کې لږې ساختمانونو او نباتي صمغو کې پیداکېږي، گلوکوسایډونه (Gluosides) چې د قندو د مشتقاتو څخه دي اکثره په نباتاتو کې پیداکېږي او یو شمیر ددوي د مهمو درملو دجملې څخه شمیرل کېږي پدې ډله کې د ایجنټیلز (digitalis) گلوکوسایډونه شامل دي چې د زړه د ناروغۍ د درمل لپاره زیات استعمالیږي، دوه ساده قندونه چې گلوکوز او فرکتوز دي تقریبا په کمه اندازه په ټولو نباتاتو کې پیدا کېږي، قندونه او دهغې مشتقات په ټولو حیواني نسجونو، د نسج مایع، وینه او په شیدو کې پیدا کېږي. همدارنګه په کم یا زیات مقدار په حیواني افرازاتو او اطراحیه موادو کې هم لیدل کېږي. زموږ ورځني خوراک د قندو مختلف ډولونه لکه نشایسته، dextrins، بوره او Lactose یا شیدو قند جوړوي تر څو چې دا مواد په گلوکوز، اویا د خپلو نورو ساده قندو په اجزاو باندې چې د جذب وړ دي بدل نه شي دعضویت لخوا په کار نه وړل کېږي. گلوکوز د وینې اود بدن د نورو مایعاتو یو اساسي قند دی دهغه مقدار په وینه کې تقریبا سل ملیګرامه په سل ملي لیتره کې دي او د diabetes mellitus په واقعاتو کې یې مقدار په وینه کې ډیرلوړ ځي چې د hyperglycemia په اصطلاح باندې یادېږي، کېدو وینې څخه گلوکوز اخلي او د هغې یو زیات شمیر مالیکولونه یو د بل سره وصلوي او یو polysaccharide چې glycogen نومېږي جوړوي، گلايکوجن یوه قندي ذخیره ده څه وخت چې د وینې د قند سویه د طبیعي حدودو څخه ټیټه شي دا ذخیره قند بیرته په گلوکوز باندې ټوټې ټوټې کېږي او وینې ته ځي، عضلات او نور نسجونه هم گلوکوز د گلايکوجن د جوړولو د پاره د وینې څخه راباسي او دا گلايکوجن د یو سلسله مغلقو کیمیاوي تعاملاتو پواسطه ماتېږي او ضروري انرژي د نسجونو دپاره برابروي، د وینې قند د مغزود نسج د پاره د یوې مستقیمې غذا په څیر وظیفه سرته رسوي، او د ضرورت په وخت کې هغه د دوراني وینې څخه اخلي د تیونو غدې گلوکوز د وینې څخه نیسي، گلوکوز د لاتین د gleukos له کلمې څخه چې د خوړشراب په معنا دي مشتق شوی، او یوه برخه یې په بل ساده قند چې

galactose نوميزري بدلوي ، وروسته يو ماليکول د گلکتوز د گلوکوز د يوه ماليکول سره يو خای کېږي لکتوز ياد شيدو قند جوړوي، گلوکوز د ټولو نسجونو پواسطه د انرژي د برابرولو د پاره سوخي او تقريباً د عضويت د نيمايي نه زياته انرژي د گلوکوز د سوخيدلونه لاسته راځي ، کاربوهايډرېټونه په يو ژوندي ماده کې ډيرې مهمې وظيفې سرته رسوي ، د مثال په توگه ځيني ساده قندونه د purines, pyrimidines او phosphate سره وصلېږي، nucleic acid جوړوي، يا دوي د پروټينوسره نښلي او glycoproteins جوړوي يا د Lipide سره وصلېږي glycolipids جوړوي او يا يې د ځينو الکولو سره وصلېږي glycol alcohol جوړوي او يا د نورو عضوي گروپو او sulfate سره وصلېږي mucopolyscharide او د کاربوهايډرېټ نور مربوطه مشتقات جوړوي ، اودوی د قندو د ډيرو مهمو بيالوجيکي دندو يو څو غوره مثالونه وو چې يادونه يې وشوه ، لکه څنگه چې پورته ذکر شول د وي د گلوکوز او د گلايکوجن په څير د حيواني عضويت د پاره د انرژي لمرني منبع ده ، نشايستي چې د photosynthesis د عمليې پواسطه جوړېږي په نباتاتو کې د ذخيره شوي انرژي غوره بڼه دي ، د سلول په څير دوی د نباتاتو د حجري cell wall برخه جوړوي ، دوی د مغلقوپوليميرو په څير د مايکرو اورگنيزمو خارجي محافظوي cell wall جوړوي، د گلوکوز د ميتابولايټوپه څير دوی د ډيرو حياتي بيولوجيکي موادو د biosynthesis لپاره لمرني مواد برابروي ، پدې جمله کې پيوريټونه، پريميډينونه ، ځني امينواسيدونه ، cholestrol. Porphyrins او مشتقات يې ميوکوپولي سکرایډونه گلايکوجن پروټينونه، گلايکولېپيدونه ، دغوريو د وړې برخې يعني گليسرول او شحمي اسيدونه ، د شيدو قند (لکتوز) ویتامين C، د krebs citric acid cycle اسيدونه او ډير نور شامل دي. (89:3).

2.26 د قند ونو تعريف

قندونه هغه کيمياوي مرکبونه دي چې د کاربن هايډروجن او اکسيجن څخه جوړ شوي دي ، د هايډروجن او اکسيجن د اتومونو شمير په ټولو قندونو کې لکه څنگه چې په اوبو کې دي په عين نسبت يا تقريباً په عين نسبت دي ، نو له دې کبله په اولو وختو کې دې ډول موادو ته د کاربوهايډرېټ (کاربن هايډرېټ) اصطلاح ورکړ شوې وه ، د گلوکوز ماليکولي فارمول $C_6H_{12}O_6$ دی، او د کاربن هايډرېټ په شان $C_6(H_2O)_6$ ليکل کېدای شي ، خو د جوړښت له نقطې نظره بيخي غلط دی، ډير نور مواد چې قندونه نه دي اما د هايډروجن او اکسيجن د اتومونو شمير په هغو کې د اوبو په تناسب دي مثالونه يې اسيتيک اسيد، لکتیک اسيد، فارم الډ يهايد او داسې نور دي ، همدارنگه په ځينو قندو کې لکه $(C_6H_{12}O_5)Rhamnose$ کې دا تناسب نه ليدل


کپري نو دکاربوهاید ریت اصطلاح غلطه ثابتوي نوبهتره دا ده چې دا ډول مواد د glucides یا polyhydroxyalcohols چې فعال الیهاید یا کپتون گروپونه لري په نوم یاد کړل شي(25:2).

3.26 د قندونو طبقه بندي

کله کله قندونه د saccharides په نوم هم یادېږي د سکر اید کلمه د لاتیني کلمې (sakcharon) څخه چې د قند په معنا ده مشتق شویده ، ځینې قندونه لکه گلوکوز او فرکتوز چې په ساده مرکباتو باندې هایدرو لېز کپري نه د ساده قند یا monosaccharides یا monosaccharoses په نوم یادېږي یا ډیر ساده mannose په نوم یادېږي ، ځنې قندونه د دوه مالیکوله ساده قندو څخه جوړ شوي دي لکه سکروز ، لکتوز ، مالتوز ، او داسې نور، دوی د disaccharides یا disaccharoses په نوم یادېږي همدارنگه ترای سکر ایدونه او تتراسکر ایدونه په ترتیب سره د درې او څلورو ساده قندو د مالیکولو څخه جوړ شوي دي ، هغه قندونه چې د یو زیات شمیر ساده قندونو څخه جوړ شوي دي (نشایسته، گلایکوجنونه، سلولوزونه او داسې نور) پولي سکریډو یا polysaccharoses په نوم یادېږي، ټول هغه قندونه چې د دوه یا د زیاتو ساده قندونو د مالیکولو څخه ترکیب شوي وي د هایدرو لایزورډي او هایدرو لایزې د حرارت پواسطه د رقیقو اسیدو او یا د خاصو انزایمونو پواسطه په اسانۍ سره صورت نیسي، Hydrolysis د یو مرکب د ماتولو په معنا ده د اوبو په موجودیت کې یا د اوبو په علاوه کولو سره اویا د هغې ایونونه په محصولاتو باندې، ساده قندونه د کاربن د دوو څخه تر لسو پورې اتمونولري چې په ترکیبي (ډول) صورت هم جوړ شويدي او هم د یو یو په طبیعت کې پیدا کېږي ، د وی یا هایدروکسي الیهایدونه او یا هایدروکسي کپتونونه دي او نوم ایښودنه بېداسې شوې چې هم د کاربن د اتمونو شمیر او هم د الیهاید یا کیتون گروپونه یې په څرگند ډول پوهیدل کېږي لکه glycolic aldehyde (CHO-CH₂OH) چې ډیر ساده مرکب دي د قندو نوم لاندې تصنیف شوي دي، څرنگه چې دا ماده دوه اتمونه د کاربن لري نولډې کبله د aldose په نوم یادېږي او هم

څرنگه چې د الډيهايد گروپ لري نو د aldose په نوم ياديږي ، د دې د پاره چې هم د الډيهايد گروپ او هم د کاربن اتومونه يې د واره وبنودل شي د aldodiose په نوم ياديږي .

څرنگه چې گلايکوليک الډيهايد پخپل جوړښت کې غير متناظر کاربن نلري نو يوازې په يوه ښکله وجود لري په بله ژبه او پتيکي ايزومير نلري . همدارنگه Glycered aldehyde چې درې اتومه د کاربن او



يو د الډيهايد گروپ لري د aldotriose په نوم ياديږي گلوکوز شپږ اتومه د کاربن او د الډيهايد يو گروپ لري د aldohexose په نوم ياديږي، هغه قندونه چې د ketone گروپ لري د ketoses په نوم ياديږي لکه dihydroxy acetone چې درې اتومه د کاربن او يو د کيتون گروپ لري يو ketotriose دي، فرکتوز شپږ اتومه د کاربن او يو د کيتون گروپ لري نو د ketohexose په نوم ياديږي (333:8).

4.26 ساده قندونه يا مونوسکرايدونه

هغه قندونه چې د هايډروليز وړندي ، زيات شمير يې په طبيعت کې پيدا کيږي او هم په ترکيبي ډول تهيه شوي دي ، د دوی ډير مهم پنځه او شپږ کاربن لرونکي قندونه دي ، د وي جامد او بلوري مرکبات دي چې په اوبو کې حلېږي ، کم يا زياته اندازه خوړ خوند لري ، ټول يې د ځيني فلزاتو قلوي محلولونه لکه د مس او نورو د ارجاع کولو خاصيت لري او هم د الډيهايدو په شان د فينيل هايډرازين، HCN او NH₂-OH (هايډراکسيل امين) سره تعامل کولای شي، ساده قندونه د کاربن د اتومونو د شمير په اساس چې د هغوی په ځنځير کې دي په لاندې ډول ویشل شوي دي .(430:4).

۱-۲۶ جدول یو قیمتته قندونه څرگند وي.


Diose	دوه کاربن لرونکې	$C_2H_4O_2$	An aldolase
Triose	درې کاربن لرونکې	$C_3H_6O_3$	Glyceraldehydes an aldotrose Dihydroxylacetone an ketotrose
Tetriose	څلور کاربن لرونکې	$C_4H_8O_4$	Erythrose an aldotetrose
Pentose	پنځه کاربن لرونکې	$C_5H_{10}O_5$	Xylose (an aldopentose Xylulose (a ketopentose(
Hexose	شپږم کاربن لرونکې	$C_6H_{12}O_6$	Glucose (an aldolase) Fructose (a ketolase(

5.26 اولیګوسکرایډونه (Oligosaccharides)

اولیګو سکرایډونه د (Oligos) کلمې څخه چې .څومعنا لري مشتق شويدي ، دوي جامد او بلوري مواد دي چې په اوبو کې حلېږي او خوړ خوند لري (2;36).

(۱)- ډای سکرایډونه

عموما د دوو شپږ کاربن لرونکي ساده قند و د یو ځای کېدو څخه جوړ شويدي چې د هایډرولیز څخه یې دوه مالیکوله مونو سکرایډ ونه حا صلیږي.



ډای سکرایډونه یو د بل څخه اختلاف لري او د دوی دا اختلاف نه یوازې د ساده قندو له نظره ندي بلکه د ساده قند و د یو ځای کېدو له نظره هم یو د بل سره مختلف دي، مثلاً دوه ډوله ډای سکرایډ ونه چې دواړه یې مختلف دي مګر یوشان خواص لري اما د هایډرولیز نه وروسته عین دوه ساده قندونه ورکوي چې هغه sucrose او turanose څخه عبارت دي ، تورانوز د ارجاع کولو قوه لري پداسې حال کې چې سکروز ارجاع کوونکی ندي، همدرانګه د ویلي کېدو ټکي یې هم سره اختلاف لري ، که د دې دوو قند و څخه هر یو یې هایډرولیز شي د هایډرولیز محصول یې یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز دي قندونود یو ځای کېدو سکرایډونه په لاندې ډول دي (6:219).

٢٦-٢ جدول د د وه قيمته قندونو اجزاوي معرفي کوي

نوم	ماليکولي فارمول	ساده قندو اجزاوی
Sucrose	$C_{12}H_{22}O_{11}$	Glucose: Fructose
Turanose	$C_{12}H_{22}O_{11}$	Fructose: Glucose
Lactose	$C_{12}H_{22}O_{11}$	Glucose: Galactose
Melibiose	$C_{12}H_{22}O_{11}$	Glucose: Galactose
Celibiose	$C_{12}H_{22}O_{11}$	Glucose : Glucose
Gentobiose	$C_{12}H_{22}O_{11}$	Glucose : Glucose
Trihalose	$C_{12}H_{22}O_{11}$	Glucose: Glucose

په دې جمله کې سکروز او تراي ها لوز ارجاع کوونکی ندي نور ټول يې ارجاع کوونکي دي.

(٢) - تري سکرايد ونه ($C_{18}H_{32}O_{16}$)

د هايدرو ليز په اثر درې ماليکوله ساده قند و نه ورکوي

د ساده قندو د اجزاوو نوم

Fructose. Glucose. GalactoseRaffinose

Fructose. Glucose. Glucose.Gentianose

Glucose.Galactose.GalactoseMannotriose

په دې جمله کې يواځي مانو ترايوز ارجاع کوونکي دي.

(٣) - تترا سکرايد ونه ($C_{24}H_{42}O_{21}$)


د ساده قندو د اجزاوو نوم :

Fructose. Glucose. Galactose. GalactoseStaohyose


د ا قند ارجاع کوونکي ندي.(9: 81).

7.26 پولي سکرایدونه


هغه قندونه دي چې د هايډروليز په اثر د ساده قندو زيات شمير ماليکولونه ورکوي ، د دې موادو ماليکولونه ډيرلوی دي ځکه چې د ساده قند ود يوه زيات شمير ماليکولونو د polymerization څخه جوړشوي دي. په عمومي ډول دوی تبلور نکوي بلکه بې بنسکه جامد دي ، خوړخوند نلري او د قند و هيڅ و صفي تعاملات نه ورکوي، څرنگه چې ماليکول يې ډير لوی دي نو کله چې په اوبو کې حل شي کلويډي محلولونه جوړوي، دوی د اسېد و او يا د خاصو انزایمو په واسطه په خپلو مو نو سکرایډو باندې هايډروليز کېږي هغه پولي سکرایډونه چې ديوه ډول مونو سکرایډ پو ليمری وي د Homopolysaccharide په نوم او هغوي چې د مختلفو قندونو اویا د قندونو د مشتقانو پوليميروی heteropolysaccharises په نوم یاد يږي د دوي يو زيات شمير په نباتاتو کې او ځيني نوريې په حيواني انساجو کې پيدا کېږي. (54:10) مثال :



د دې مرکباتو عمو مي فارمول داسې ښودل کېږي چې د مونو سکرایډ فارمول ته په قوس کې ځای ورکول کېږي او د قوس په خارج کې د X یاد N حرف چې د ساده قند ماليکولونه راښی او د هايډروجن او اکسیجن منفي کېدل چې معادل د X-1 molecule اوبه دي لیکل کېږي ، د مثال په ډول که يو پو لی سکرایډ د پنتوز څخه جوړشوي وي فارمول يې په لاندې ډول ښودل کېږي:



که چیرې شل ماليکوله د پنتوز موجود وو چې په دې صورت کې د هغې حقیقی فارمول په لاندې ډول



(۱) - پولي پنتوزانونه (Polypentsans)

د ساده قند و اجزاوونو م

Arabinose Araban

Xylose Xylan

(۲) میتیل پنتوزانونه $(C_6 H_{12} O_5)X - (X - 1) H_2 O$

د ساده قند و اجزاء نوم

Rhamanose


Rhaman

۲۶-۳ جدول هگزوزانونه $(C_6 H_{12} O_6) X - (X - 1) H_2 O$

نوم	د ساده قند و اجزاء
Cellulose	N Glucose
Starch	N Glucose
Glycogen	N Glucose
Dextrins	N Glucose
Lichonin	N Glucose
Dextran	N Glucose
Inulin	N Fruotose
Galactan	N Galactose
Mannan	N Mannose

سربیره په پورتنیو پو لی سکرایډ و چې د پنتوز او هگزوزو څخه ترکیب شوي دي ډیر نور مواد هم پیژندل شوي دي چې مختلف پنتوزونه او هگزوزونه لري ، په دې جمله کې نباتي صمغونه لکه ، Pectins. Hemicellulose. Muilsge شامل دي د مثال په ډول که د چغندر پکتین هایډرولیز شي د هایډرولیز څخه یې یو پنتوز (ارابینوز) یو هگزوز (گلکتوز) یو اسیدی قند (galacturonic acid) استیک اسید او متیایل الکول لاسته راځي.(87:3).

7,26 د ساده قندو جوړښت



د لته د گلوکوز ساختمان ته زیاته پاملرنه شوی ځکه چې یو مهم فزیالوژیکي قند دی نو یې په کیمیا باندې پوهیدل اوکوم مناسب چې د نورو فزیالو جېکي مرکباتو سره یې لري نو اړینه ده هغه وپېژنو چې گلوکوز یو الدو هگزوز دی، مالیکولي فارمول یې $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ دی ساختمانې فارمول یې د د و نورو ساده قند و سره چې یو یې الد و پنتوز اوبل یې کېتوهگزوز دی مشابهت لري. دوه نور الدو هگزوز ونه چې فزیالو جېکي اهمیت لري د گلکتوز او منوز څخه عبارت دي، سربیره په رایبوز دوه نور الدو پنتوزونه چې یو یې ارایبوز او بل یې زایلوز دي په ډیرو نباتاتو کې پیدا کېږي، همدارنګه ددې قند وځینې مشتقات ډیر په زړه پورې دي چې وروسته به و څیړل شي سره لدې چې گلوکوز، گلکتوز او منوز هر یو شیراتومه د کاربن، پنځه هایدراکسیل ګروپونه او یو د الد یهاید ګروپ په خپل مالیکول کې لري خو بیا هم په خپل منځ کې یو د بل سره فرق لري نو باید د دوی اختلاف د ګروپو په ترتیب په مالیکول کې وي. (2: 79).


8.26 غیر متناظر

د ګروپو په ترتیب کې دا اختلافات د دې حقیقت په اساس دی چې ټول قندونه په خپل جوړښت کې د غیر متناظر کاربن اتومونه لري، غیرمتناظر کاربن د کاربن هغه اتوم دی چې د څلورو مختلفو اتومو یا د څلورو مختلفو ګروپو سره نښتي وی، که د کاربن یو اتوم د څلورو رابطو سره په فضا کې په څلورو مختلفو جهتو رسم شي او هر یو یې په څلورو مختلفو اتومو یا د Q.R.S. T. ګروپو سره پیوست شوي وی نو واضح دي چې یو مشابه بڼکل نه مګر ممثله د هغې جوړېدې شي، دا دوه شکلونه د عین نسبت خا وندان دي څرنگه چې یو شي اینوي تصویر لري لدې کبله چې مماتل ندی نو کولای شو چې د دوی د نه منطبق کېدو څخه یو په بل باندې اثبات ته ور سوو، دلته دوه مشابه مرکبات دي خو څرنگه چې کاربو نونه

يې غيرمتناظر دي نو يو د بل سره اختلاف لري ، دا دوه فر ضی مرکبونه چې درېنودل شويدي هند سی ایزومرونه یا

(Greek.Oppositioanms) Enantiomorphs یا (Gr.Stereos.Solid) Stereoisomers

هغه نسبت چې ددې مرکباتو په واسطه بنودل شويدي د Stereoisomeris په نوم یاد يږي، په بله ژبه د دوی isomerism د فضا يي مناسباتو په اساس څرگند يږي دا خاص ډول optical - stereoisomers isomers نوري ایزو میرونو په نامه یادېږي ځکه ټول هغه مرکبات چې د غیر متناظر کار بنو لرونکي دي د polarize شوي رڼا د سطحې د ګر ځو لو قوه لري.(76:4).




9.26 د غیر متناظر کاربن موډل اود هغې ائینوي تصویر

د یو مرکب او پټیکې فعالیت بنی چې مالیکولونه یې په ائینوي تصویر باندې د منطبق کېدو وړ نه وي ، هغه مرکب چې مالیکولونه یې په ائینوي تصویر باندې منطبق کړای شي او پټیکې فعالیت نه بنی، نو د یوه مرکب ائینوي تصویر عین خواص لري کوم چې حقیقي مالیکول یې لري ، لکه د ویلي کېدو، ایشیدو ټکي یې ، حلیدل او داسې نور ، د دې دوو مادو یواځې اختلاف Optical rotation کې دي د داسې ایزومیرو محلولونه پولرایز شوي رڼا (polarized light) ګرځوي که یوې رڼا بنی خوا ته په معینه درجه وګروي بل یې رڼا په عین درجه چې خوا ته ګرځوي کله چې Enantiomers یو د بل سره محلول شي هغه Rotation چې د یو ایزومیرد مالیکول د یوه مساوي او متقابل Rotation پواسطه خنثی کېږي. نو د انا نټیو میرو مساوي مخلوط ته Racemate وایي او په پولرایز شوي رڼا باندې فعالیت نه لري.


هغه او پټیکې ایزومیرو نه چې انانتیومیرنه دي د (diastereoisomers)(diastereomers) په نوم یادېږي ، دوی مختلف فزیکي خواص لري . لکه دویلی کېدو او ایشیدو ټکي یې، حلیدل په یوه ټا کلی

حلونکې کې او نوريې سره توپیر لري همدارنگه خصوصي دور (specioifiorotation) یې سره تفاوت لري ، اما امکان لري چې مشابه یا مخالفې دورې علامې ولري او ځینې یې غیر فعال دي.

Diastereoisomers (استیرو ایزو میریزم) عین فعال گروپونه لري نو له دي کبله مشابه کېمیا وي خواص رابښی خو دا کېمیا وی خواص مماثل ندي ، د مثال په ډول هر diastereoisomer د یوه ټاکلی معیار سره په مختلفو سر عتوکی تعامل کوي ، مخکې مووویل چې ټول قند ونه غیر متناظر کاربنونه لري دمثال په ډول یو ډیر ساده الیهادي قند چې گلیسروز دي بنودل کېږي ، که ساختماني فارمول ته یې پام وکړو لیدل کېږي چې د منځني کاربن اتوم یې غیر متناظر دي.



نو دوه stereoisomers یې ممکن دي ، دا دواړه پیژندل شوي دي یو یې D-glycerose دي چې پولرایز شوي رڼا +13.5 درجې ښې خو اته گرځوي یعنې dextrorotatory دي او دویم یې L-glycerose دي چې پولرایز شوي رڼا په عین درجه چې خوا ته گرځوي (-13.5) یعنې levorotatory دی ښایې پوه شي چې په D-glycerose کې د OH گروپ په غیر متناظر کاربن باندې چې د اخیرني CH₂ OH په مجاورت کې دي ښې خوا ته پروت دي ، او دا گروپ په L-Glycerose چې خوا ته پروت دي ، د گروپو د موقعیت دا اختلاف ډیر مهم دي ځکه داسې گمان کېږي چې ټول هغه قندونه چې اوږد ځنځیر لري د D- او د L- گلیسروز څخه مشتق شويدي که د OH گروپ موقعیت کتل د هغه کاربن په مخ باندې چې د اخیرني الکول گروپ په مجاورت کې ځای لري ویل کېږي چې د (D) له ډوله څخه دي یا که د (L) څخه د D یا د L حرف چې د یو قند د نوم د مخه لیکل کېږي دا مفهوم نلري چې رڼا ښی یا چې خوا ته گرځوي ، بلکې د هغه ساختماني مناسب D- یا د L- گلیسروز ته ښی د دي مطلب د پاره د (+) او د (-) علامې څخه استفاده کېږي ، د مثبت علامه dextro او د منفي علامه levo مفهوم لري.



که چیرې په یو مالیکول کې د یوه غیر متناظر کاربن څخه زیات موجود وي نو د دې مالیکول د ممکنه ایزومرونو شمیر زیاتېږي leBell او D+L van. T hof د ایزومرونو شمیر په 2N سره بنودل شوي دي د N حرف د غیر متناظر کاربن شمیر رابښی، د یوه الدو هگزوز د فارمول څخه معلومیږي چې څلور غیر متناظر مرکزونه لري په دې ترتیب ۲۴ یا ۱۶ ممکنه ایزومرونه یې موجود دي، نو په اسانۍ سره پوهیدای شو چې ولې گلوکوز، گالکتوز او منوز الدو هگزوزونه دي او یو د بل سره توپیر لري همدارنګه فرکتوز چې یو کټو هگزوز دي او پولرایز شوي رڼا چېې خوا ته ګرځوي ولې د D-فرکتوز په نوم یادېږي (90:6).

11.26 د ساده قندونو جوړښت

څرنگه چې گلوکوز د aidoes یو وصفي قند دی نو دلته هغه نسبتاً په مفصل ډول څیړل کېږي.

جوړښت: گلوکوز $C_6H_{12}O_6$ یو مالیکول فارمول لري د هغه جوړښت د لاندې کیمیاوي او صافو څخه څرګند شوي دي.

الف: که چیرې د هایدروجن ایوډاید او فاسفورس سره ارجاع شي N-hexane راکوي، بنا پر دې ټول د کاربن اتومونه یې چې یو مستقیم ځنځیر یې له څانګې څخه یو د بل سره نښتي دي.

ب: گلوکوز د hydroxylamino سره تعامل کوي او monoxime جوړوي یا یو مول Cyanide په هغه باندې علاوه کېږي چې cyanhydrin جوړکړي دا د یو کاربونیل ګروپ موجودیت رابښی.


ج: گلوکوز د خفیف اکسیدیشن پواسطه لکه د Br پواسطه په buffer شوي ابې محلول کې monoboxalic gluconic acid بد لیري، څرنگه چې د کاربن کوم اتوم یې نه ضایع کېږي بنا پر

دي د کاربو نیل گروپ د یو الیهاید په شکل وجود لري چې یواځې د ځنځیر په اخر کې ځای نیولی شي
(killiani experiment)،


د : دارجاع په اثر د sodium amalgug سره په هغه کې د هایډروجن دوه اټومونه علاوه کېږي.

C₆ H₁₄ O₆ جوړوي چې دا مرکب د Sorbitol په نوم یادېږي ، سوربیتول Aceticanhydrid سره وي او یو hexacetate جوړوي، بنا پر دې د سور بیتول شپږواړه د اکسیجن اټومونه د شپږو هایډراکسیل گروپو په څیر موجود دي هغه مرکبونه چې دوه هایډراکسیل گروپونه په عین کاربن باندې ولري ډیر غیر ثابت دي او هغوی چې پیژندل شوي دي په ډیر اسانۍ سره اوبه ضایع کوي ، حال دا چې سوربیتول په اسانۍ سره نه dehydrate کېږي ، بنا پر دې په هر یو د دې شپږو اټومونو د کاربن باندې یو د هایډروکسیل گروپ ځای لري، څرنگه چې د گلوکوز د الیهاید گروپ د ارجاع کولو په اثر یو نوی هایډراکسیل گروپ تشکیل شویدی نود گلوکوز ساختمان داسې بنودل کېدای شي :-HO-CH₂-(CHOH)₄-C=OH



ډیر isomerio aldohexoses عین تعاملاتو ته تللي شي چې دا هم عین جوړښت رابښی، بنا پر دې دوي د گلوکوز stereoisomers دي.څه وخت چې HCN په یو حقیقي الیهاید باندې علاوه شي




ځنځیر په یوه اټوم کاربن ازادیږي. هغه تعاملات چې killiani په تجربو کې شامل وو په لاندې ډول بنودل کېږي:




د فرکتوز ما لیکولي فارمول د گلوکوز په شان $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ دي څه وخت چې Killani دا قند HCN سره معامله کړ Fruotose cyanhydrin جوړ شو، دا ماده د هایدرولیز پواسطه په یو هایدروکسیل اسید او ارجاع پواسطه د سره په یو hepton ic acid چې منشعب ځنځیر لري بدلیری نوموړې مولف د دې منشعب ځنځیر په جوړیدو سره په اثبات ورسوله چې فرکتوز یو کپتوز دی د پنتو زگروپ په دوهم کاربن کې ځای لري ، کله چې د هایدروجن سیاناید سره تعامل وکړي داسې سیانادایتونه چې منشعب ځنځیر لري جوړوي(32.9).



هغه تعاملات چې کپلیاني د هغې پواسطه د فرکتوز ساختمان ثابت کړه په لاندې ډول دي:




د کپلياني د فارمول څخه چې د گلوکوز د پاره يې تثبيت کړي دي معلومېږي چې دا قند د کاربن څلور غیر متناظر اتومونه (د ۲، ۳، ۴، او ۵، کاربن اتومونه) لري، بنا پر دې د دې فارمول ۲۴ يا ۱۶ ممکنه stereoisomers موجود دي چې يو د بل څخه د H او OH د گروپو په ترتيب کې چې د غیر متناظر و کاربنو پورې نښتې دي توپير لري، اوس ټول دا الدو هگزوزونه پيژندل شوي دي او هغوی جوړښت تعين شويدي، دا مسله د الد و پنتوز و، الدتتروزو او الدو ترايوزو په باره کې هم حقيقت لري، وروسته EmilFischer او د ده شاگردانو د ساده قند و ښکلوڼه تثبيت کړل، په داسې ترتيب چې دوی د H او OH د گروپو موجوديت د غیر متناظرو کاربنو په گرد چاپير کې او د گلوکوز (D) او (L) ښکلوڼه ثابت کړل، او هم يې د نورو ساده قند و ښکلوڼه هغې ته، وښودل. فيشر په خپل شخصي قضا و ت د گلوکوز D او L ښکلوڼه داسې وښودل:




نو د فشار د نظر يې په اساس هغه ساده قندونه چې جوړښت يې په D- Glucose پورې مناسبت لري د D-Sugars په نوم او هغوی چې په L-Glucose پورې مناسبت لري د L-Sugars په نوم ياديږي. Rosanops، يو بل بهتر سیستم منځته راوړه، ده په دې سیستم کې د الډيهايډي قند و ساختمان aldetrose ته نسبت ور کړيدی مخکې ذکر شوه چې D-او L- گليسرورز په خپل ماليکول کې يواځې يو غير متناظر کاربن لري.

نو د پور تنیو فارمولو څخه څرگنديږي چې د H او د OH د گروپونو ترتيب د D او L- گليسرورز د غيرمتناظر کاربن په مخ باندې يوشان دي، د D-او L- گلوکوز د پنځم کاربن د H او د OH گروپونو د ترتيب په شان دي له همدې کبله ټول قندونه د D او L-گليسرورز مشتقات بلل کېږي.



دا سیستم نسبت ټولو ته معقول تر دې، ځکه کولای شو چې څلورکابن لرونکي پنځه کاربن لرونکي شپږکاربڼ لرونکي او داسې نور قند ونه د D او L- گليسرورز څخه د HCN د عمل پواسطه چې په لاندې ډول خلاصه شويدي په لاس راوړو: (89;10)


کله چې HCN د الډيهايډ په يوه گروپ باندې علا وه شي يو غير متناظر کاربن جوړيږي اودوه Cyanhyrins ورکوي .




An aldehyde

Cyanohydrin

فرضا كه HCN په D- گليسرولز باندې اضافه شي دوه cyanhydrins جوړوي.
 كله چې دا سيانايډونه رينونه هايډروليز شي دهغې مربوطه اسيدونه جوړوي.




كله چې د دې اسيد و د كار بو كسيل گروپونه په الډيهايډي گروپونو باندې ارجاع شي دوه الډوتروزونه جوړيږي:




D-Glycerose

(66:3)




l-Glycerose

څه وخت چې HCN د D-erythrose سره معامله شي او پورتنې عملیه تکرار شي دوه الډوپنتوزونه جوړیږي:




D-Arabinose




D- Ribose

همدارنگه D-Threose هم دوه ډوله پنتوزونه ورکوي:



D- Lyxose




D- xylose

بناءً پر دې هر یو د دې څلور ډوله پنتوزونه په دوه ډوله D-Hexoses باندې بدلیری او مجموعاً اته – D هگزوزونه راکوي همدارنگه که د اتعاملات د L – گلیسروز سره شروع شي یو شمیر نور قندونه منځته راځي چې دا د هغه قند و ایښوي تصویر یا اپتیکی ایزومرونه دي کوم چې له D – گلیسروز څخه جوړشوي لکه دوه L – تتروزنه څلور L – پنتوزونه او اته L – هگزوزونه د D او د L د سلسلې مجموعي قند ونه څلور تتروزونه اته پنتوزونه او شپاړس هگزوزونه تشکیلوي پورته بڼکل د D او L گلیسروز جنسي نسبتونه د D او د L الډوزو د روزانوف د سیستم په اساس رابڼی د هایډراکسېل ګروپ موقعیت د اخرنی غیر متناظر کاربن چې د قند د پرایمري الکول ګروپ نه وروسته ځای لري رابڼی چې قند د D یا L گلیسروز څخه مشتق شويدي ،که چیرې دا هایډراکسېل ګروپ یې بڼی خواته پروت وي قند د D – گلیسروز څخه مشتق شوي او یو D-Sugar دي او که چیرې دا OH ګروپ چې خواته پروت وي قند د L – گلیسروز څخه مشتق شوي او یو L-Sugar دي.


D او د L- الوزو ائینوي تصویر مناسبت په دویم ښکل کې لیدل کېږي ، D- گلوکوز او L- گلوکوز په ترتیب سره پولرایز شوي رڼا ښي او کېږي خواته ګرځوي ، ښايي پوه شي چې د قند د ګرځیدو سمت برعکس د پېشو ند (Prefix) کېدای شي مثلاً د D- او د L- ارابینوز D- او L- فرکتوز ، D- فرکتوز چې عموماً د Levulose په نوم یادېږي یو قوي levorotatory قند دی.

د یا دوني او تأکید وړ ټکي دا دی چې د (D) او (L) پېشوند چې د قند د نوم څخه مخکې لیکل کېږي یواځي او یواځي د هغې ساختماني مناسبت D- او L- ګلیسروز نه رابڼی نهډقند د ګرځیدو سمت، په نظري توګه یو زیات شمیر کېتوزونه موجود یدای شي څو قسمه یي په طبیعت کې موجود دي او هم یو شمیر یي په ترکیبي توګه تهیه شويدي د هغوی ډیر ساده کېتوتري او (دای هایدراکسی اسیتون) دي ، فرکتوز چې یو کېتو هګروز دي په طبیعت کې په ازاد او متحد ښکل پیدا کېږي .


کېلیا نی ثبوت کړله چې فرکتوز یو کېتو هګروز دي (تیرمخ دي وکتل شي) دا ګروپ په دویم اتوم د کاربن باندې ځای نیولې دی وروسته امیل فیشر د H او د OH د ګروپو موقعیت د غیر متناظر کاربنو په مخ تثبیت کړل: فیشر د خپل کار په لمریو وختو کې کشف کړله چې phenylhydrazine د قند سره تعامل کوي . hydrazone او osazone جوړ وي ، او زازون نسبتاً کم منحل دي ښه تبلور کوي او په اسانۍ سره جلا کېږي دا تعامل د فینيلي هایدرازین سره د قند و د تشخیص د پاره په یوه مخلوط کې او هم د قند د ښکل د تعینولو د پاره استعمالیږي د فینيلي هایدرازین تعامل د D- گلوکوز سره په لاندې ډول ښودل کېږي.




په همدې ترتيب منوز ، گلکتوز ، او رابینوز ، په ترتيب سره په منانیک ، گلکتانیک ، او رابانیک اسیدو باندې او کسیدایز کېږي. (12: 720).



کېتونونه د برومین د اوبو پواسطه په اسانۍ سره نه اکسیدایز کېږي که څوکانیک اسید ته حرارت ورکړي شي خپلې اوبه ضایع کوي او د γ gammalactone (یا δ deltalactone) یو مخلوط لاسته راځي لکتون د داخلي استر (inner ester) په معنا دی او یوه پنځه ضلعي یا شپږ ضلعي حلقه تشکیلوي.




د څلوکو نیک اسید او د هغه د لکتوز تر منځ په ابي محلول کې یو توازن برقرار ږي ، نور اسیدي قندونه چې پنځه یا زیا تره د کاربن اتومونه لري هم مشابه لکتونونه جوړوي ، څلور کاربن لرونکي اسیدونه یواځې ګامالکتون جوړوي شي ، کله چې یو اسیدي قند د سوډیم له ملغمې (Na Hg) سره د رقیق سلفوریک اسید په موجودیت کې معامله شي په مربوطه قند باندې ارجاع کېږي ، کله چې د الدانیک اسید و د کلیسم مالګې د هایدروجن پر اکساید سره د فریک (Fe³⁺) ایونو (د کتلیست په حیث) په موجودیت کې او کېسیدایز شي کاربن ډای اکساید ازاد ږي او یو پنځه کاربن لرونکي قند تشکیلېږي:




په طبابت کې کلسیم گلوکونیټ د کلسیم د یوې منبع په حیث تطبیقوي، د هغې محلولونه د داخل وړیدي زرقو په صورت کې د وینې د کلسیم د پورته وړلو له امله ورکول کېږي. (89:1).

(ب)- سکریک اسیدونه یا Aldaric acids ' Glycaric acids الدوزونه د اکسیدیشن په اثر په مناسبو شرایطو کې د تودو HNO_3 پواسطه په aldric acids بدلیږي، پدې اکسیدیشن کې هم د الد یهاید گروپ او هم د پرایمرې الکول گروپ دواړه د کاربوکسیل په گروپونو بدلیږي:




که د الداریک اسید و څخه یو مالیکول اوبه ضایع شي saccharlacotone لاسته راځي چې اخیرني مرکب د ارجاع په اثر د سودیم د ملغمې سره په یوه uranic acid بدلیږي مثلاً.




14.26 يورانيک اسيد ونه


که يو الدوز پداسي يو ترتيب اکسيد یشن شي چې د الکول لمړني گروپ بي له دې چې د الیهاید گروپ بي اکسیدایشن شي يو یورانیک اسید تشکیلیږي ، د دې کار د اجراء د پاره په لابراتوار کې الیهایدي گروپ مخکې لدې چې اکسیدیشن شي په یو گلوکوساید او یا د 1'2'-O- Sopypyliddene -D-Glucose استون ډوله مشتق د جوړولو پواسطه محفوظ ساتل کېږي ، وروسته ددې د الکول لمړني گروپ د اکسیجن پواسطه د یو کتلسټ (Activated platinum oarben) په موجودیت کې اکسیدایز کېږي ، دا یو پروپیلیدین گروپ د اسیدي هایډرولایز پواسطه د ازاد استون په بڼه له منځه وړل کېږي او D- gluouronic acid لاسته راځي ، په ژونډیو عضویټو کې یورانیک اسید ونه د انزایمو (Oxidases) تر تاثير لاندې جوړیږي. (8: 430) .

(76.4)






د گلکتوز او منوز د یورانیک اسید و فارمولونه په لاندې ډول دي:




یو بل په زړه پورې یورانیک اسید د L- iduronic acid څخه عبارت دي چې د گلوکورانیک اسید سره د پنځم کاربن د H او OH گروپونو په ترتیب کې توپیر لري، دا یورانیک اسید په Chondroitin sulfate B کې پیدا کېږي (65:5).



L-Iduronic Acid

(45:3)

پورتني څلور واړه يورانیک اسيد ونه طبيعي محصولات دي D-Glucuronicacid د conjugate په شکل په نباتاتو کې پيدا کېږي. همدارنگه د chondroitin sulfuricacid او د گلايکوپروټينو د mucoitinsulfuricacid او hyaluronicacid برخې هم دي ، گلوکورانيک اسيد په حيواني عضويت کې د ځينو موادو لکه bornaol، کافور ، بنزوئيک اسيد او نورو د detoxioation په عمليو کې جوړېږي ، او د دې موادو گلوکورانيک مرکبات په ادرار کې اطراح کېږي. Galacturonicacid زياتره په پکټينو او ډيرو نباتي صمغو او mucilages کې پيدا کېږي د ځينې بکټرياؤ د decarboxylase انزايم په واسطه D-glucouronicacid باندې عمل کوي او يو پنتوز (D-xylose) جوړ وي:



ممکنه ده چې د نباتي پنتوز يو څه برخه له هغزوز سره يورانیک اسيد د لارې نشي جوړېدې.

د توجه وړ ټکي دا دی چې D-Xylose عموماً په نباتاتو کې د D-glucose سره د L- arabinose د D- galactose سره یو ځای لیدل کېږي (9:430)

د قندونو انقلاب (میتابولیزم)

د انسانانو دورځنۍ غذا زیاته برخه قندي مواد جوړوی دغذایي کاربوهایدریتونو زیاته برخه په غوړیو بد لیږي او دغوړیو په څیر انقلاب ته رسیږي. د انسانانو په نزد ښایي چې دغذا خوړلو تکرار او د قندي موادو د بدلیدلو اندازه په غوړیو باندې د ځینو ناروغیو د حالتو لکه Obesity.Atherosclerosis او diabetes Mellitus سره به څه ناڅه مناسبت ولري.

د کاربوهایدریتونو غوره دنده په انقلاب کې دا ده چې د نورو انقلابي عملیو د پرمخ بیولو لپاره انرژي برابروي او د سون د مادي په حیث احتراق ته رسیږي. کاربوهایدریتونه دې رول د سرته رسولو لپاره عموماً د Glucose په ښکله د انسولین هورمون په موجودیت کې حجرو ته داخلېږي. ټول مونوسکرایډونه پرته د Fructose تعاملاتو ته د داخلیدو لپاره انسولین ته ضرورت لري چې وروسته د حجرو په واسطه استعمالیږي. درې اساسي قندونه چې د هاضمې په سیستم کې حاصلیږي د Glucose، Fructose او Galactose څخه عبارت دي. که چېرې sucrose په غذا کې په زیاته پیمانه وخورل شي په داسې حالت کې Fructose مقدار له نظره د کتنې وړ گرځي. Galactose هغه وخت د ډیر اهمیت وړ گرځیدای شي. چې د غذایي قندو زیاته برخه Lactose یا د شیدو قند تشکیل کړيوي. Fructose او Galactose دواړه د ځگر په واسطه په Glucose بدلیږي. ښایي چې Pentose لکه Xylose Arabinose. ribose. هم په غذا کې موجود وي. لیکن د دوي سرنوشت وروسته له هغه چې جذبېږي ډیر پیچلي دي. D-Ribose او 2-Deoxy-D-Ribose دواړه په بدن کې ترکیبېږي او د نوکلیوتایډو په ساختمان کې گډون کوي. (9:87).

1.27 د کاربوهایدریتو انقلاب د تې لرونکو په بدن کې په لاندې ډولونو ویشل کېږي.
۱. GLYCOLYSIS: د Embden-Meyerhof pathways په واسطه د Glucose یا Glycogen د Oxidation څخه عبارت دي په Pyruvate او Lactate باندې.

۲. GLYCOGENESIS: د Glucose څخه د Glycogen د ترکیبیدو څخه عبارت دي.

۳. - GLYCOGENOLYSIS: د Glycogen ټوټه کېدل په Glucose دي چې زیاتره په ځگر کې صورت نیسي.

۴. THE CITRIC ACID CYCLE: د kreb's cycle یا Tricarboxylic acid cycle په نوم یادېږي. د اخیرني گډې Oxidation لارې څخه عبارت دي چې په هغې کې Lipids، Carbohydrate او Protein د Acetyl-SCoA له لارې په کاربن ډای اکساید او اوبو باندې اکسایز کېږي.


-: The Hexose Monophosphate Shunt

(PhosphoGluconate Oxidative، Pentose phosphate Pathways)

Pathways یوه داسې لاره ده چې د Glycolysis سره معادله ده. د Glucose د

Oxidation لپاره لمرني مرحله کي غوره او هم بين البيني مرکبات لکه NADPH او Ribose ترکیبوي او CO₂ هم تولیدیږي.

۵. - GLUCOGENESIS: د غیرې قندي منابعو څخه د Glucose یا Glycogen د تشکیلیدو څخه عبارت دي. کومې طریقې چې په Gluconeogenesis لپاره په کار وړل کیږي. (60:13) شکل 1,27 گلوکوژنیس څر گندوي.



کوم پاتوي چې په Gluconeogenesis کې دخيل دي. عموماً د TCA- Cycle او Glycolysis دي. کوم اساسي سبستريټونه چې د Gluconeogenesis لپاره پکار وړل کيږي. گلوکوجنيک امينو اسيدونه، Lactate او Glycerol څخه عبارت دي. د شخوند و هونکو په نزد Propionate دي. (89;9).

2.27 د کاربوهايډریتو د استقلال نوري لاري

Glycolysis د هغه یو سلسله تعاملاتو څخه عبارت دي چې په هغوي کې Glucose په Pyruvate یا Lactate باندې بدليږي او یو اندازه انرژي ورڅخه حاصلیږي. دا عملیه د حجراتو په داخل کې په اوبیزه حصه کې صورت نیسي پرته لدې چې کوم Organelle برخه پکې واخلي. دامبدن میرهوب پتوي

(Embden-Meyerhof Pathway) ټول انزایمونه د حجري د Mitochondria څخه دباندې په منځه برخه کې پیدا کیږي. Glycolysis د باندې هغه تعاملات کتلايز کېږي چې په Glycolysis کې شامل دي. Glycolysis په لارې کې د Glucose د پاسه نه لاندې صورت نیسي.

۱- گلوکوز (Glucose) د Hexokinase انزایم په واسطه او په ځانګړي ډول د

Glucokinase په ذریعه Glycolysis کیږي او په Glucose -6-Phosphate تبدیلېږي.


د تعاملات یو Endergonic تعامل دي په دې تعامل کې د ATP یو High Energy Phosphate

Bond ماتېږي او په ADP بدلیږي. یو فاسفیټ یې د Glucose په شپږم کاربن باندې نصبیږي.


Glucose -6-Phosphate د څواستقلابي لارو په په منځ کې د

Glycolysis، Glucogenolysis، HMS، Glucogenesis او Glyconeogenesis مشترک

مرکب دي (44:13).




(432.2) Glucose-6-phosphatase انزایم په موجودیت کې په Fructose -6-Phosphate بدلیږي.



$$\Delta G'^{\circ} = 1.7 \text{ kJ/mol} \quad (60.5)$$

۳- Fructose -6-Phosphate د PhosphoFructoKinase انزایم او ATP کوانزایم په موجودیت کې Phosphorylation کيږي. دا هم یو Endergonic تعامل دي چې انرژي له ATP اوهم د فاسفیټ بقیې د ATP څخه راځي او په Fructose-1,6-Bisphosphate بدلیږي.



(83:9)


$$\Delta G'^{\circ} = -14.2 \text{ kJ/mol}$$

PhosphoFructoKinase یو تحریر کونکی انزایم دي اوداسې فکر کيږي چې فعالیت یې د Glycolysis د سرعت په تنظیمولو کې غوره نقش لري اودوه ATP مصرف کيږي.

۴- Aldolase د Fructose-1,6-DiPhosphate انزایم په واسطه په دوه ترايوز فاسفیټ باندې چې یو یې Glyceraldehyde-3-Phosphate او بل یې Di hydroxyacetone-Phosphate دي توته کيږي (760:14).

دوه Triose Phosphates د Triose Phosphate isomerase انزایم په موجودیت کې یو پر بل تبدیلیدای شي. څرنگه چې په لمړي پړاو کې د Glycolysis پاتوي د Glyceraldehyde-3-

Phosphate له خواپه مخ ځي. له همدې کبله Di hydroxyacetone-Phosphate په گلیسرالدهاید-۳-فاسفیت بدلیږي او داکسیدیشن پېښه مخ په وړاندې ځي.




2

۵- گلیسرالدهاید-۳-فاسفیت د گلیسرالدهاید-۳- فاسفیت د هایډروجنیز انزایم په واسطه په خپل اړه لرونکې اسید یعنی ۱،۳-ډای فاسفوگلیسریت بدلیږي. په دې تعامل کې یو مقدار انرژي آزادېږي. مگر په عوض ددې چې د حرارت په څیر آزاده شي. بلکې د ATP په دننه کې د دوو فاسفیتو ترمنځ ذخیره کېږي. څرنگه چې غېږي عضوي فاسفیت د ADP سره یوځای کېږي او ATP منځ ته راوړي. په هغه مرحله کې چې دوه اتومه هایډروجن مالیکول څخه د NAD^+ په واسطه اخیستل کېږي. دې هایډروجنیز انزایم د- SH گروپونود GSH او Cysteine په موجودیت کې ثابت پاتې کېدای شي. (90:5).

3.27 د خمیرمایه په واسطه د الکولو جوړیدل
عموما الکول د لاندې تعاملاتو په ذریعه جوړېږي.


څرنگه چې مخ کې هم یادونه وشوه چې Glycolysis عملیه د Yeast په حجره کې صورت نیسي. مگر پاپرویت په Lactate نه بدلیږي. بلکې یو مالیکول کاربن ډای اکسایډ ورڅخه خارجېږي او په اسیت الډیهایډ بدلیږي. اسیت الډیهایډ د $\text{NADH} + \text{H}^+$ په ذریعه په ایتایل الکولو ارجاع کې



پروټین (Protein)

11.27 امین لرونکو قندونو انقلاب

امین لرونکي قندونه د قندو د ډیر مهمو مشتقاتو له جملې څخه دي. چې په ټول بدن کې دانساجوپه ساختماني جوړښت کې ویشل شوي دي د دې ساختماني قندو مثال Mucopolysaccharides دي د Glycogen پر خلاف چې په هغوي کې د پولې سکرایډ هر واحد یو ډبل سره ورته دي. مگر میکوپولي سکرایډونه د دوه یا زیاتو مختلفو واحدونو څخه مشتمل دي. چې د دې واحدو څخه یو امین لرونکي قند دي. د دې میکوپولي سکرایډو مثال Hyaluronic acid دي. چې Synovial په نوم مایع Umbilical cord، Vitreous humor، پوستکي او هډوکو کې میندل کیږي. په دې مرکب کې ډای سکرایډونه اساسي واحدونو یو مول گلوکورونیک اسید دي. چې دیومول N-acetyl Glucosamine سره د $1 \rightarrow 4$ glycosidic $\beta \rightarrow 1.3$ رابطن په واسطه تړل شوي دي. دنورو میکوپولي سکرایډو مهم گروپ Chondroitin څخه مشتمل دي چې د پروټینو پروستیتیټیک گروپ (poly saccharide protein complexes) دي چې Chondro Mucoids په نوم یادېږي. دوي د کرپندونکو هډوکو غوره برخه تشکیلوي. او همدارنگه د یویني د او عیو جدارونه او تار (tendons) د زړه په دساماتو (valve of heart) او په پوستکي کې هم پیدا کیږي. کوندروتین سلفیتونه مختلف ډولونه لري. د دې موادو ترکیبیدل په لاندې ډول صورت نیسي.



Fructose-6-Phosphate بدليلد په گلوکوزامين-۶-فاسفیتباندد transamidation دیوتعامل په واسطه له گلوکوزامين څخه صورت نیسي. هغه انزایم چې د تعامل کتلاز کوي د L-Glutamine Fructose-6-Phosphate Transamidase په نوم یادېږي. د تعامل په خپل نوعیت کې یوازې تعامل دي چې لازمه انرژي یې یوازې د گلوکوزامين Amide bond له مايدوڅخه حاصلېږي. اودنورو عادي تعاملاتو برعکس دي.

چې په هغوي کې گلوکوزامين داماید نایتروجن انتقال یو بل منونکې ته (پرتو داوبوڅخه) دانرژي یو بل علاوگي منبع لکه ATP ته ضرورت لري

N-acetylGalactosamine ترکیبېد ل دیوداسي انزایم د کتلازیکي عمل په واسطه پای ته رسیږي چې په څگر کې تشخیص شوي دي. دا انزایم په N-acetyluridine diphosphate Glucoseamine باندې عمل کوي دهغه د Glucoseamine برخه په Galactose amine باندې Epimerize کوي. چې په نتیجه کې N-acetyl uridine diphosphate Galactoseamine حاصلېږي. دا انزایم د N-acetyl Glucoseamine-uridine diphosphate

12.27 د شکرې ناروغي، انسولين او گلوکاگون

پانقراس سرېبره پر هضمي و ظيفو دوه مهم هارومونونه افرازوي چې د Insulin او Glucagon په نوم ياديږي چې په نارمل حالت کې د گلوکوز ، شحم او پروتينونو د تنظيم لپاره ضروري او لازمي دي موږ په دې فصل کې د انسولين او گلوکاگون د فزيالوژيک رول او د Diabetes Mellitus د پاتو فزيالوژي څخه يادونه کوو(55:21) .

د پانقراس فزيالوژيک اناتومي : پانقراس دوه ډوله نسجونو څخه جوړ شوی دی چې په بڼکل کې بڼودل شوی دی .

۱. ACINI چې د هضمي عصاړو د افراز سبب کېږي چې مخکې ورڅخه يادونه شوې ده .

۲. LONGETHANS جزيرې چې د انسولين او گلوکاگون د افراز سبب کېږي.

د لانگرهانس جزيرې د دريو ډولو حجرو څخه جوړ شوي دي : چې د DELTA او BETA.ALPHA او د BETA حجرو څخه عبارت دي . د BETA حجرې د لانگرهانس د جزيرو 60% برخه جوړوي چې ورڅخه انسولين او AMYLIN افرازيږي . د ALPHA حجرې د جزيرو 25% څخه نمايندگي کوي او گلوکاگون دافراز سبب کېږي او د DELTA حجرې چې د لانگرهانس د جزيرې 10% جوړوي او SOMATOSTATIN هورمون افرازوي . د لانگرهانس جزيرو حجرې يو دبل سره حجروي رابطه لري چې په دې وسيله يو بڼکل حجرې د بل ډول حجرو افراز کنټرولوي(76;4)

13.27 انسولين او دهغې ميتابوليک تاثيرات (INSULIN AND ITS METABOLIC EFFECTS)

انسولين د لومړي ځل لپاره په ۱۹۲۲ع کال کې د پانقراس څخه جلا شول او په تطبيق سره يې د شکرې د ناروغي (DIABETIC DISEASE) د مړينو په شمير کې کموالی راغی . څرنگه چې مخکې هم ورڅخه يادونه شوې ده: انسولين د لانگرهانس د جزيرو د BETA حجرو څخه افراز او راساً په دوران کې اچول کېږي.

د کاربوهايډرېټ په ميتابوليزم د انسولين تاثير : وروسته د زيات کاربوهايډرېټ لرونکو غذاوو له خوړلو څخه گلوکوز دويني د انسولين د چټک افراز سبب کېږي انسولين د بدن د ټولو نسجونو او خصوصاً د عضلاتو ، شحم د ذخيريوي نسج او يني په وسيله د گلوکوز اخستل ، زخيره کول او استعمال په چټکتيا سره اجرا کوي.(279;8).

14.27 د انسولين په وسيله د عضلاتو د گلوکوز اخستل او ميتابوليزم

د عضلاتو ممبران په نارمل حالت کې د گلوکوز په مقابل کې کم نفوذ په قدرت کې لری لیکن که چيرې عضلې الياف د انسولين په وسيله تنبه شي دعضلاتو نفوذیه قدرت د گلوکوز په مقابل کې زياتېږي. د دوو

خوراكي غذاوو په منځ كې د انسولين افراز كم دى يعنې په دې وخت كې زيات مقدار گلوکوز عضلي حجرو ته نه داخليږي.

عضلات په دوو حالاتو كې زيات مقدار گلوکوز په مصرف رسوي چې يو يې د شديد يا متوسط تمرين په وخت كې چې د گلوکوز مصرف د انسولين زيات مقدار ته ضرورت لري . يعنې د عضلي تمرين په وخت كې حجرې د گلوکوز په مقابل كې نفوذ په قدرت پيداكوي چې تر اوسه پورې يې اصلي سبب نه دى معلوم شوى خو ويل كېږي چې د عضلا تو د تقلصاتو عمليې په كې رول لري . دويم حالت چې د غذا د خوراك څخه وروسته په نظر راځي ؛ په دې وخت د وينې گلوکوز زيات او پانقراس زيات مقدار انسولين افرازوي چې د دې اضافي انسولين په وسيله د گلوکوز تېرېدنه له وينې څخه د عضلي حجرو په لور زياتيږي يعنې عضلي حجرې په دې وخت كې گلوکوز ته نسبت شحمي تيزابو ته ترجيح ورکوى وروسته به ورڅخه يادونه وشي.

15.27 د گلايکوجن د خيره په عضلا تو كې

كه چيرې وروسته له غذا څخه مشق يا تمرين ونه شي زيات مقدار گلوکوز د عضلا تو حجرو ته ننوځي اكثره گلوکوز په عضلا تو كې په Glycogen بدليږي چې وروسته عضلات ورڅخه دانرژي لپاره استفاده كوي(22:87).

د شحم په ميتابوليزم د انسولين تاثير : انسولين په شحمي نسج كې د شحم په ذخيره كيدو كې څو تاثيره لري : لومړى انسولين د بدن په ټولو نسجونو كې د گلوکوز په مصرف كې زياتوالى راوړي چې پخپله د شحم په ذخيره كې كم والى پيداكېږي ، په همدې ډول انسولين د شحمي تيزابو په جوړښت كې اسانتياوې راوړي . وروسته تيزابونه د وينې له لارې شحمي حجرو ته د ذخيرې لپاره وړل كېږي.

د انسولين په كمښت كې د شحم د ميتابوليزم ډيرښت: د انسولين په نشتوالي كې د بدن دانرژي د پيدا كيدو په ټولو مواردو كې ډيرښت ليدل كېږي چې حتى دا ډيرښت دنارملو خلكو د خوړو دوو خوراكو په منځ كې چې د انسولين افراز په كې كم په نظر راځي ؛ د انسولين ټول تاثيرات چې د شحم په ذخيره تاثير لري د انسولين په نشتوالي كې په معكوس ښكل عمل كوي او په نتيجه كې د شحمي ذخيره د تجزيې څخه شحمي تيزابونه ازاديږي او په همدې ډول د انسولين كمښت د وينې د پلازما په كولسترولو او فوسفوليپد په غلظت كې زياتوالى پيداكوي. د انسولين د كموالي په وخت كې د شحم د زيات مصرف له امله په وينه كې د Ketosis او Acidosis د پيدايدو سبب كېږي.

د پروټين پر ميتابوليزم او نشوونما د انسولين تاثير: د غذا څخه وروسته زيات مقدار غذايي مواد لكه كاربوهايډرېټ ، شحم او پروټين په وينه كې ليدل كېږي چې په نتيجه كې پروټين هم د شحم او كاربوهايډرېټو په شان په نسجو كې په زخيروى ښكل بدليږي چې د دې كار لپاره د انسولين موجوديت ضروري دى . دا چې څنگه انسولين د پروټينو په ذخيره كيدو تاثير كوي تر اوسه پورې واضح دليل نه لري برعكس د انسولين نشتوالى د وينې په پلازما كې په امينو اسيدو كې ډيرښت راوړي او په دې ډول د بدن په پروټينو كې كمښت راوړي(4:99).

16.27 د انسولين تاثیر په نشوونما کې

څرنگه چې انسولين د پروتينونو د جوړښت لپاره ضروري دي او د انسولين په نشتوالي کې د پروتينونو جوړښت نه اجرا کېږي او له بلې خوا د پروتينونو موجوديت د نشوونما د هورمونونو د جوړښت لپاره لازمي دي او په دې شان د پر وټينونو کم والی چې د ودې د هورمونونو د کموالي سبب کېږي او په نتیجه کې د حيوان په وده کې خرابي ليدله کېږي (99:23).

1.16.27 د انسولين د افراز کنترول

په پخوانيو وختو کې ټول په دې فکر کې وو چې دانسولين په افراز کې يوازې د وينې گلوکوز تاثیر لري ليکن په نني وخت کې برسیره د وينې د گلوکوز څخه امينو اسيدونه او ځينې نور فکتورونه د انسولين په افراز کې مهم رول لوبوي.

نارمل خلک دلورې په حال کې چې د وينې گلوکوز يې د ۸۰ ملي گرامه په سل گرامه په سل سي سي وينه کې موجود وي د انسولين د افراز اندازه ډيره کمه وي ليکن که چيرې د وينې د گلوکوز اندازه له نارمل حد څخه د يو زيات وخت لپاره پورته و ساتل شي د انسولين په افراز کې زياتوالی پيداکېږي.

څرنگه چې مخکې هم ورڅخه يادونه وشوه کله چې د وينې گلوکوز په سل سي سي وينه کې د سلو ملي گرامو څخه زيات شي د انسولين په افراز کې په چټکتيا سره زياتوالی پيداکېږي کله چې د گلوکوز اندازه په وينه کې ۴۰۰-۶۰۰ ملي گرامه په سل سي سي وينه کې پورته شي د انسولين افراز په چټکتيا سره اعظمي حد ته رسېږي . که چيرې گلوکوز د پورتنۍ اندازې څخه نور هم پورته لاړ شي د انسولين افراز بندېږي تر هغې پورې چې د وينې گلوکوز اندازه د لورې نارمل حد ته نه وي رسيدلي چې د انسولين د افراز عکس العمل د وينې د گلوکوز د زيات غلظت په وخت کې د وينې د کنترول لپاره د Feedback Mechanism بڼه مثال شميرل کېږي په دې اساس که چيرې د وينې گلوکوز پورته شي د انسولين افراز هم زياتېږي او د انسولين افراز د وينې د گلوکوز انتقال د ښې، عضلاتو او نورو حجرو په لور زياتوي او په دې شان د وينې د گلوکوز په غلظت کې کم والی راوړي (65:24).

ځينې نور فکتورونه چې د انسولين د افراز سبب کېږي

ځينې امينو اسيدونه د گلوکوز په شان د انسولين په افراز کې مساوي رول لوبوي چې په دوی کې د Arginine او Lysine د امينو اسيد رول د يادونې وړ دي ، چې تاثیر يې د گلوکوز له تنبه څخه په لاندې شان فرق لري يعنې کله چې دامينو اسيد مقدار زياد شي پرته له دې څخه چې د گلوکوز په مقدار کې زياتوالی موجود وي د انسولين په افراز کې ډير لږ ډيرښت پيداکېږي ليکن کله چې د گلوکوز ډيرښت د امينو اسيد د زياتوالی په وخت کې دانسولين په افراز کې دوه چنده زياتوالی پيداکوي . په همدې شان د معدې او کولمو د سيستم افرازات لکه گسټرين، سکرېټين، کولي سسټوکينين او ځنې نور يې د انسولين په افراز کې په متوسط اندازه ډيرښت راوړي. (120;6)

17.27 گلوکاګون او دهغې وظیفې (Glucagon And Its Functions)

د گلوکاګون هورمون د لانګر هانس د Alpha د حجرو په وسیله افرازېږي کله چې د وینې د گلوکوز غلظت راښکته شي د دې هورمون د افراز سبب کېږي.

گلوکاګون څو وظیفې لري چې د انسولین د وظیفو برعکس تاثیر لري . چې ډیر ښه تاثیر یې د وینې د گلوکوز په مقدار کې زیاتوالی دي له همدې کبله د گلوکاګون د هورمون د Hyperglycemic هورمون په نوم یادېږي (22:24).

د گلوکوز په میتابولیزم د گلوکوګان تاثیر: گلوکاګون دوه مهمې وظیفې لري:

۱. گلوکوګان د وینې ګلايکوجن په گلوکوز بدلولي یعنې یو Glycogenolysis تاثیر لري.

په ښه کې د گلوکونیوجنیزیس د ډیرښت سبب کېږي . د وینې د گلوکوز زیاتوالی د گلوکاګون د افراز مخنیوی کوي . د وینې د گلوکوز د غلظت تاثیر د گلوکاګون په افراز باندې عیناً برعکس د گلوکوز تاثیر د انسولین د افراز په شان دی . یعنې کله چې دانسان دلوړې گلوکوز د ۹۰ ملي ګرامو څخه په سل سي سي وینه کې د Hypoglycemic سرحد ته ښکته شي د پلازما د گلوکاګون غلظت دوه چنده ته پورته کېږي. برعکس که چېرې د وینې د گلوکوز مقدار هایپوګلیسمیک سرحد ته پورته شي د پلازما گلوکاګون په مقدار کې کم والی راځي او هایپوګلیسمیا د گلوکاګون په افراز کې ډیرښت راوړي چې وروسته د ښې څخه زیات گلوکوز خارجېږي او په دې شان د هایپوګلیسمیا په اصلاح کې مهم رول اجرا کوي.

امینو اسید کله چې د پروتیني غذا له خوړلو څخه وروسته په وینه کې زیات شي د انسولینو په شان د گلوکاګون د افراز سبب کېږي (خصوصاً Alanine او Arginine) چې په دې حالت کې د انسولین او گلوکاګون تاثیر یو دبل په ضد عمل نه کوي او په دې شان گلوکاګون د امینو اسید په تبدیلی کې په گلوکوز تاثیر کوي.

د بدن په شدید تمرین کې د وینې د گلوکاګون مقدار څلور یا پنځه چنده ته لوړېږي چې تراوسه پورې یې اصلي سبب نه دی واضح شوی. (12;9).

18.27 د شکرې ناروغي (Diabetes Mellitus)

Diabetes Mellitus یو سندروم دي چې د کاربوهایدرات ، شحم او پروتینونو د میتابولیزم دخرابی په وجه د انسولین په افراز کې نشت والی او یا د انسولین په مقابل کې د نسجونو د حساسیت کمښت پیداکوي . په عمومي ښکل مرض په دوه ډوله موجود دي چې یو ته یې Type I او بل ته یې Type II وايي . Type I Diabetes د Insulin-dependent Diabetes په نوم او Type II Diabetes د Non-Insulin-Dependent Deabetes په نوم یادېږي (55:24).

Type I Diabetes: که چېرې د پانقراس د Beta حجرې د خرابۍ سره مخامخ شي او یا مرضی حالت چې دانسولین په افراز کې کم والی پیداکړي د Type I د ناروغۍ سبب کېږي . ویروسي ناروغي او یا Autoimmune تشوشات د پانقراسي حجرو د خرابي عامل ښودل شوي دي . ښایي ارثي عامل هم د مرض په پیداکیدو کې له نظره لري نه کړو . مرض اکثراً په ۱۴ کلنۍ کې شروع کېږي له همدې

کبله د Juvenile Diabetes Mellitus په نوم یادېږي . مرض په څو ورځو یا هفتو کې دفتراً شروع کوي چې په کې د وینې د گلوکوز ډیرښتد کولسترولو د جوړښت زیاتوالی د وینې په وسیله او د شحمیاتو د مصرف زیاتوالی د انرژي په مقصد او د بدن د پروتینونو د کم والي سره ملګري وي.(77;12).

19.27 Type II Diabetes

د دې ښکل واقعات نسبت Type I Diabetes ته ډیر زیات دي یعنې د ډیابیتس ناروغي ۸۰-۹۰٪ د Type II د ناروغي په وسیله پیداکېږي . مرض اکثره وروسته له ۴۰ کلنۍ څخه شروع کوي چې زیات واقعات یې د ۵۰ او ۶۰ کلونو ترمنځ لیدل کېږي . د مرض شروع په تدریجي ښکل ده او دا ډول ډیابیتس ناروغي Adult Onset Diabetes په نوم هم یادېږي دا ښکل د ناروغي د Type I ناروغي په شان د یو زیات شمیر میتابولیک اېنار ملټیو سره ملګري وي او د Keto Acidosis واقعات په کې ډیر کم پیداکېږي د Type II Diabetes سبب اکثراً د نسجونو د حساسیت کموالی د انسولینو په مقابل کې فکر کوي او برعکس د Type I په دې ښکل کې د انسولین مقدار د وینې په پلازما کې زیات په نظر راځي لیکن د بدن د محیطي نسجونو حساسیت د انسولینو په مقابل کې کم وي او د وینې د انسولینو ډیرښت نشی کولی چې د گلوکوز تنظیم په نارمل ښکل و ساتي . د Type II مرض په آخري صفحه کې د پانقراس د Beta حجرې د دې قدرت نه لري چې کافي اندازه انسولین افراز کړي چې د وځیم هاپیرګلیسمیا څخه مخ نیوی وکړي . خصوصاً په هغه حالاتو کې چې په خوړل شوي غذا کې زیات ګاربوهایدرات موجود وي .

Type II ناروغان اکثراً د مرض په لومړۍ مرحله کې د غذايي پرهیز ، د وزن د کموالي او د تمرین په اثر د کنترول لاندې راوړل کېږي . هغه دواګانې چې د پانقراس څخه د انسولین په افراز کې زیاتوالی راوړي توصیه کېږي لکه Sulfonylureas او هغه دواګانې چې د انسولینو د حساسیت د ډیرښت سبب کېږي لکه Thiazolidinediones او Metformin ورکول کېږي.(450;6).

1.19.27 Diabetes فزیالوژیک تشخیص

D Diabetes تشخیص د مختلفو کیمیاوي تجربو له مخې چې په وینه او تشو متیازو کې اجرا کېږي چې په لاندې ډول سره بیانېږي (89:25).

20.27 گلوکوز په تشو متیازو کې

په عمومي شکل نارمل خلکو کې گلوکوز چې په تشو متیازو کې تیرېږي د دې تجربو په وسیله نه شي معلومېدی او هغه خلک چې په ډیابیتس ناروغي اخته وي په تشو متیازو کې د کم مقدار گلوکوز څخه نیولې تر زیاتې اندازې پورې چې د کاربوهایداتو د خوراک له اندازې او د مرض په شدت پورې اړه لري په نظر راځي.

د لوړې په حالت کې دوینې گلوکوز (Fasting Blood Glucose)

د لوړې په حالت کې دوینې گلوکوز د ۸۰-۹۰ ملي ګرامه په ۱۰۰ سي سي وینه کې او ۱۱۰ ملي ګرامه یې په سل سي سي وینه کې نارمل پورتنی حد قبول شوی دی. د وینې گلوکوز د لوړې په حالت

کې (۱۲ ساعته وروسته له غذا څخه) کله چې گلوکوز د ۱۱۰ ملي گرامو څخه په سل سي سي وينه کې زيات شي د Diabetes Mellitus په لور فکر کېږي (32:26).

GLUCOSE TOLERANCE TEST 1.20.27

که يو نارمل سړي ته د يو کيلو گرام وزن په تناسب يو گرام گلوکوز د لورې په حالت کې ورکړل شي د وينې گلوکوز يې د ۸۰-۹۰ ملي گرامو څخه ۱۲۰-۱۴۰ ملي گرامو ته په سل سي سي وينه کې پورته کېږي او دوه ساعته وروسته بيرته نارمل حالت ته راگرځي.

يو مريض چې Diabetes ولري د وينې گلوکوز يې د ۱۱۰ ملي گرامو څخه په سل سي سي وينه کې پورته او ډاکټراً پورته له ۱۴۰ ملي گرامو موجود وي. د گلوکوز Tolerance Test په کې په هميشه ډول غير نارمل وي يعنې د وينې گلوکوز يې وروسته د گلوکوز له خوراک څخه هميشه له نارمل پورته او اکثراً وروسته له ۴ ساعته څخه بيرته نارمل حد ته راگرځي او يا زياتره بيرته نارمل حد ته نه شي راتللی. د دې څخه دا په فکر کې راځي چې وروسته د گلوکوز له خوراک څخه د انسولين په نارمل افراز کې ډيرښت نه راځي او يا د نسجونو د حساسيت کم والی د انسولينو په مقابل کې موجود دی. د type I او Type II بڼکونه يې د وينې د انسولين د اندازې څخه څرگندېږي چې په

Type I Diabetes کې د پلازما په انسولين کې کموالی او په Type II Biabetes کې د وينې د پلازما په انسولين کې زياتوالی ليدل کېږي.

ACETONE BREATH 2. 20.27: په وينه کې يوه کمه اندازه Acetoacetic Acid موجود وي چې په وځيم د يابنس کې يې مقدار په وينه کې زياتېږي. نوموړی اسيد په استون (ACETONE) بدليږي او په تنفس کې وپېژندل شي د Type I د يابنيس ناروغي ورڅخه تشخيص مومي، په همدې شان په تشو متيازو کې د کيمياوي تجربو په وسيله Keto Acids تثبیت کېږي او د دې اسيد د اندازې څخه د مرض د شدت معلومات هم ترلاسه کېږي. دا هم بايد ذکر شي چې په Type II د يابنيس کې کيتو اسيدونه په زياته اندازه نه ليدل کېږي (90:27).

DIABETES د 3.20.27 تشخيص

Type I Diabetes ناروغانو ته انسولين د پېچکارۍ له لارې توصيه کېږي تر څو چې د کاربوهايډرتو، شحم او پروټينونو ميتابوليزم يې نارمل حد ته راوړل شي. په Type II Diabetes کې غذايي رژيم، تمرين او د وزن کم والی د انسولينو مقاومت په معکوس سمت راوړل کېږي که چېرې د پورتنۍ توصيې په وسيله مرض تر کنترول لاندې رانه وړل شي ناروغانو ته داسې دوا ورکول کېږي چې د انسولين په افراز کې ډيرښت او يا د انسولينو په حساسيت کې زياتوالی راوړي. کله کله د انسولينو تطبيق تطبيق ته هم ضرورت احساسا کېږي. (88:1).

پروټين

پروټين دانساجو په تر کيب او تر ميم کې فوق العاده رول لري چې د پروټين اساس د امينو اسيدو څخه جوړ شوي دي، امينو اسيدونه داسې مرکبات دي چې تيزابي او القلي خواص لري يعنې امفو تريک مر

کبات دي لکه گلايسين ، النين ، فينایل النين ، تایرو زین ، تر بتو پان او نور چې هر یو یې ځانگړي وظیفې تر سره وي .

د پروتې سر چيني

- حیواني سر چيني لکه غوښه ماهي ، هگي او شیدي
- نباتي سر چيني لکه حبوبات ، باقلي او نور .

حیواني سر چيني په پوره ډول سره ضروري امینو اسیدونه لري مگر نباتي سرچینه لرونکي پروتین په مکمل ډول سره ضروري امینو اسیدونه نلري .

د پروتینو د نډې (Function of Proteins)

- د پروتین پلازم د جوړښت اساسي ماده ده
- ساده پروتینونه لکه Histone او پروتین تامین د هستوي اسیدونو سره یوځای کيږي او د هستوي پروتینوپه نوم سره یاد یږي چې د ارثي خواصو د انتقال دنده تر سره کوي .
- ټول ډانزایمونه پروتیني جوړښت لري په اثتننا د رایبوزیم .
- ځني هور مونونه پروتیني جوړښت لري لکه انسولین ، گلوکاگون او وډي هورمون .
- پروتین په بدن کې گڼې دندې تر سره کوي له هیمو گلوبین چې د اکسیجن او کاربن ډای اکساید په انتقال کې اساسي رول لري .
- د ویني په لخته کېدو کې دنده لري لکه پایرینو جن او پروترومبین
- د عضلاتو په تقلص کې دنده لري لکه اکتین او مایوسین
- د پلزما پروتین د اسموتیک فشار په ټاکنه کې ونډه لري چې نموري د ۲۰-۳۰ ملي متر د سیمې بو پوري سا تل کيږي .

- یو گرام غذايي پروتین 4,2 Kcal انرژي برابروي
- پروتینونه د ویروسونو په جوړښت دنده لري
- په سیل ممبران کې د موادو په لیږد کې دنده لري
- پروتینونه د شحمیاتو او قندونو سره کمپلکس جوړوي .

مأخذونه

۱. احمدزی خان محمد طبیبی بیوشیمی مطبعه کا بل ۱۳۹۰ صفحه : ۲۸۹ او ۲۷۲.
۲. مهدی بکاولی و محمد رحیمی زاده عضوی کیمیا نشر مشهد ۱۳۸۷ صفحه ۲۲۶.
۳. موريسن و بوید شیمی الی جلد اول تهران 2010 صفحه 846 او 901.
۴. فهیمه یحی د قندونو هضم و جذب او میتابولیزم کابل پوهنتون ۱۳۹۱ صفحه ۴۰۷.
5. Bls.Bahl , Arun Bahl Atext book of Organic Chemistru For B.se.students Fourteenth Edation 1998 Ram Nagar . New Delhi.PP512,51,516,557.
6. M.Younas Atext book Of Organic Chemistry Universty Of Punjab First and Tird Edition 2012 PP: 535,545,554.
7. Sbahl, Arun bahl Atext book of Organic Chemistry Universty of Punjab 2008 PP: 873 , 883.
8. Fawaz AldabCozol Hetrocuclic Chemistry New Delhi 2006 PP: 126, 128.
9. Oavid L.Nelson.Leninger BioChmistry 4th Edition New York University 2007 PP : 340 , 408.
- 10.HarPevillus trated Biochemistry Alonge Medical Book International Edition New Delhi 2009 PP: 160 , 280.
- 11.Hart Harod Organic Chemistry Asbort Course 7th Edition Mlchingan State University 2002 PP:347 , 349 .
- 12.Wileyvchverlag Gmmmbhad CokG Modern Alkaloid W2007 PP: 320 , 340
13. David klein O rganic Chemistry Johns Hopkins University 2009 PP: 285 , 287.
14. Alans . eingrooe and Robert.caret Organic Chemistry towson state University New York 2006 PP:1264 , 1270.
- 13.Robert Thornton Morison . Robert Neilso Boyd Organic Chemistry 6th Edition .New York Universty New Delhi 2003 PP:1165, 1169.
- 14.MC Murryp Organic Chemistry 2008 PP:250 ,252

دمولف لنډه پيژندنه : ښاغلی پوهنوال امرالله آصفي د مرحوم مولانا



غلام محي الدين اخند زاده زوی اود مرحوم مولانا عبد الجبار اخند زاده لمسی دی ، دکاپيسا ولايت د تگاب ولسوالۍ ، د ادی زائی قريي اود اخندزاد گانو کلی په یو ه متدینه کورنۍ کې زیږیدلی دی ، ابتدایه زده کړی یې د تگاب ولسوالۍ په مرکز (تعمیر) کې په ښه بریالۍ توب سره تکمیل کړي دي اود لیسې دوره یې هم د تگاب ولسوالۍ د غازی محمد عثمان په عالی لیسې کې په ډیر ښه بریالۍ توب سره (اول یا دوهم نمره) تکمیل کړي ده ، د کانکور ازموینه یې هم په ډیر ښه بریالیتوب سره تر سره کړی ده پدې ډول چې په خپل اول انتخاب سره دساینس پوهنځی ته په ډیرو ښو

نمرو سره بریالۍ شامل شوی دی او په خپله زیاته علاقه سره یې د ساینس پوهنځی د شپږ رشتو څخه دکیمیا څانگه انتخاب کړی ده چې وروسته بیا په ممتازو محصلینو کې د صنعتي کیمیا څانگې ته تللی دی اود صنعتي کیمیا څانگې څخه په اول پوزیشن کې فارغ شوی دی پدې ترتیب س ه چې دکیمیا د څانگې په ټولو مضامینو کې یې په لوړه فیصدي سره نمرې پوره کړي دي او هر سمستر یې په اول پوزیشن سره په بریالۍ توب ترسره کړی دی . په علمي کادر کې یې په اول قدم کې د شمولیت حق لرلو خو متاسفانه روسانو افغانستان اشغال کړه نو په دغه بهیر کې د استاد آصفي کور د روسانو له خوا وسوزیده نو پدې اساس ده ونشوی کولی چې نور په افغانستان کې پاتې شي اوپا کستان ته یې هجرت وکړه اوپه پاکستان کې یې د هرپور د مهاجرینو په کمب کې ابتدایه ښوونځی جوړ کړه چې وروسته یې لیسې ته ارتقا وکړه او څو دورې یې فارغان ورکړي دي ، څه موده وروسته یې په پشاور کې دافغان سید جمال الدین لیسې کې دکیمیا د ښوونکۍ په حیث دنده تر سره کړي ده چې په عین وخت کې یې په پشاور کې د کیمیا په څانگه کې دماستری پروگرامونه هم تعقیبول.

څه موده وروسته په اسلامی پوهنتون کې د کیمیا استاد په حیث په دنده وگومارل شو ، هرکله چې اسلامی پوهنتون په افغان پوهنتون کې مدغم نو استاد آصفي په افغان پوهنتون کې مدغم دکیمیا د استاد په حیث دنده تر سره کوله ، هرکله چې څه موده وروسته دافغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی په فرمان سره افغان پوهنتون خوست ولایت رانقل شو نو استاد آصفي هم ور سره د خوست ولایت ته راغلی دی اوپه همدې پوهنتون کې دکیمیا استاد په صیفت د طب، تعلیم و تربیه ، وترنری اوزراعت په پوهنځیو دکیمیا مضمون تدریس کړی دی .

برسیره پردې محترم استاد آصفي د کیمیا او ساینسي علوموپه څنگ کې دیني زده کړی هم کړي دي لکه : دفقې په علم کې یې شروط الصلوات ، قدری ، کنذ ، شرح وقایه ، اوله هیدایه ، دنحو په علم کې یې شمه ، شرح ماته عامل ، کافیه او شرح جامی ، د منطق په علم کې ساغوجی ، میر ، بدیع المیزان او قطبی لوستلی دي ، په حد یسو کې مشکوات شریف او څو څو ځلې یې ترجمه د قران عظیم الشان کړی ده .

څرنگه چې استاد آصفي دافغان پوهنتون سره یو ځای خوست ولایت ته راغلی دي اوپه خوست کې لږ موده وروسته افغان پوهنتون په شیخ زاید پوهنتون باندې بدل شو چې په حقیقت کې استاد آصفي یو د بنیاد گزارانو ددې پوهنتون څخه هم شمیرل کیږي ، کوم وخت چې استاد آصفي دافغان پوهنتون

سره خوست ته راغی علمی رتبه يي پوهنمل وه اود تحصیل درجه يي ماستر وه خو متاسفانه دهغه وخت دانسچام او اکادمیک چارو رئیس د خپل شخصي تعصب له مخېداستاد آصفي علمی تبه اود تحصیل درجه تائید نکره نو پدې اساس هغه خپل علمی رتبه د سره یعنی د پوهیالي څخه شروع کړه چې اوس دلولی خدای (ج) په کومک اود خپل زیات کوشش او زحمت سره د پوهنوال علمی رتبی ته رسیدلی دی .

داهم یادونه کوم چې استاد آصفي د خوست په ولایت کې د شیخ زاید پوهنتون تر څنګ دالفتح په عالی لیسې ، دشهید محمد داود لیسې ، د عبدالحی حبیبی لیسې اود عبدالله تنی په عالی دار المعلمین دکیمیا مضمون مختلفې برخې تدریس کړي دي چې د ستايني وردی او همیش دخیل ملت دپچیانو په خدمت کې خپل قیمتي وخت نه سپموی.

په ۱۳۹۵ کال کې دکیمیا څانګې دامر په صیفت مقرر شو اوخپله وظیفه په پوره صداقت سره ترسره کوي د۱۳۹۷ کال په شروع کې د استادي اوکیمیا څانګې دمسئولیت تر څنګ دښووني اوروزني پوهنځی دریا ست مسولیت هم پر غاړه لري او خپله مقدسه وظیفه دالله (ج) په مرسته پرمخ وړي .

برسیره پردې علمي اثر استاد آصفي دکیمیا په مضمون کې څوارلس(۱۸) مطبوع علمي اثار لري چې هغه دادی :

۱: دانسان په ژوند کې د قندونو اهمیت (تحقیق) ۲: دیو شمیر عضوي مرکباتو د تعاملاتو میخانیکیت (تحقیق)

۳: عضوي کیمیا (ترجمه) ۴: په څارویو کې د کلسیم او فاسفورس اهمیت (تحقیقی مقاله)

۵: دانسان په وجود کې د سودیم اهمیت (تحقیقی مقاله) ۶: تیتريشن (تحقیقی مقاله) ۷: دانسان په وجود کې د پوتاشیم اهمیت (تحقیقی مقاله) ۸: دکیمیایو تجربو لارښود لومړی برخه (تالیف)

۹: دکیمیایو تجربو لار ښود دوهمه برخه (تالیف)

۱۰: دمخدره توکو(نیکوتین او هیروئین) منفي اغيزي په انسانانو باندې (تحقیقی مقاله).

۱۱: دانسان په بدن کې دایودین مرکباتواهمیت (تحقیقی مقاله) ۱۲: میوه جات او ګټي ئی (تحقیقی مقاله) ۱۳: زهرجن کیمیاوي مواد (تحقیقی مقاله) ۱۴: کیمیاوي انرژي اوتاثیرات ئی په چاپیر یال باندې (تحقیقی مقاله) ۱۵: دانسان په بدن کې د سودیم اهمیت ۱۶: د نیکوتین او او هیروئین تر سر لیک لاندې په بین المللی ژور نال کې نشر شوي تحقیقی مقاله

د محترم پوهنوال امرالله اصفی (کیمیا استاد) د نشر شوو علمي اثارو فهرست څانګه کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون شیخ زاید

ردیف	مؤلف یا محقق	موضوع	نوعیت	د نشر ځای	د نشر تاریخ	د صفحو شمیر
۱	پوهندوی امرالله اصفی	د انسان په ژوند کې د قندونو اهمیت	څېړنه	شیخ زاید پوهنتون	۱۳۹۵	۱۷۹
۲	پوهندوی امرالله اصفی	د یوشمیر عضوي مرکبونو د تعاملاتو میخانیکیت	څېړنه	شیخ زاید پوهنتون	۱۳۹۲	۱۸۰
۳	پوهندوی امرالله اصفی	عضوي کیمیا	ترجمه	شیخ زاید پوهنتون	۱۳۹۷	۱۵۹
۴	پوهندوی امرالله اصفی	د کیمیاوي انرژي اغیزی په چاپیریال باندې	څېړنیزه مقاله	شیخ زاید پوهنتون	۱۳۹۴ لمري ربه	۱۴
۵	پوهندوی امرالله اصفی	زهرجن کیمیاوي مواد	څېړنیزه مقاله	شیخ زاید پوهنتون	۱۳۹۶ دوهمه ربه	۱۰
۶	پوهندوی امرالله اصفی	د څارویو په انساجو کې د کلسیم او فاسفورس اهمیت	څېړنیزه مقاله	شیخ زاید پوهنتون	۱۳۹۶ دریمه ربه	۹
۷	پوهندوی امرالله اصفی	د انسان په بدن کې د سوډیم اهمیت	څېړنیزه مقاله	شیخ زاید پوهنتون	۱۳۹۵ دوهمه ربه	۱۱
۸	پوهندوی امرالله اصفی	میوه جات او گټې یې	څېړنیزه مقاله	شیخ زاید پوهنتون	۱۳۹۷ نولسمه گڼه	۱۰
۹	پوهندوی امرالله اصفی	تیتريشن عمليې کړنلاره	څېړنیزه مقاله	شیخ زاید پوهنتون	۱۳۹۷ اتلسمه گڼه	۱۲

۱۰	۱۳۹۷ خوارلسمه گنه	شیخ زاید پوهنتون	خپرنیزه مقاله	مخدړه مواد	پوهندوی امرالله اصفي	۱۰
۸	۱۳۹۸ دوه ويشتمه گنه	شیخ زاید پوهنتون	خپرنیزه مقاله	د انسان په بدن کې د ایوډین اهمیت	پوهندوی امرالله اصفي	۱۱
۹	۱۳۹۸ شلمه گنه	شیخ زاید پوهنتون	خپرنیزه مقاله	د انسان په بدن کې د پوتاشیم اهمیت	پوهندوی امرالله اصفي	۱۲
۱۹۰	۱۳۹۶	شیخ زاید پوهنتون	تالیف	د کیمیاوي تجربو لارښود لمړۍ برخه	پوهندوی امرالله اصفي	۱۳
۱۸۰	۱۳۹۷	شیخ زاید پوهنتون	تالیف	د کیمیاوي تجربو لارښود دویمه برخه	پوهندوی امرالله اصفي	۱۴
۵۵۶	۱۳۹۸	شیخ زاید پوهنتون	تالیف	عضوي کیمیا الیفاتیک برخه	پوهندوی امرالله اصفي	۱۵
۸ صفحې	Issn print:2394- 7500 Issn online:239 4-5869	Peer Reviewe dJournal ,Referee d Journal and Indexed Journal	خپرنیزه مقاله	خارجی مقاله) Nicotinand (heroin	پوهندوی امرالله اصفي	۱۶
۲۰۰	۱۳۹۹	اسلامي پوهنتون او شیخ	تالیف	طبي کیمیا	پوهنوال امرالله اصفي	۱۷

		زاید پوهنتون				
۱۰	۱۳۹۹	شیخ زاید پوهنتون	خپرنیزه مقاله	د منرالونواستقلاب (Metabolism) (of Minerals	پوهنوال امرالله اصفی	۱۸

په پورته ډول سره د پوهنوال امرالله اصفی د علمی اثارو لست چې جمعا اتلس (۱۸) اثار کيږي ترتیب

او وړاند ی کيږي دا یادونه کوو چې د پوهنوال علمی رتبي دتر فیع په موخه یي د عضوي کیمیا الیفاتیک برخه په ۶۰۰ صفحو کې تالیف کړي ده کال ۱۳۹۸

په پورته ډول سره د بناغلی پوهنوال امرالله آصفی لنډه پیژندنه گرانو هیواد والوته وړاندی کوو.

د افغانستان د ۸ پوهنتونونو د چاپ شويو طبي کتابونو لست
(کابل، کابل طبي پوهنتون ، ننگرهار ، خوست، کندهار، هرات، بلخ او کاپيسا) ۲۰۱۰ - ۲۰۲۰

ردیف	د کتاب نوم	ليکوال	پوهنتون	ردیف	د کتاب نوم	ليکوال	پوهنتون
۱	فارمکولوژي	پوهندوی سيد قمبر علي حيدري	ننگرهار	۲	کتاب ولادی	پوهندوی داکتر حسن فريد	هرات
۳	انتاني ناروغی	پوهنوال داکتر عبدالناصر جبارخېل	ننگرهار	۴	د سترگو ناروغی	پوهنمل داکتر خالد يار	ننگرهار
۵	زېږون	پوهنمل داکتر مریم اکرم معصوم	ننگرهار	۶	د کوچنيانو د وينې ناروغی	پوهندوی داکتر منصور اسلمزی	ننگرهار
۷	تنفسي او د زړه د دسامونو روماتيزمل ناروغی	پوهاند داکتر طيب نشاط	ننگرهار	۸	د سرطاني ناروغيو اساسات	پوهاند داکتر ظاهر ظفرزی	ننگرهار
۹	توبرکلوز	پوهندوی داکتر سيد انعام سیدي	ننگرهار	۱۰	اندوکرينولوژی او روماتولوژي	پوهاند داکتر محمد طيب نشاط	ننگرهار
۱۱	بيوفزيک	پوهاند مير محمد ظاهر حيدري	بلخ	۱۲	د ماشومانو کلينيکی معاينه	پوهنوال داکتر ناصر خان کاموال	ننگرهار
۱۳	فزيک نور	پوهاند مير محمد ظاهر حيدري	بلخ	۱۴	د پرازيتولوژي اساسات	داکتر محمد صابر	ننگرهار
۱۵	د سينې ناروغی او توبرکلوز	داکتر ناصر محمد شينواری	کندهار	۱۶	د کولمو بندش او د پريطوان جراحي ناروغی	پوهاند داکتر عبدالرؤف حسان	ننگرهار
۱۷	کلينيکي راديولوژي	پوهنوال داکتر غلام سخي رحمانزی	ننگرهار	۱۸	د کوچنيانو د درملنې لارښود (انگليسی)	پوهندوی داکتر منصور اسلمزی	ننگرهار
۱۹	د پښتورگو ناروغی	پوهاند داکتر محمد ظاهر ظفرزی	ننگرهار	۲۰	د هضمي جهاز او پښتورگو ناروغی	پوهنوال داکتر عبدالواحد وثيق	کندهار
۲۱	د هضمي جهاز ناروغی	پوهاند داکتر محمد ظاهر ظفرزی	ننگرهار	۲۲	جراحی بطن وملحقات آن	پوهاند داکتر محمد معصوم عزيزی	کابل طبي پوهنتون
۲۳	د وينې ناروغی	پوهاند داکتر محمد ظاهر ظفرزی	ننگرهار	۲۴	روش های ارزيايی کلينيکی اطفال	پوهندوی داکتر فاروق حميدي	کابل طبي پوهنتون
۲۵	د ځيگر ناروغی	پوهاند داکتر محمد ظاهر ظفرزی	ننگرهار	۲۶	عمومي هستولوژي	پوهندوی داکتر فضل الهی رحمانی	کندهار
۲۷	تشخيصي راديولوژي	پوهنوال داکتر غلام سخي رحمانزی	ننگرهار	۲۸	پتالوژی عمومی	دوکتورس زهرا فروغ	هرات
۲۹	د وينې سرطان	پوهنوال داکتر نظر محمد سلطانزی	ننگرهار	۳۰	بيولوژي ماليکولي حجره، بخش اول	پوهنوال علي يوسف پور	کابل طبي پوهنتون
۳۱	اطفال	پوهنوال داکتر محمد رسول فضلي	ننگرهار	۳۲	بيولوژي ماليکولي حجره، بخش دوم	پوهنوال علي يوسف پور	کابل طبي پوهنتون
۳۳	تغذيه او روغتيا	پوهيالی داکتر محمد هارون	ننگرهار	۳۴	د توبرکلوز ناروغی	داکتر محمد ناصر ناصري	کندهار
۳۵	ډيموگرافي او کورنی تنظيم	پوهيالی داکتر محمد ابراهيم شيرزی	ننگرهار	۳۶	امراض ساری اطفال	پوهاند داکتر سلطان محمد صافی	کابل طبي پوهنتون
۳۷	د عمومي جراحي اساسات	پوهندوی داکتر بادشاه زار عبدالي	خوست	۳۸	د کوچنيانو ناروغی	پوهاند داکتر سلطان محمد صافی	کابل طبي پوهنتون
۳۹	جراحی، د کلينيکي معايناتو سيستم	پوهندوی داکتر بادشاه زار عبدالي	خوست	۴۰	امراض جراحی بطن و ملحقات ان	پوهندوی داکتر عبدالخالق دوست	کندهار
۴۱	عمومي پتالوژي	پوهنوال داکتر خليل احمد بهسودوال	ننگرهار	۴۲	هستولوژي	پوهاند داکتر بری صديقي	کابل طبي پوهنتون
۴۳	د ساري ناروغيو کنترول	پوهندوی داکتر محمد عظيم منگل	ننگرهار	۴۴	د وينې فزيولوژي	پوهنمل داکتر ولي محمد وياړ	کندهار
۴۵	طبي هستولوژي	پوهنوال داکتر خليل احمد بهسودوال	ننگرهار	۴۶	طبي بيوشمي	پوهاند دوکتور خان محمد احمدزی	کابل طبي پوهنتون
۴۷	بيرولوژي	پوهنوال داکتر عبدالاحد حميد	ننگرهار	۴۸	فزيک اوپتيک	پوهنوال غلام قادر دهگان	هرات
۴۹	اخلاق طبابت	پوهاند داکتر عبدالغفور همدل صديقی	بلخ	۵۰	اورتوپيدي او کسرونه	پوهنمل داکتر محمد همايون مصطفی	کندهار

۵۱	فزيكل ډياگنوزس	پوهنوال ډاکټر حفيظ الله اږيدی	ننگرهار	۵۲	بطن حاد و مزمن	پوهنوال ډاکټر عبدالغفور ارصاد	هرات
۵۳	د زړه او رگونو ناروغی	پوهندوی ډاکټر دل آقا دل	ننگرهار	۵۴	اساسات جراحي	پوهاند ډاکټر نجيب الله امرخيل	کابل طبي پوهنتون
۵۵	د چاپيريال او ډنډيزه روغتيا	پوهنوال ډاکټر محمد عارف رحمانی	ننگرهار	۵۶	اناتومی	پوهنمل ډاکټر حفيظ الله سهار	کابل طبي پوهنتون
۵۷	د هضمي سيستم او پښتورگو ناروغی	پوهندوی ډاکټر سيف الله هادی	ننگرهار	۵۸	التراساوند تشخيصيه	پوهندوی ډاکټر محمد نواب کمال	کابل طبي پوهنتون
۵۹	د کوچنيانو تغذيه	پوهنمل ډاکټر نجيب الله امين	ننگرهار	۶۰	د قندونو هضم، جذب او استقلال	دوکتور يحيی فهمي پوهيالی	ننگرهار
۶۱	د کوچنيانو ناروغی، اول جلد	پوهنوال دوکتور عبدالستار نيازی	ننگرهار	۶۲	د غوړ، پزۍ او ستونی ناروغی	پوهنمل دوکتور مير محمد اسحاق خاورين	ننگرهار
۶۳	د کوچنيانو ناروغی، دوهم جلد	پوهنوال دوکتور عبدالستار نيازی	ننگرهار	۶۴	د پوستکي ناروغی	پوهندوی دوکتور اسدالله شينواری	ننگرهار
۶۵	هيماتولوژي، ايمینولوژي او د ویتامينونو کموالي ناروغی	پوهندوی دوکتور ايمل شيريزی	ننگرهار	۶۶	د خولې او هضمي سيستم ناروغی	پوهاند دوکتور ظاهر ظفري	ننگرهار
۶۷	رهنمای تدریس طب	پوهاند دوکتور نادر احمد اکسير	کابل طبي پوهنتون	۶۸	جراحي بطن	پوهاند دوکتور محمد معصوم عزيزی	کابل طبي پوهنتون
۶۹	امراض اطفال	پوهاند دوکتور سلطان محمد صافی	کابل طبي پوهنتون	۷۰	جراحي عصبی	پوهنوال دوکتور عبدالغفور ارصاد	هرات
۷۱	مايکروبيولوژی	پوهاند محمد جمعه حنيف	هرات	۷۲	اساسات پرازينتولوژی طبي	پوهنمل دوکتور محمد يوسف مبارک	کابل طبي پوهنتون
۷۳	امراض جراحي سيستم هضمی و ملحقات آن	پوهاند دوکتور عبدالوهاب نورا	کابل طبي پوهنتون	۷۴	امراض جهاز هضمی و کبد	دوکتور محمد بونس فخری	بلخ
۷۵	فزيک طبي بخش ميخانيک	پوهاند مير محمد ظاهر حيدری	بلخ	۷۶	فزيک طبي بخش حرارت	پوهاند مير محمد ظاهر حيدری	بلخ
۷۷	توضيح اساسات فزيک، و سايل تشخيصيه طبي	پوهاند مير محمد ظاهر حيدری	بلخ	۷۸	اناليز رياضي	سيد يوسف مانووال	بلخ
۷۹	نور و فزيک جديد	پوهنوال غلام قادر دهگان	هرات	۸۰	حرارت و ترمودينامیک	پوهنوال غلام قادر دهگان	هرات
۸۱	عمومي جراحي، لومړی ټوک	پوهندوی ډاکټر بادشاه زار عبدالی	خوست	۸۲	عمومي جراحي، دوهم ټوک	پوهندوی ډاکټر بادشاه زار عبدالی	خوست
۸۳	اناتومی و فزيولوژی انسان، جلد اول	پوهندوی محمد طاهر نسيمي	بلخ	۸۴	اناتومی و فزيولوژی انسان،جلد دوم	پوهندوی محمد طاهر نسيمي	بلخ
۸۵	روانی رنځپوهنه	پوهندوی ډاکټر جهان شاه تنی	خوست	۸۶	تغذيه او سو تغذيه	پوهنوال ډاکټر عبدالواحد وثيق	قندهار
۸۷	امراض روانی، جلد اول	پوهندوی دوکتور عبدالعزيز نادری	کابل طبي پوهنتون	۸۸	امراض روانی، جلد دوم	پوهندوی دوکتور عبدالعزيز نادری	کابل طبي پوهنتون
۸۹	انتاني ناروغی (انگليسی)	پوهنمل ډاکټر محمد ذکريا اميرزاده	کندهار	۹۰	بېړنی طبي پيښی	پوهنوال ډاکټر عبدالواحد وثيق	قندهار
۹۱	پرازينتولوژی طبي	پوهاند دوکتور عبیدالله عبید	کابل طبي پوهنتون	۹۲	ولادي جراحي، لمړی ټوک	ډاکټر عجب گل مومند	قندهار
۹۳	مايکرو بيولوژی طبي، جلد اول	پوهاند دوکتور عبیدالله عبید	کابل طبي پوهنتون	۹۴	ولادي جراحي، دوهم ټوک	ډاکټر عجب گل مومند	قندهار
۹۵	مايکرو بيولوژی طبي، جلد دوم	پوهاند دوکتور عبیدالله عبید	کابل طبي پوهنتون	۹۶	د غوړ، پزۍ او ستونی ناروغی	ډاکټر عزيز الله فقير	کندهار
۹۷	رهنمود PBL در افغانستان	پوهاند دوکتور محمد فريد برنایار	کاپيسا	۹۸	مايکروبيولوژی عمومی	دوکتور شعیب احمد شاخص	هرات
۹۹	ترومانتولوژی	پوهنوال دوکتور عبدالغفور ارصاد	هرات	۱۰۰	د زړه او سرو د ناروغیو تشخيصيه راډيولوژي	پوهنيار ډاکټر شاه محمد رنځورمل	خوست
۱۰۱	نرسنگ عملياتخانه	پوهاند دوکتور نجيب الله امرخيل	کابل طبي پوهنتون	۱۰۲	گياهان طبي مستمله در تداوی امراض قلبی و وعایی	پوهنوال محمد عثمان بابری	کابل پوهنتون
۱۰۳	امبريولوژی طبي	پوهندوی ډاکټر بشير نورمل	کابل طبي پوهنتون	۱۰۴	بېړنی درملنې	ډاکټر عبدالولی رنځمل وردک	خوست

۱۰۵	د احصایی اساسات	پوهنځی محمد آغا ضیاء	کندهار	۱۰۶	د کوچنیانو ساری ناروغی	پوهاند دوکتور سلطان محمد صافی	خوست
۱۰۷	امبریولوژی عمومی انسان	پوهندوی داکتر بشیر نورمل	کابل طبی پوهنتون	۱۰۸	امراض یورولوژی	پوهندوی دوکتور غلام سخی حسنی	کابل طبی پوهنتون
۱۰۹	کمک های اولیه	پوهاند دوکتور نجیب الله امرخیل	کابل طبی پوهنتون	۱۱۰	امراض نسایی	پوهندوی داکتر محمد حسن فرید	هرات
۱۱۱	طبی هستالوژی	پوهاند داکتر بری صدیقی	خوست	۱۱۲	امبریولوژی	پوهاند دوکتور بری صدیقی	خوست
۱۱۳	رهنمای انستیزی برای کشورهای رو به انکشاف، جلد اول	دانیل دی موس	کابل طبی پوهنتون	۱۱۴	عمومي جراحي	داکتور گل سیما ابراهیم خیل قادري	خوست
۱۱۵	رهنمای انستیزی برای کشورهای رو به انکشاف، جلد دوم	دانیل دی موس	کابل طبی پوهنتون	۱۱۶	عضوي کيميا، د اليفاتيک برخه	پوهندوی دوکتور گل حسن ولیزی	خوست
۱۱۷	احصاییه	پوهاند محمد بشیر دودیال	ننگرهار	۱۱۸	د کوچنیانو خوار ځواکي	پوهندوی داکتر سمیع الله حیات	ننگرهار
۱۱۹	کلاسیک او مالکیولی جنیتیک	دوکتور محمد صابر	ننگرهار	۱۲۰	تصویرې یا تر سیمې راډیو گرافي	پوهنوال داکتر غلام سخی رحمانزی	ننگرهار
۱۲۱	د داخلي بېړنۍ پېښې او د بحران څارنه	پوهنوال داکتر حفیظ الله اپریدی	ننگرهار	۱۲۲	اورتوپیدی	پوهندوی داکتر سید شال سیدی	ننگرهار
۱۲۳	د عامی روغتیا اساسات او اداره	پوهنمل داکتر محمد عارف رحمانی	ننگرهار	۱۲۴	طبي ترمینالوژي	دوکتور گل سیما ابراهیم خیل قادری	ننگرهار
۱۲۵	هلمنتولوژي	پوهاند داکتر سید رفیع الله حلیم	ننگرهار	۱۲۶	وراثت او ډسمورفولوژي	پوهنمل داکتر مسیح الله مسیح	ننگرهار
۱۲۷	د بېړنیو پېښو د درملنې لارښود (انګلیسي)	پوهنوال داکتر ایمل شیرزی	ننگرهار	۱۲۸	د نویو زیږیدلو ماشومانو د ستونزو اهتمات	پوهندوی داکتر ناصر خان کاموال	ننگرهار
۱۲۹	د سیستمونو پتالوژي	پوهنوال داکتر خلیل احمد بهسودوال	ننگرهار	۱۳۰	په ماشومانو کې نری رنځ	پوهنمل داکتر حقیق الله چار دیوال	ننگرهار
۱۳۱	د اتونوم او مرکزي عصبي سیستمونو فارمکولوژي	داکتور غلام ربی بهسودوال	ننگرهار	۱۳۲	د ننگرهار طب پوهنځی نصاب او درسی مفردات (انګلیسي)	ننگرهار طب پوهنځی	ننگرهار
۱۳۳	د درملو د استعمال عملی لارښود (انګلیسي / پښتو)	داکتور مالتی ایل وان بلومرود	ننگرهار	۱۳۴	عمومي کیمیا	پوهاند دوکتور خیرمحمد ماموند	ننگرهار
۱۳۵	اناتومی (هدوکې، مفاصل او عضلات)	پوهنمل داکتر محمد ناصر نصرتی	ننگرهار	۱۳۶	فارمکولوژی، دوهم ټوک	پوهنوال داکتر سید قمبر علی حیدری	ننگرهار
۱۳۷	حاد اپنډیسایټیس، تشخیص، اختلاطات او تداوي	پرفیسور دوکتور محمد شریف سروری	خوست	۱۳۸	د جهازاتو اناتومي	پوهنوال داکتر محمد حسین یار	ننگرهار
۱۳۹	امبریولوژي	پوهنوال داکتر محمد حسین یار	ننگرهار	۱۴۰	اناتومی دریم جلد عصبي سیستم، حواس او اندوکراین غدوات	پوهنمل داکتر محمد ناصر نصرتی	ننگرهار
۱۴۱	طبي امبریولوژی	پوهنمل داکتر محمد ناصر نصرتی	ننگرهار	۱۴۲	د ماشومانو د ناروغیو عملي لارښود (انګلیسي)	داکتور مالتی ال-وان بلومرود	ننگرهار
۱۴۳	د طبي عامو ستونځو عملي لارښود (انګلیسي)	داکتور مالتی ال-وان بلومرود	ننگرهار	۱۴۴	د رواني روغتيايي ستونځو عملي لارښود (انګلیسي)	سیان نیکولاس	ننگرهار
۱۴۵	نشه یي توکي او اړونده ناروغی	داکتور محمد سمین ستانکرزی	ننگرهار	۱۴۶	د شحمیاتو انقلاب	دوکتور محمدم عظیم	ننگرهار
۱۴۷	عصبي جراحي	پوهندوی داکتر عبدالصیر منگل	ننگرهار	۱۴۸	سرطان او د چاپیریال راډیو اکتیویټي	پوهنوال داکتر نظر محمد سلطانزی څدران	ننگرهار
۱۴۹	بېړنۍ طبی درملنې	داکتور سید ملیار سادات	ننگرهار	۱۵۰	د تنفسي سیستم فزیولوژي	دوکتور احسان الله احسان	ننگرهار
۱۵۱	نیونټولوژي	پوهنوال داکتر عبدالستار نیازی	ننگرهار	۱۵۲	عصبي ناروغی	پوهنمل داکتر بلال پاینده	ننگرهار

۱۵۳	د زړه برقي گراف (ECG)	رنځوروال ډاکټر سيد عبدالله سادات	ننګرهار	۱۵۴	الټراسونډ	ډاکټر محمد يونس سلطاني	ننګرهار
۱۵۵	د شکرې ناروغي	ډاکټر محمد نعيم همدرد	ننګرهار	۱۵۶	فيزيکي تشخيص	ډاکټر عبدالناصر جبارخيل	ننګرهار
۱۵۷	توليز يوني آزمويښي	پوهندوی ډاکټر نجيب الله خليلي	ننګرهار	۱۵۸	د هضمي سيستم اناتومي	پوهنمل دکتور محمد ناصر نصرتی	ننګرهار
۱۵۹	د بولي تناسلي سيستم اناتومي	پوهنمل دکتور محمد ناصر نصرتی	ننګرهار	۱۶۰	د زړه او د وينی د رگونو اناتومي	پوهنمل دکتور محمد ناصر نصرتی	ننګرهار
۱۶۱	عصبي جراحي	پوهندوی دوکتور فضل الرحيم شگيوال	ننګرهار	۱۶۲	بيوفيزيک	پوهنيار پښتنه بنايي	ننګرهار
۱۶۳	د کوچنيانو ناروغی د پنځم ټولگی د لومړی سمیستر لپاره	پوهاند ډاکټر عبدالستار نيازی	ننګرهار	۱۶۴	د کوچنيانو د جهازاتو معمولي ناروغی I	پوهاند ډاکټر عبدالستار نيازی	ننګرهار
۱۶۵	د کوچنيانو د جهازاتو معمولي ناروغی II	پوهاند ډاکټر عبدالستار نيازی	ننګرهار	۱۶۶	انتاني ناروغی	پوهنوال ډاکټر حفيظ الله اپريدی	ننګرهار
۱۶۷	د اندوکراين، زړه، رگونو او پښتورگو فزيوزي	پوهنوال ډاکټر احسان الله احسان	ننګرهار	۱۶۸	د جراحي انکال	رنځوريار ډاکټر عجب گل مومند	ننګرهار
۱۶۹	د ځيگر ویروسی التهاب (طبی تشخيص او درملنه)	دوکتور محمد اسحاق شريفی	ننګرهار	۱۷۰	ملاريا	دوکتور محمد اسحاق شريفی	ننګرهار
۱۷۱	طبي پرايټولوژي	پوهنوال دوکتور غلام جيلاني ولي	ننګرهار	۱۷۲	وراثت	پوهنوال دوکتور گل سالم شرافت	ننګرهار
۱۷۳	د کوچنيانو ناروغی لومړی ټوک	پوهاند دوکتور احمد سير احمدی	ننګرهار	۱۷۴	د کوچنيانو ناروغی دوهم ټوک	پوهاند دوکتور احمد سير احمدی	ننګرهار
۱۷۵	عقلی ناروغی	ډاکټر بلال پاينده	ننګرهار	۱۷۶	فيزيکي کيميا دوهم جلد، ترمودينامیک	حبيب الله نوابزاده	ننګرهار
۱۷۷	کسرونه او خلعي	پوهندوی سيد بها کریمي	ننګرهار	۱۷۸	د کوچنيانو ساري ناروغی	پوهندوی دوکتور نجيب الله امين	ننګرهار
۱۷۹	نسايي ناروغی	پوهندوی دوکتورس تورپيکې اپريدی	ننګرهار	۱۸۰	د گيډی د ملحقنو د جراحي ناروغي	پوهنوال دوکتور بادشاه زار عبدالی	خوست
۱۸۱	د ماشومانو د معدې معايي سيستم او يني ناروغی	پوهنمل ډاکټر ولی گل مخلص	خوست	۱۸۲	د سيستمونو پټالوژي ديمه برخه	پوهاند دوکتور خليل احمد بهسودوال	ننګرهار
۱۸۳	د سيستمونو هستالوژي	پوهاند دوکتور خليل احمد بهسودوال	ننګرهار	۱۸۴	د پوستکي ناروغی	پوهنوال ډاکټر سيد انور اکبري	ننګرهار
۱۸۵	د ټټر اناتومي	پوهنيار دوکتور يما صديقي	ننګرهار	۱۸۶	رهنمای عملی مشکلات عام طبي (دری)	ډاکټر مالتې ايل وان بلومرودر	بلخ
۱۸۷	عمومي هستالوژي	پوهاند دوکتور خليل احمد بهسودوال	ننګرهار	۱۸۸	راديولوژي ازموينی او ناروغتياوې	پوهنوال ډاکټر غلام سخي رحمانزی	ننګرهار
۱۸۹	د نيونټالوژي او کوچنيانو د ناروغيو کلينيکي هندېوک	پوهنوال دوکتور منصور اسلم زی	ننګرهار	۱۹۰	د طبابت لنډ تاريخ	پوهاند عبدالحی مومنی	ننګرهار
۱۹۱	ميخانيک او د نور فزيک	پوهنيار هدايت الله	ننګرهار	۱۹۲	د برق فزيک	پوهنيار هدايت الله	ننګرهار
۱۹۳	عمومي بيولوژي	پوهنمل جماعت خان همت	ننګرهار	۱۹۴	د تنفسی سيستم او د زړه روماتيزمل ناروغی	پوهاند دوکتور سيف الله هادي	ننګرهار
۱۹۵	فارمکولوژي، دريم ټوک	پوهنوال سيد قمبر علي حيدري	ننګرهار	۱۹۶	عمومي پټالوژي	پوهندوی دوکتور محمد آصف	ننګرهار
۱۹۷	طبي فزيولوژي	پوهاند شريف الله نعمان	ننګرهار	۱۹۸	د پلاستيک جراحي اساسات او تخنيکونه	ډاکټر الفت هاشمی	ننګرهار
۱۹۹	عمومي بيولوژي	پوهندوی الفت شیرزی	ننګرهار	۲۰۰	د عصبي سيستم اناتومي	پوهنيار دوکتور يما صديقي	ننګرهار
۲۰۱	د سينې سرطان، پېژندنه، درملنه او مخنيوی	پوهنوال ډاکټر نظر محمد سلطانزی خدران	ننګرهار	۲۰۲	د وينې حجرو، تنفي جهاز، هضمي جهاز، او نوو زېږېدلو فزيولوژي	پوهنوال دوکتور جنت مير مومند	ننګرهار
۲۰۳	د سينې بطن او حوصلي اناتومي	پوهندوی ډاکټر حميدالله حامد	خوست	۲۰۴	فيزيکي تشخيص او د تاريخچې اخسته	پوهاند ډاکټر شريف الله	ننګرهار

۲۰۵	د خانګړو حسیتونو، پوسټکي، اوتونوميک او مرکزي سپستم فزیولوژي	پوهنوال دوکتور محب الله شینواری	ننګرهار	۲۰۶	د درملو بدی اغیزی	پوهنوال سید قمبر علی حیدری	ننګرهار
۲۰۷	جراحی عمومی اطفال	پوهنیاړ داکتر توریالی حکیمی	کابل طبی پوهنتون	۲۰۸	معاینات کلینیکی اطفال بطور ساده	پوهندوی دوکتور سید نجم الدین جلال	کابل طبی پوهنتون
۲۰۹	۱۴۰ طبي کتابونه په دی وی دی کې (پښتو، دري او انګلیسی)	بېلا بېل مؤلفین	ټول پوهنتونونه	۲۱۰	۲۱۴ طبي کتابونه په دی وی دی کې (پښتو، دري او انګلیسی)	بېلا بېل مؤلفین	ټول پوهنتونونه
۲۱۱	عصبي معاینات او سلوکپوهنه	پوهنوال داکتر جهان شاه تبی	خوست	۲۱۲	عصبي جراحي	پوهاند دوکتور بادشاه زار عبدالي	خوست
۲۱۳	د عامو کسرونو تړلې درملنه	پوهندوی دوکتور ظاهر گل منگل	خوست	۲۱۴	د ویني ناروغی	داکتر حیات الله احمدزی	ننګرهار
۲۱۵	د داخله ناروغیو تفریقي تشخیص لومړی برخه	پوهاند دوکتور سیف الله هادی	ننګرهار	۲۱۶	د داخله ناروغیو تفریقي تشخیص دهمه برخه	پوهاند دوکتور سیف الله هادی	ننګرهار
۲۱۷	امینو فارمکولوژي	پوهنوال دوکتور غلام ربی بېسودوال	ننګرهار	۲۱۸	د ماشومانو تنفسي، زړه، وینې او پښتورگو ناروغی	پوهاند داکتر نجیب الله امین	ننګرهار
۲۱۹	تشخیصیه رادیولوژي، دوهمه برخه، سینه یا صدر	دوکتور نور محمد شینواری	ننګرهار	۲۲۰	طبی فزیک	پوهنیاړ هدایت الله مهمند	ننګرهار
۲۲۱	رادیولوژي	پوهنوال داکتر سید عارف ویار	ننګرهار	۲۲۲	اندوکراینولوژي او رومانولوژي	پوهاند دوکتور سیف الله هادي	ننګرهار
۲۲۳	د کوچنیانو جراحي	پوهاند داکتر فضل الرحیم شگیوال	ننګرهار	۲۲۴	د سترګې کلینیکی ناروغی	پوهنوال داکتر عبدالصیر صافی	ننګرهار
۲۲۵	بیوفزیک	پوهنیاړ گل احمد سهیل	ننګرهار	۲۲۶	مالیکولي بیولوژي	پوهندوی جماعت خان همت	ننګرهار
۲۲۷	د ماشومانو انتاني ناروغی	پوهاند دوکتور عبدالستار نیازی	ننګرهار	۲۲۸	د ماشومانو اساسات، هضمي، اندوکرین او عصبي ناروغی	پوهاند سمیع الله حیات	ننګرهار
۲۲۹	تنفسي او د زړه روماتیزمل ناروغی	پوهندوی داکتر سلام جان شمس	ننګرهار	۲۳۰	یورولوژي	داکتر غازی جمال عبدالناصر	ننګرهار
۲۳۱	طبي جینیټیک	پوهندوی الفت شیرزی	ننګرهار	۲۳۲	د انسان عمومي کلینیکی امبریولوژي	داکتر عبدالله جان شینواری	ننګرهار
۲۳۳	انګلیسي پښتو طبي قاموس (لومړی ټوک)	رنځورمل دوکتور عجب گل مومند	ننګرهار	۲۳۴	انګلیسي پښتو طبي قاموس (دوهم ټوک)	رنځورمل دوکتور عجب گل مومند	ننګرهار
۲۳۵	د نور فزیک	پوهنیاړ هدایت الله مهمند	ننګرهار	۲۳۶	فارمکولوژي (دریم کال، دوهم سمستر لپاره)	پوهنوال دوکتور غلام ربی بېسودوال	ننګرهار
۲۳۷	د هډوکو اناتومي	پوهندوی حمیدالله حامد	خوست	۲۳۸	د قلبی وعایي، وینې، تنفسي او هضمي جهاز پتالوژي	پوهاند دوکتور خلیل احمد بېسودوال	ننګرهار
۲۳۹	روانشناسی عمومی	پوهاند ماریا صاعد سلطانی	بلخ	۲۴۰	په معاصر طب کې د فزیک پېژندنه	گل احمد سهیل	ننګرهار
۲۴۱	د حجرې بیولوژي	پوهندوی جماعت خان همت	ننګرهار	۲۴۲	سارس - ۲ او کووید-۱۹	پروفیسور دوکتور محمد شریف سروري	ټول پوهنتونونه
۲۴۳	د سر او غاړې اناتومي درسي کتاب (لومړی ټوک)	پوهندوی دوکتور یما صدیقي	ننګرهار	۲۴۴	د ټډيې ناروغی	پروفیسور دوکتور محمد شریف سروري	ټول پوهنتونونه
۲۴۵	د طب محصلینو درسي کتابونه	ډاکتر یحیی وردک	ټول پوهنتونونه	۲۴۶	د سر او غاړې اناتومي درسي کتاب (دوهم ټوک)	پوهندوی دوکتور یما صدیقي	ننګرهار
۲۴۷	د حجرې بیولوژي	پوهندوی جماعت خان همت	ننګرهار	۲۴۸	سارس - ۲ او کووید-۱۹	پروفیسور دوکتور محمد شریف سروري	ټول پوهنتونونه


تطبیق کوونکی: ډاکتر یحیی وردګ، د لوړو زده کړو وزارت مشاور، څلورمه کارته، کابل افغانستان، جون ۲۰۲۱

دفتري: 075601640، ایمیل: textbooks@afghanic.org, www.mohe.gov.af

افغاني درسي کتابونو ته آنلاین لاس رسي Access to Online Afghan Textbooks

ecampus-Afghanistan.org
kitabona.com

Full version of all textbooks can be downloaded as PDF from above website.



Publishing Textbooks

Honorable lecturers and dear students!

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To tackle this issue, we have initiated the process of providing textbooks to the students of medicine. For this reason, we have published 342 different textbooks of Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism and Agriculture from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-Beroni, Kabul, Kabul Polytechnic and Kabul Medical universities. The book you are holding in your hands is a sample of a printed textbook. It should be mentioned that all these books have been distributed among all Afghan universities and many other institutions and organizations for free. Out of the total, 96 medical textbooks funded by German Academic Exchange Service, 210 medical and non-medical textbooks funded by Kinderhilfe-Afghanistan, 7 textbooks funded by German-Afghan University Society, 2 textbooks funded by Consulate General of the Federal Republic of Germany, Mazar-e Sharif, 4 textbooks funded by Afghanistan-Schulen, 2 textbooks funded by SlovakAid, and 8 textbooks funded by Konrad Adenauer Stiftung. All the published textbooks can be downloaded from www.ecampus-afghanistan.org & www.kitabona.com.

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states:

"Funds will be made available to encourage the writing and publication of textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority areas, to improve the quality of teaching and learning and give students access to state-of-the-art information. In the meantime, translation of English language textbooks and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum reform. Without this facility it would not be possible for university students and faculty to access modern developments as knowledge in all disciplines accumulates at a rapid and exponential pace, in particular this is a huge obstacle for establishing a research culture. The Ministry of Higher Education together with the universities will examine strategies to overcome this deficit".

We would like to continue this project and to end the method of manual notes and papers. Based on the request of higher education institutions, there is the need to publish about 100 different textbooks each year.

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate or revise their lecture notes or written books and share them with us to be published. We will ensure quality composition, printing and distribution to Afghan universities free of charge. I would like the students to encourage and assist their lecturers in this regard. We welcome any recommendations and suggestions for improvement.

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the books according to the international standards, but if there is any problem in the book, we kindly request the readers to send their comments to us or the authors in order to be corrected for future revised editions.

We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book. We would also like to mention that he has provided funds for 210 medical and non-medical textbooks so far.

I am especially grateful to GIZ (German Society for International Cooperation) and CIM (Centre for International Migration & Development) for providing working opportunities for me from 2010 to 2016 in Afghanistan.

In our ministry, I would like to cordially thank Academic Deputy Minister Abdul Tawab Balakarzai, Financial & Administrative Deputy Minister Noor Ahmad Darwish, Advisor at Ministry of Higher Education Dr. Gul Rahim Safi, Chancellor of Universities, Deans of faculties, and lecturers for their continuous cooperation and support for this project.

I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues Hekmatullah Aziz and Fahim Habibi in the office for publishing and distributing the textbooks.

Dr Yahya Wardak

Advisor at the Ministry of Higher Education

Kabul, Afghanistan, May, 2021

Mobile: 0706320844, 0780232310

Email: textbooks@afghanic.org

Message from the Ministry of Higher Education



In history, books have played a very important role in gaining, keeping and spreading knowledge and science, and they are the fundamental units of educational curriculum which can also play an effective role in improving the quality of higher education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and today's requirements and based on educational standards, new learning materials and textbooks should be provided and published for the students.

I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very thankful to those who have worked for many years and have written or translated textbooks in their fields. They have offered their national duty, and they have motivated the motor of improvement.

I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish textbooks in their respective fields so that, after publication, they should be distributed among the students to take full advantage of them. This will be a good step in the improvement of the quality of higher education and knowledge transfer process.

The Ministry of Higher Education has the responsibility to make available new and standard learning materials in different fields in order to better educate our students.

Finally I am very grateful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan Children) and our colleague Dr. Yahya Wardak that have provided opportunities for publishing this book.

I am hopeful that this project should be continued and increased in order to have at least one standard textbook for each subject, in the near future.

Sincerely,
Abdul Tawab Balakarzai
Academic Deputy Minister of Higher Education
Kabul, 2021

Book Name	Medical Chemistry
Author	Associate Prof Amrullah Asefi
Publisher	Shaikh Zayed University, Khost, Education Faculty
Website	www.szu.edu.af
Published	2021, First Edition
Copies	1000
Serial No	338
Download	www.ecampus-afghanistan.org www.kitabona.com



This publication was financed by **Kinderhilfe-Afghanistan** (German Aid for Afghan Children) a private initiative of the Eroes family in Germany.

Administrative and technical support by Afghanic.

The contents and textual structure of this book have been developed by concerning author and relevant faculty and being responsible for it.

Funding and supporting agencies are not holding any responsibilities.

If you want to publish your textbooks, please contact us:

Dr. Yahya Wardak, Ministry of Higher Education, Karte – 4, Kabul

Office 0780232310, 0706320844

Email textbooks@afghanic.org

All rights reserved with the author.

Printed in Afghanistan 2021

ISBN 978-9936-620-73-5