


عضوی کیمیا

کړیوال ترکیبونه

پوهاند دوکتور محمد غوث حکیمی

Afghanic



ننگرهار ساینس پوهنځی

Pashto PDF
2015

Funded by
Kinderhilfe-Afghanistan

Organic Chemistry

Cyclic Compounds

Prof Dr M Ghaus Hakimi

Download: www.ecampus-afghanistan.org



ننگرهار ساينس پوهنځی

عضوی کیمیا
کړيوال ترکیبونه




Nangarhar Science Faculty

Afghanic

عضوی کیمیا کړيوال ترکیبونه

Prof Dr M Ghaus Hakimi



Organic Chemistry
Cyclic Compounds

Organic Chemistry Cyclic Compounds

Funded by
Kinderhilfe-Afghanistan


پوهاند دوکتور محمد غوث حکیمی

۱۳۹۴

خرشول منع دي



پوهاند دوکتور محمد غوث حکیمی
۱۳۹۴



ISBN 817525766-0



Not for Sale

2015

بسم الله الرحمن الرحيم


عضوی کیمیا

کریوال ترکیبونه

لومری چاپ

پوهاند دوکتور محمد غوث حکیمی

دغه کتاب په پی دی اف فورمت کی په مله سی دی کی هم لوستلی شی:



د کتاب نوم د عضوی کیمیا
 لیکوال کړیوال ترکیبونه
 خپرندوی پوهاند دوکتور محمد غوث حکیمی
 ویب پاڼه ننګرهار ساینس پوهنځی
 چاپ شمېر ۱۰۰۰
 د چاپ کال ۱۳۹۴، لومړی چاپ
 ډاونلوډ www.ecampus-afghanistan.org
 چاپ ځای افغانستان تایمز مطبعه، کابل



دا کتاب د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمیټې په جرمني کې د
 Eroes کورنۍ یوې خیریه ټولنې لخوا تمویل شوی دی.
 اداري او تخنیکي چارې یې په آلمان کې د افغانیک لخوا ترسره شوي
 دي.
 د کتاب د محتوا او لیکنې مسؤلیت د کتاب په لیکوال او اړونده
 پوهنځی پورې اړه لري. مرسته کوونکي او تطبیق کوونکي ټولنې په
 دې اړه مسؤلیت نه لري.

د تدریسي کتابونو د چاپولو لپاره له موږ سره اړیکه ونیسئ:
 ډاکټر یحیی وردک، د لوړو زده کړو وزارت، کابل
 تیلیفون: ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰
 ایمیل: textbooks@afghanic.org

د چاپ ټول حقوق له مؤلف سره خوندي دي.
 ای اس بی ان ۰ - ۸۱۷۵۲۵۷۶۶



د لوړو زده کړو وزارت پیغام

د بشر د تاریخ په مختلفو دورو کې کتاب د علم او پوهې په لاسته راوړلو، ساتلو او

خپرولو کې ډیر مهم رول لوبولی دی. درسي کتاب د نصاب اساسي برخه جوړوي چې د زده کړې د کیفیت په لوړولو کې مهم ارزښت لري. له همدې امله د نړیوالو پیژندل شویو معیارونو، د وخت د غوښتنو او د ټولنې د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره باید نوي درسي مواد او کتابونه د محصلینو لپاره برابر او چاپ شي.

له ښاغلو استادانو او لیکوالانو څخه د زړه له کومي مننه کوم چې دوامداره زیار یې ایستلی او د کلونو په اوږدو کې یې په خپلو اړوندو څانگو کې درسي کتابونه تألیف او ژباړلي دي، خپل ملي پور یې اداء کړی دی او د پوهې موتور یې په حرکت راوستی دی. له نورو ښاغلو استادانو او پوهانو څخه هم په درنښت غوښتنه کوم تر څو په خپلو اړوندو برخو کې نوي درسي کتابونه او درسي مواد برابر او چاپ کړی، چې له چاپ وروسته د گرانو محصلینو په واک کې ورکړل شي او د زده کړو د کیفیت په لوړولو او د علمي پروسې په پرمختګ کې یې ښکېل ګام اخیستی وي.

د لوړو زده کړو وزارت دا خپله دنده بولي چې د گرانو محصلینو د علمي سطحې د لوړولو لپاره د علومو په مختلفو رشتو کې معیاري او نوي درسي مواد برابر او چاپ کړي.

په پای کې د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمیټې له رئیس ډاکټر ایروس او زموږ همکار ډاکټر یحیی وردګ

څخه مننه کوم چې د کتابونو د خپرولو لپاره یې زمینه برابره کړې ده.

هیله منده یم چې نوموړې ګټوره پروسه دوام وکړي او پراختیا ومومي تر څو په نږدې راتلونکې کې د هر

درسي مضمون لپاره لږ تر لږه یو معیاري درسي کتاب ولرو.

په درنښت

پوهنوال دوکتور فریده مومند

د لوړو زده کړو وزیر

کابل، ۱۳۹۴

د درسي کتابونو چاپول

قدرمنو استادانو او گرانو محصلينو!

د افغانستان په پوهنتونونو کې د درسي کتابونو کموالی او نشتوالی له لویو ستونزو څخه گڼل کېږي. یو زیات شمیر استادان او محصلین نوي معلوماتو ته لاس رسی نه لري، په زاړه میتود تدریس کوي او له هغو کتابونو او چپترونو څخه ګټه اخلي چې زاړه دي او په بازار کې په ټیټ کیفیت فوتوکاپي کېږي.

تراوسه پورې مونږ د ننگرهار، خوست، کندهار، هرات، بلخ او کاپیسا د طب پوهنځیو او کابل طبي پوهنتون لپاره ۱۷۶ عنوانه مختلف طبي تدریسي کتابونه چاپ کړي دي، چې د هغوی له جملې څخه ۹۵ د DAAD او ۸۰ نور د kinderhilfe-Afghanistan په مالي مرسته چاپ شوي دي. د ننگرهار پوهنتون لپاره د ۲۰ نورو غیرطبي کتابونو د چاپ چارې روانې دي. د یادونې وړ ده چې نوموړي چاپ شوي کتابونه د هیواد ټولو طب پوهنځیو ته په وړیا توګه ویشل شوي دي.

هر څوک کولای شي ټول چاپ شوی طبي او غیر طبي کتابونه

د www.afghanistan-ecampus.org ویب پاڼې څخه ډاډمنولې کړي.

دا کړنې په داسې حال کې تر سره کېږي چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د (۲۰۱۰ - ۲۰۱۴) کلونو په ملي ستراتیژیک پلان کې راغلي دي چې:

"د لوړو زده کړو او د ښوونې د ښه کیفیت او زده کوونکو ته د نویو، کره او علمي معلوماتو د برابرولو لپاره اړینه ده چې په درې او پښتو ژبو د درسي کتابونو د لیکلو فرصت برابر شي د تعلیمي نصاب د ریډفورم لپاره له انګریزي ژبې څخه درې او پښتو ژبو ته د کتابونو او درسي موادو ژباړل اړین دي، له دې امکاناتو څخه پرته د پوهنتونونو محصلین او استادان نشي کولای عصري، نویو، تازه او کره معلوماتو ته لاس رسی پیدا کړي".

د لوړو زده کړو وزارت، پوهنتونونو، استادانو او محصلینو د غوښتنې په اساس موږ دا پروګرام غیر طبي برخو ته لکه ساینس، انجنیري، کرهڼې او نورو پوهنځیو ته هم وغځاوه، تر څو د مختلفو پوهنتونونو او پوهنځیو د اړتیا وړ کتابونه چاپ شي.

مونږ غواړو چې د درسي کتابونو په برابرولو سره د هیواد له پوهنتونو سره مرسته وکړو او د چپتر او لکچر نوټ دوران ته د پای ټکی کېږدو. د دې لپاره دا اړینه ده چې د لوړو زده کړو د موسساتو لپاره هر کال څه نا څه ۱۰۰ عنوانه درسي کتابونه چاپ شي.

له ټولو محترمو استادانو څخه هیله کوو، چې په خپلو مسلکي برخو کې نوي کتابونه ولیکي، وژباړي او یا هم خپل پخواني لیکل شوي کتابونه، لکچر نوټونه او

چپټرونه ايډېټ او د چاپ لپاره تيار کړي. زمونږ په واک کې يې راکړي، چې په ښه کيفيت چاپ او وروسته يې د اړوندې پوهنځۍ استادانو او محصلينو په واک کې ورکړو. همدارنگه د يادو شويو ټکو په اړوند خپل وړانديزونه او نظريات له مونږ سره شريک کړي، تر څو په گډه پدې برخه کې اغيزمن گامونه پورته کړو.

د يادونې وړ ده چې د مولفينو او خپروونکو له خوا پوره زيار ايستل شوی دی، ترڅو د کتابونو محتوايې د نړيوالو علمي معيارونو په اساس برابر شي، خو بيا هم کيدای شي د کتاب په محتوی کې ځينې تيروتنې او ستونزې وليدل شي، نو له درنو لوستونکو څخه هيله مند يو تر څو خپل نظريات او نيوکې مولف او يا مونږ ته په ليکلې بڼه راوليږي، تر څو په راتلونکي چاپ کې اصلاح شي.

د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کميټې او د هغې له مشر ډاکټر ايروس څخه ډېره مننه کوو چې د دغه کتاب د چاپ لگښت يې ورکړی دی. دوی په تيرو کلونو کې هم د ننگرهار د طب پوهنځي د ۸۰ عنوانه طبي کتابونو د چاپ لگښت پر غاړه درلود. په ځانگړي توگه د جې آي زيت (GIZ) له دفتر او (CIM) Center for International Migration & Development چې زما لپاره يې په تېرو پنځو کلونو کې په افغانستان کې د کار امکانات برابر کړي دي، هم د زړه له کومې مننه کوم.

د لوړو زده کړو وزيره پوهنوال دوکتور فريده مومند، علمي معين پوهنوال محمد عثمان بابري، مالي او اداري معين پوهنوال ډاکټر گل حسن وليزي، د ننگرهار پوهنتون سرپرست رييس پوهنوال ډاکټر محمد طاهر عنايت، د ننگرهار پوهنتون پوهنځيو رييسانو او استادانو څخه مننه کوم چې د کتابونو د چاپ لړۍ يې هڅولې او مرسته يې ورسره کړې ده. د دغه کتاب له مولف څخه ډير منندوی يم او ستاينه يې کوم، چې خپل د کلونو کلونو زيار يې په وړيا توگه گرانو محصلينو ته وړاندې کړ.

همدارنگه د دفتر له همکارانو هر يو حکمت الله عزيز، احمد فهيم حبيبي او فضل الرحيم څخه هم مننه کوم چې د کتابونو د چاپ په برخه کې يې نه سترې کيدونکې هلې ځلې کړې دي.

ډاکټر يحيی وردگ، د لوړو زده کړو وزارت سلاکار

کابل، جون ۲۰۱۵

د دفتر تيليفون: ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰

ايميل: textbooks@afghanic.org

لړلیک

مخ	عنوان
1	سریزه.....
3	لومړی څپرکی.....
3	کړیوال ترکیبونه.....
3	الي سکلیک ترکیبونه.....
4	د مالیکولونو جوړښت او ایزومرونه.....
11	فزیکی او کیمیاوي خاصیتونه.....
16	ځانگړي استازي او پکارول ئي.....
20	دوهم څپرکی.....
20	اروماتیک ترکیبونه.....
24	ایزومیري او نوم اېښودنه.....
26	لاسته راوړل:.....
29	فزیکی خاصیتونه.....
30	د بنزین او د هغه هومولوگ بهیر کیمیاوي خاصیتونه:.....
36	د اروماتیک هایډروکاربنونو جمعي تعاملات.....
37	اکسیدېشنی تعاملات.....
39	په بنزین کې د الکتروفیلی تعویضي گانو لوری نیول (توجیه کېدل).....
47	اروماتیک هلوچني مشتقات.....
47	د لاسته راوړلو لارې چارې.....
50	فزیکی خاصیتونه.....
50	کیمیاوي خاصیتونه.....
53	اروماتیک سلفواسیدونه.....
53	د لاسته راوړلو لارې چارې.....
54	فزیکی خاصیتونه.....
55	کیمیاوی خاصیتونه.....
58	اروماتیک نایترو ترکیبونه.....
58	هغه نیترو ترکیبونه چې نیتروگروپ ئي په کړۍ کې ځای پر ځای شوی وي.....
61	فزیکی خاصیتونه.....
61	کیمیاوي خاصیتونه.....
66	هغه نیترو ترکیبونه چې په اړخ پورې تړلي ځنځیر کې نیترو گروپ لري.....
67	فزیکی او کیمیاوي خاصیتونه.....
68	هایډروکسي اروماتیک ترکیبونه.....
68	فینولونه.....
69	یو اتومه فینولونه.....
71	فزیکی خاصیتونه.....
71	کیمیاوي خاصیتونه.....
77	دوه اتومه فینولونه.....

80	درې اتومه فينولونه
83	اروماتيک الکولونه
86	اروماتيک امينونه
88	د اروماتيک امينونو خاصيتونه
94	امينو فينولونه
96	اروماتيک الديهايدونه او کيتونونه
103	اروماتيک کيتونونه
106	کينونونه
110	اروماتيک عضوي اسيدونه
118	اروماتيک ترکيبونه چې د څو هغو بنزيني کړيو چې سره نښتي نوي لرونکي وي
122	سره نښتي بنزيني کړيوال ترکيبونه او د هغوی مشتقات
130	سره نښتي کړی لور اروماتيک ترکيبونه
131	هغه اروماتيک ترکيبونه چې بنزيني ندي
135	هتروسکلیک ترکيبونه
137	پنځه غړي لرونکي هتروسکلیک ترکيبونه چې يو هترواټوم ولري
149	تيوفن
151	پنځه غړي لرونکي هتروسکلیک ترکيبونه چې دوه هترو اټومونه ولري
155	اميدازول
156	تيازول
158	هغه شپږ غړي لرونکي هتروسکلیک ترکيبونه چې يو هترو اټوم لري
166	الکالوئيدونه
167	نيکوتين
168	انابازين
168	Quinine (کيونيڼ)
170	مورفين
170	ارگوتامين

مخکنی خبرې

د کیمیا پوهنې ټولو مینه والو ته جوته ده چې دې علم د ډیرو نور علومو په پرتله په بې ساري ډول پراختیا موندلې بېلا بیلې زیاتې څانګې یې رامنځته شوې او بې شمیره ګټور ترکیبونه یې پیژندل شوي دي، چې یوه لویه برخه یې هم کریوال ترکیبونه دي.

د کریوالو تر کیمیا په اړوند زیات شمېر کتابونه لیکل شوي او د دې برخې اهمیت او د کیمیا پوهانو په آند هغې د کیمیاوي صنایعو نږدې له نیمایي څخه زیاتې برخې نیولې او په درملې موادو، چاودیدونکو او نیشه ای توکو، د ژوندانه اړینو موادو او بیوشیمی کې اوچت مقام لري.

د دې برخې کیمیا ډیره پېچلې خو بیا ډیره په زړه پورې ده چې که هر څه کې وڅېړل شي د ډیرو کتابونو لیکلو ته اړتیا ده.

ما دا کتاب د راکړل شوي دندې له مخې ډیر لنډ ولیکه چې هغه یواځې د کریوالو ترکیبونو د لویې نړۍ یوه کلي وګرزي، ترڅو مینه وال یې له هغوی سره پیژند ګلوي ولري.

زه دا هم باید ووايم چې د دې عملي اثر په اړوند چې د دریو پوهنتونونو (کابل، ننګرهار او پولې تخنیک) د کیمیا د علمي صلاحیت لرونکو پیاوړو استادانو د نظر غوښتنه هم وکړه، هغوی (پوهاند دکتور محمد عارف تڼیوال، پوهاند دکتور اسرارالدین ګلزار او پوهاندعارف الله مندوزی) پدې علمي اثر په زړه پورې تقریظونه ولیکل چې د زړه له کومي ورڅخه مننه کوم.

زه دا هم باید ووايم چې په ټولېزه توګه د عضوي کیمیا او په تېره بیا د کریوالو ترکیبونو د کیمیاوي فورمولونو لیکل یو څه ستونزمن کار ګڼل کېږي، نوکه ځینې یې بیخي ستندرد نوي نو بیا بڼه غواړم او هیله من چې په اړوند یې لوستونکي د نیمګړتیا وو د لیرې کولو لارښونه وکړي.

په درناوی

سریزه

دا یو څرگند حقیقت دی چې عضوي کیمیا همدا اوس اوس د کیمیا پوهنې هغه خورا لویه برخه ده چې یوازې د یوه ځانګړي مضمون په توګه چې پکښې د هغه اړوندې ټولې د پام وړ برخې تر ګټې او څېړنې لاندې ونيولې شي کله نا کله هم له امکانه لیرې برېښي، دا ځکه چې دغه علم ډېر پرمختګ کړی، ډېرې نوی ځانګړي ټولګې پراختیا لري. او د بشریت د هوساینې په موخه به شمېره اړوند ترکیبونه ټول هم لاسته راغلي، کیمیاوي او فزیکي خاصیتونه ټول ښه پېژندل شوي دي. د ساري په توګه: له $\frac{3}{4}$ برخو څخه زیات شمېر درملونه،

نږدې ټول خوراكي توکي، کاغذ، زیات شمېر چاودېدونکي مواد، هارمونونه، ټول پلاستيکونه او رابر، مصنوعي سپینسي، توکران، چرم، لاک او ورنس، د سونګ مواد، صابون او د مینځلو توکي او ټوله پتروشیمي او داسې نورې برخې هغه ځانګړي دي چې عضوي کیمیا ګټه، څېړنه او پالنه کوي.

د پورتنیو ټکو په پام کې لرلو سره د دې علم په ټولیزه توګه سره درسي پروګرامونو هم پراختیا موندلې چې ددرسي مفرداتو په پام کې لرلو سره د هغه د بشپړ درسي پروګرام سر ته رسول د پولي تخنیک په شان پوهنتونونو کې ناشونی برېښي، دلته خو بله ستونزه دا هم ده چې د ګرځندګرۍ درسي سیستم په پام کې لرلو سره چې په هغه کې د دې مضمون ساعتونه بیا هم ډېر کم ګڼل کېږي، دا ځکه چې د دې علم په اړوند عام معلومات او د اړوندو لابراتواري تجربو چې باید هر وروستو سر ته ورسېږي ډېر ګران کار دی، نو ځکه د کابل پولیتخنیک پوهنتون د کیمیا ځانګړي علمي مجلس په خپله پرېکړه سره دا دنده ماته را په غاړه کړه چې د ټولو پورتنیو ستونزو په پام کې لرلو سره د عضوي کیمیا د کړیوالو ترکیبونو ځانګړی علمي اثر ولیکم.

د دغه علمي پرېکړې پر بنسټ مې هغه ولیکلو چې په لنډه توګه بشپړ شوی او ټول پولي تخنیکي علمي او تخنیکي نورمونه پکښې په پام کې نیول شوي دي. دا چې دلته د روسي ژبې زده کړه د درسي پروګرام هرو مرو ګڼل شوې برخه ده خو په عملي توګه محصلان په هغه نه پوهېږي نو ځکه د علمي ترمېنالوژۍ په اړوند ما د خپلې ژبې د رسم الخط په پکارولو سره دا ستونزه حل کړې خو ځینې ډېر ساده او آسانه نومونه مې په انګلیسي رسم الخط هم لیکلي او دا ځکه چې محصلان په راتلونکي کې ورو ورو له هغه سره بلدتیا ومومي.

زه باید دا هم ووايم چې د کړیوالو ترکیبونو په نوم دا یو بشپړ د عضوي اړوند کتاب ندی او د پولي تخنیکي او هغه ته ورته نورو پوهنتونونو کیمیاوي انجنیري څانګو لپاره د زیاتو علمي او تعلیمي ستونزو چې مخکې مې هم ورته ګوته ونيوله بشپړ شوی دی، همدارنګه زیات زیار ایستل شوی چې د کیمیاوي موادو

صنعتي او په ژوندانه کې اهمیت ته د لوستونکو پام واپړول شي ترڅو د مسلک له مخې هغوی ته په زړه پورې وي. که ځینې محصلان لازياتو معلوماتو ته اړ شي، داسې نور تفصيلي درسي مواد او کتابونه هم شته چې هغوی ته ئې سپارښتنه کوم. او پدې لاره کې ئې د لازياتو برياليتوبونو هيله من یم.

پوهاند دکتور محمد غوث حکيمي

لومړۍ څپرکۍ

کړيوال ترکیبونه

دا ټولو ته څرگنده ده چې عضوي ترکیبونه په دوو لویو برخو وېشل شوي دي. لومړۍ خورا لویه برخه هغه عضوي ترکیبونه دي چې د کاربنی اتومونو ځنځیر نې خپور او پرانیستی دی ځینې وخت یوه لیکه او ځینې وخت هم ځانګړي لرونکي وي. دوهمه برخه هغه ترکیبونه دي چې کاربنی ځنځیر په هغوی کې کړۍ جوړوي، کېدای شي د کړیو په جوړښت کې کله کله هم په کاربنی ځنځیر کې له کاربنی اتم پرته د کوم بل عنصر اتم لکه N, S, O او داسې نور هم برخه ولري خو د دې ګروپ په پرتله هغه ترکیبونه چې کړۍ نې یوازې د کاربنی اتومونو څخه جوړې شوې وي ډېر دي.

د کړیوالو ترکیبونو له نوم څخه هم څرګندېږي چې د هغوی مالیکولونه د کړۍ جوړښت ولري خو دا هم باید په یاد ولرو چې په کړۍ برسېره هغه عضوي ځانګړي چې په کړۍ پورې نښتي وي دا ترکیبونه هم د کړیوالو ترکیبونو اساسي برخه جوړوي. دا ترکیبونه په همدې ډول مشبوع او غیر مشبوع دي نو ځکه هم د هغوی کیمیاوي تعاملات د زیات پام وړ ګڼل کېږي.

د دې لپاره چې د کړیوالو ترکیبونو کتنه او څېړنه په ښه توګه سرته ورسېدای شي، هغوی په څو برخو ویشي. هره ځانګړې ځانګړې خاصیتونه لري او د خپل اهمیت له مخې په ځانګړې توګه د اهمیت وړ شمیرل کېږي او دا ترکیبونه د آلي سکلیک، اروماتیک او هتروسکلیک په نومونو سره نومول شوي دي. دا هم باید وویل شي چې آلي سکلیک او اروماتیک ترکیبونه دواړه د کاربوسکلیک ترکیبونو په نوم سره هم یادېږي چې د هغوی اړوندې کړۍ یوازې د کاربنی اتومونو څخه جوړې شوې او که په کړۍ کې بېله کاربنی اتومونو څخه د نورو عناصرو اتومونو لکه N, S, O او داسې نور هم برخه ولري نو بیا دا ډول کړیوال ترکیبونه هتروسکلیک ترکیبونه نومېږي.

آلي سکلیک ترکیبونه


خورا ساده الیسکلیک ترکیبونه سکلو پارافینونه دي چې د پولي متلیني او یا نفتني ترکیبونو په نومونو سره نې هم یادوي او د نفتني ترکیبونو په نوم سره نې ځکه یادولای شو چې د ځینې نفتونو په جوړښت کې هغوی د پام وړ ونډه لري. د دې لړۍ پنځه او شپږ غړی لرونکي ډېر نامتو عضوي ترکیبونه بلل کېږي چې په عضوي کیمیا کې د زیات اهمیت وړ ګڼل کېږي، شپږ غړي لرونکي نې همدارنګه دهایدرو اروماتیکي ترکیبونو په نوم سره هم یادوي. د سکلو

پارافینونو تر څنگه په همدې ډول سکلو اولیفینونه، سکلو دای اولیفینونه، سکلو استلینونه او داسې نور هم د یادونې وړ دي.


د مالیکولونو جوړښت او ایزومیرونه

په سکلو الکانونو کې هم د مالیکولونو جوړښت د الکانونو په شان دی، پدې مانا چې دلته هم په مالیکولونو کې اړیکې د sp^3 هایبرید کېدو پر بنسټ رامنځته شوې دي او اړیکې د σ حالت لرونکې دي. د دې لړۍ د هومولوژیک بهیر عمومي فورمول $(CH_2)_n$ او یا C_nH_{2n} دی چې له هغه څخه دا څرگندېږي چې ګواکې له پارافینونو څخه یوازې دوه هایډروجنې اتومونه کم لري (له هغه پارافینونو څخه چې سره برابر کاربنې اتومونه لري). د دې دوه هایډروجنې اتومونه کموالی په دغه هایډروکاربنونو کې اصلاً د دوه ګونې اړیکې په ځای د کړۍ د رامنځته کېدو لامل ګرزي.


په دغه هایډروکاربنونو کې د نوم اېښودنې اساسي ټکی دا دی چې یوازې د سکلو (cyclo) چې د کړۍ مانا لري په اړوندو پارافینونو ورزیاتېږي.




Cyclopropane



Cyclobutane




Cyclopentane



Cyclohexane


همدارنگه په دغه هایډروکاربنونو کې نوم اېښودنه د کړۍ په ارتوالي او پر هغه پورې تړلې ځنځیرونو پورې اړه لري. دا چې د اړخ ځنځیرونه یا په بل عبارت تړلې برخې په کوم کاربنې اتوم او څه ډول نښتې دي، هم دلته د پام وړ موضوع ګڼل کېږي. د دې لړۍ ایزومیرونه د C_5H_{10} هایډروکاربن په جوړښت کې په لاندې ډول ښه څرګندېدای شي.




Cyclopentane




Methylcyclobutane



Ethylcyclopropane




1,1- Dimethylcyclopropane




1,2- Dimethylcyclopropane


کېدای شي چې په همدې ډول په نورو سکلو الکانونو کې هم ایزومیر شکلونه په بڼه توګه وښودل شي، کېدای شي چې ایزومیري شکلونه د تعویضي برخې په بدلون سره رامنځته شي او یا دا چې په اړونده کړۍ کې د تعویضي برخې ځایونه بدلون ومومي.




۱- میتایل ۲- پروپایل
سکلو هکزان




۱،۲- دای ایتایل
سکلو هکزان



۱،۲- دای میتایل
سکلو هکزان





۱،۳- دای میتایل سکلو هکزان




۱،۴- دای میتایل سکلو هکزان


سکلو الکانونه همدارنگه د دي وړتيا لري چي سنټرو ايزوميري شکلونه هم جوړ کړي خو هېر مو نه شي چي که په اړونده کړۍ کي يوازي يو تعويضي شتوالی ولري دا ايزوميري نه جوړېږي. دوه تعويضه لرونکي ترکيبونه دا ايزوميرونه د سيس او ترانس په توگه جوړولای شي. لاندې شکلونه د دي حالت بشودونکي دي.




لکه مخکې چي هم وويل شول کېدای شي پدې هايډروکاربنونو کي کړۍ او يا په هغوی پورې تړلي ځنځيرونه نامشروع هم وي، د هغوی ايزوميري څېړنې او همدارنگه ايزوميرونه او نوم اېښودنه بيا هم د الکانونو د اصولو ملاتړ کوي. داسې الکانونه هم شته چي دوه يا څو کړۍ سره نښتي ولري، د هغوی په نوم اېښودنه کي لازمه ده چي د هغوی د ماليکول د ټولو کړيو کاربنې اتومونه وشمېرل شي او له هغوی سره جوخت د هغه کاربنې اتومونو شمېره چي د کړيو د ټولو کاربنې اتومونو تر منځ ځای لري په قوسونو کي وليکل شي. دا هم په ياد ولری چي نمره اېښودنه د اوږد منشعب ځنځير په کاربنې اتومونو پورې اړونده ده.






سکلو پروپان




سکلو بوتان




1، 2- دای میتایل سکلو پنتان




3- سکلو پنتا دای ین میتایل - 1، 3 2- میتایل - 1، 3 4- وینایل سکلو هکزن 3(2- میتایل-1- پروپنیل) -1- سکلو هکزان




سکلو هکزانول




میتایل سکلو پروپایل کیتون




سکلو پنتان کاربوکسایلیک اسید



بای سکلو (0، 1، 3) هکزان



بای سکلو (0، 2، 2) هکزان




ترای سکلو (1، 1، 3، 3) دکان، اد منتان

سکلو الکانونه په طبیعت کې ډېر پیدا کېږي او د هغوی لویه سرچینه نفت دي چې پکښې پنځه او شپږ غړي لرونکي سکلو الکانونه او د هغوی مشتقات برخه لري. هغوی په همدې ډول د نفتونو په نوم سره هم یادېږي، د دې لړۍ ځینې اړوند ترکیبونه د ځینې بوټو په اړونده اصلي تېلو کې هم پیدا کېږي. د ساري په ډول ۱- میتایل ۴ ایزوپروپایل سکلو هکزان چې د تارپیني تېلو اساسي زړی جوړوي، طبیعتاً په پورتنیو ډول تېلو کې پیدا کېږي.


د سکلو الکانونو د لاسته راوړلو کیمیاوي مهمې لارې چارې په لاندې ډول بنودلای شو.

۱. د جست په مرسته د دای هلوځنه الکانې مشتقاتو څخه لاسته راتلای شي.





د پورتنی میتود په مرسته سکلو پروپان او د هغه اړوند ترکیبونه په ښه توګه په لاس راتلای شي. په همدې ډول له ۱، ۴ – دای بروم بوتان څخه سکلو بوتان لاسته راوړلای شو. پدې تعاملاتو کې همدارنګه له فلزي سوډیم څخه هم کار اخیستل کېدای شي.

۲. د سکلو هکزان اړوند ترکیبونه په ډېره ښه توګه په کیمیاوي صنایعو کې له بنزین څخه د هایډروجنیشن د عمليې په پایله کې لاسته راتلای شي.




۳. په همدې ډول که د الکانونو دای هلوځنه مشتقات د سوډیمې ملونیک ایستر سره تعامل وکړي، نو دا ترکیبونه لاسته راتلای شي.






د اړوند دای هلوځنه مشتق په پام کې لرلو سره کېدای شي د پورتنی میتود په مرسته سره له دریو څخه بیا تر شپږ غړي لرونکي سکلو الکاني ترکیبونه لاسته راوړل شي.

۴. د شپږ کاربنه ځنځیر څخه پیل، کېدای شي چې د اړوندو انهایدر دوه اساسه اسیدونو څخه د مالگو له دی کاربوکسیلیشن څخه د ۵، ۶ او یا له هغه څخه د زیاتو کاربنی اتومونو لرونکو سکلو الکاني مشتقات لاسته راوړل شي.





داسې ځانگړي لارې چارې شته چې الی سکلیک ترکیبونه چې ډول ډول کړی ولري لاسته راوړو.


۱. درې غړي لرونکي سکلو الکانونو د کاربینونو په مرسته چې دوه ولانسه رادیکالونه دي د اړوندو ترکیبونو سره لاسته راوړلای شو.




دای ازومیتان




دای کلور کاربن



۲. څلور غړي لرونکي سکلو الکانونو د تترافلوراتلین له تعامل څخه د اړوند غیر مشبوع هایدروکاربن سره لاسته راځي.




د پورتنۍ میتود په پام کې لرلو سره کېدای شي د البنونو له دای مرايزیشن څخه اړوند سکلو الکانونه لاسته راشي.



۳،۱- دای متلین سکلوپوتان ۲،۱- دای متلین سکلوپوتان


۳. له پنځو څخه تر اوو غړو لرونکو پورې سکلو الکانونه لکه مخکې چې وویل شول د هغوی د اړوندو دوه اساسه اسیدونو له دي کاربوکسیلیشن څخه لاسته راځي.

۴. مخکې مو هم وویل چې شپږ غړي لرونکي هایدروکاربنونه (سکلو الکانونه) د اړوندو اروماتیک هایدروکاربنونو له هایدروجنیشن څخه لاسته راځي، خو دا ډول ترکیبونه او د هغوی اړوند مشتقات په همدې ډول د دي یني سنتیز په مرسته هم لاسته راټلای شي، لکه:




۴- وینایل ۱- سکلو هگزن

۵. که وغواړو چې اته غړي لرونکي سکلو الکانونه لاسته راوړو نو کولای شو چې د استلین د تترامرايزیشن او یا د ۳،۱- الکاډي ین د دای مرايزیښي تعامل پر بنسټ د ځانگړو کتلستونو په مرسته اړوند تعامل سرته ورسوو.



سکلو اوکټائترایین



۱، ۵- سکلو اوکټادی ین

داسې لارې چارې هم شته چې ډېر لوړ سکلو الکانونه د هغوی په مرسته لاسته راوړل کېدای شي. د ساري په توګه ۳۰ غړي لرونکي یا له هغوی څخه هم زیات غړي لرونکي الکانونه د هغو دوه اساسه عضوي اسیدونو د ډي کاربوکسیلیشن په پایله کې چې د توریم مالګو تر اغیزې لاندې په وچ تقطیر سره سرته رسېږي لاسته راځي.




فزیکي او کیمیاوي خاصیتونه

له هر څه د مخه د دې ترکیبونو په اړوند چې څه ډول خاصیتونه لري د هغوی د کړیو د ځانګړتیا په هکله باید څه وویل شي. له وروستیو څېړنو څخه داسې څرګندېږي چې د سکلو پارافینونو کیمیاوي خاصیتونه د هغوی د کړیو په ارتوالي پورې اړوند دي او څومره چې کړۍ د کاربنی اتومونو د شمېر له مخې په توپیر کې وي په هغه اندازه دهغه خاصیتونه هم فرق کوي، له دې امله دا هایډروکاربنونه په څلورو ډلو ویشل کېږي. وړې کړۍ (C_3-C_4)، اساسي کړۍ (C_5-C_7)، منځنۍ کړۍ (C_8-C_{11}) او ارتې کړۍ (له C_{12} څخه پورته) کړۍ چې د مکرو کړیو په نوم سره هم یادېږي. د وړوکو کړیو خصوصیت او ځانګړتیا دا ده چې د نورو کړیوالو ترکیبونو په پرتله د هغوی پیاوړتیا (ثبات) کمه وي، دا کړۍ د زیات انرژي په لرلو سره د هر یو CH_2 په زیاتېدو سره د هغوی د سوزېدو انرژي کموالی مومي، د ساري په توګه:


سکلو پروپان -۶۹۵ کیلو جول په یوه مول کې سکلو هکزان -۶۵۷ کیلو جول په یوه مول کې سکلو بوتان -۶۸۶ کیلو جول په یوه مول کې مکروسایکلونه -۶۵۷-۶۶۰ کیلو جول په یوه مول کې سکلو پنتان -۶۶۱ کیلو جول په یوه مول کې پورتنۍ تیوري چې په ۱۸۸۵ کال کې ئې A. Baeyer بنسټ ایښی دی په دغه ترکیبونو کې د کاربنی اتومونو په تترائیدریک جوړښت پورې اړه لري چې ګواکې د $109^{\circ}, 28'$ کونج (زاویې) د راکښولو توان د دې لامل ګرزي چې دمالیکولونو پیاوړتیا زیاتوالی ومومي او هر څومره کونجونه CH_2 چې زیات شي په هغه اندازه بیا د مالیکولونو کیمیاوي توانمندی کمېږي.

د سکلو پارافینونو دوه لومړي استازي ګازات، له $C_5 - C_{10}$ پورې مایع او نور لوړ استازي ئې جامد ترکیبونه دي. د سکلو پارافینونو د اېشېدو او ویلېکېدو تودوخې او همدارنګه د هغوی کثافتونه د هغوی د اړوندو پارافینونو څخه لوړ دي. سکلو پارافینونه د پارافینونو په څېر په اوبو کې نه حلېږي. د کیمیاوي خاصیتونو له مخې وړې کړۍ لرونکي سکلو الکانونه جمعي یا ټولیز تعاملات په ښه توګه سرته رسولای شي او دا د هغوی ورته والی له غیر مشبوع هایډروکاربنونو سره ښی، په داسې حال کې چې د هغوی ارتي کړۍ لرونکي ترکیبونه بیا په تعویضي تعاملاتو کې ګډون کوي او پدې ډول دا د هغوی ورته والی پارافینونو ته دی.

۱. دا ترکیبونه په هایډروجنېشن تعاملاتو کې د نکل په شتوالي کې چې د کتلست رول لوبوي ګډون کوي.





دا هم باید وویل شي چې شپږ غړي لرونکي سکلو الکانونه د تودوخې او کتلست تر اغیزې لاندې هم دې هایډروجنېشن کېږي او بیا بېرته خپل لومړی حالت ته راګرزي، پدې مانا چې هغه پدې تعامل کې هم اروماتیک ترکیب جوړوي او هم بیرته سکلو الکانی حالت ته راګرزي.




۲. آکسیدیشن: سکلوالکانونه او د هغوی اړوند مشتقات کولای شي اوکسیدایز شي، سکلو پروپان او همدارنگه د هغه مشتقات هم د کوتي په تودوخه ورو ورو آکسیدیشن کېږي او هغه هم هغه وخت چې دا ترکیب د پوتاشیم پرمنگنات له محلول سره په خنثی او یا کمزوري قلوي چاپیریال کې یو ځای شي نو بیا تعامل سرته رسېږي.


نور سکلو پارافینونه هم د تودوخې او یو څه پیاوړو اوکسیدانونو تر اغېزې لاندې اوکسیدیشن کېدای شي چې په پایله کې دوه اساسه اړوند اسیدونه په داسې حال کې منځته راځي چې د دې عمل په پایله کې د سکلو الکانونو کړۍ شلېږي. هغه اسیدونه چې دلته رامنځته کېږي، کاربني اتومونه ئې د اړوند سکلو الکان سره برابروي .




۳. هلوجنشن: د کړیو د ارتوالي له مخې سکلو پارافینونه دهلوجنونو سره تعامل کوي او د تعاملاتو لوري ئې ډول ډول دي. درې غړي لرونکي کړۍ د هلوجونو تر اغېزې لاندې وازېږي.



د کتلسټ تر اغيزې لاندې يا د روښناني په مرسته برومين هم د سکلو پروپان کړۍ وازوي او په پايله کې ۱،۱ ، ۲،۱ ، ۳،۱ - دای بروم پروپانونه لاسته راځي.




پنځه او شپږ غړي لرونکي سکلو الکانونه په عادي تعويضي تعاملاتو کې ګډون کوي دا هم باید په یاد ولرو چې سکلو بوتانونه دواړه ډوله پورتنی تعاملات سرته رسولای شي.



ګلوتاريک اسید




برومين د کلورين په شان تعاملات سرته رسوي.
۴. هايډرو هلوچني تعاملات: سکلو پروپان او د هغه الکایلي مشتقات له هايډروجن آیو ډايد سره تعامل کوي او په پايله کې کړۍ له منځه ځي او الکایل ايودايد جوړېږي.




که سکلو بوتان په پورتنی تعامل کې ګډون وکړي د تودوخې په شتوالي کې بيا هم د زیاتو ستونزو سره مخامخ کېږي. سکلوپنتان او له هغه لوړ سکلو الکانونه پدې تعامل کې ګډون نه کوي.

۵. نایتریشن: هغه سکلو الکانونه چې پنځه یا شپږ غړي لرونکي کړی لري د پارافینونو په شان د نایتریشن عملي لاندې راځي. نایتروسکلو هکزان د صنایعو له مخې ډېر زیات اهمیت لري دا ځکه چې کپرو لکتم له هغه څخه په لاس راځي چې ور څخه د کپرون (نیلون) مصنوعي سپڼسي جوړېږي.

د یادولو وړ ده چې په الی سکلیک ترکیبونو کې دوه ګوني اړیکې هم د زیات پام وړ دي. سکلوپروپایډي ین جوړېدای نشي او وجود نلري. سکلوپوتایډي ین یو ډېر غیر ثابت ترکیب دی چې د هغه یوازې $C_4H_4Fe(CO)_3$ کومپلکس جوړېږي، خو سکلوپنتایډي ین بیا ثابت ترکیب دی




په شپږ غړو لرونکو ترکیبونو (سکلو الکانونو) کې دوه ځله دوه ګوني اړیکې رامنځته کېدای شي چې څنګ پر څنګ او یا یو تر یو منځ کاربني اتومونو پورې تړلي وي، خو که دا اړیکې دریو ته ورسېږي نو بیا اروماتیک ترکیبونه جوړېږي.



(بنزین) ۱،۳،۵- سکلو هکزاتری ین ۱،۴- سکلو هکزادی ین ۱،۳- سکلو هکزادی ین

په اوه غړو لرونکي سکلو الکانونو کې دوه ځله دوه ګوني اړیکې شته والی درلودلای شي، چې دا اړیکې هم په یوه کاربني اتوم پورې نښتي او هم د شپږ غړو لرونکو الکانونو په شان جوړېدای شي.




۱،۳،۵- سکلو هپتادی ین


۱،۳،۶- سکلو هپتادی ین

۱،۳،۵- سکلو هپتادی ین

پدې هايډروکاربنونو کې په همدې ډول کېدای شي درې گوني اړيکه شته والی ولري خو اړوند هايډروکاربنونه به په خپله کړۍ کې اته او يا له هغه څخه زيات کاربنې اتومونه لري، پدې مانا چې که له هغه څخه کړۍ وره وي نو بيا هغه غير ثابتې او شته والی ئې ناممکن گرزي، خو دا هم په اثبات رسېدلی ده چې هغه هايډروکاربنونه چې په خپلوکړيو کې شپږ يا اووه او يا اته کاربنې اتومونه ولري او په همدې ډول درې گوني اړيکه پکښې شته والی ولري نو کله چې دا ډول ترکيبونه جوړېږي، سمدلاسه په ډول ډول تعاملاتو کې ډېر ژر گډون کوي. که په سکلو الکانونو کې څو دوه گوني اړيکې شته والی ولري، د کيمياوي تعاملاتو په اړوند هغوی يو له بل سره توپير نلري، خو که دا دوه گوني اړيکې په اړخ پورې نښتې ځنځير کې وي نو د دې برخې فعاليت يو څه زيات کنټرول کېږي.



۴- [۱،۲- ډای بروم ايتايل] ۱- سکلو هکزن




۴- [۱،۲- ډای بروم ايتايل] ۲،۱- ډای بروم سکلو هکزن

د الې سکلیک هايډروکاربنونو مشتقات لکه هلوچني مشتقات، الکولونه، الډيهايډونه، کيتونونه، اسيدونه، امينونه او داسې نور، اليفاتيک هايډروکاربنې مشتقاتو ته ورته خاصيتونه لري.

ځانگړي استازي او پکارول ئې


سکلو پروپان د دې لړۍ خورا ساده ترکيب دی چې گاز ډوله او د اېشېدو تودوخه ئې 34°C ده. په صنعت کې هغه د جست پودر په مرسته له ايتانول او ۳،۱- ډای کلورو پروپان څخه په لاس راوړي، چې هغه هم بيا په خپل وار د پروپان له کلورينېشن څخه په 400°C سره جوړېږي په همدې ډول سکلو

بوتادی ین هم سنتېز شو خو یوازې په -35°C سره یو با ثباته ترکیب دی، که تودوخه لدې څخه لوړه شي هغه دایمر ایزیشن کېږي.



سکلو هکزان یو بل د دې لړۍ یو مهم ترکیب دی چې مایع او د اېشېدو تودوخه 81°C ده او د بنزین له هایدروجنیشن څخه لاسته ته راځي. سکلو هکزان د یوه حل کوونکي په توګه پکارول کېږي او له هغه څخه ادیپنیک اسید لاس ته راځي. هکزاکلورسکلو هکزان (هکزا کلوران)، چې د بنزول د عادي کلورینیشن څخه د روښناتې تر اغیزې لاندې د ترکیبي تعامل پر بنسټ لاسته راځي. یو حشره وړونکی ترکیب ګڼل کېږي.

دکریوالو نامشروع هایدروکاربنونو له ډلې څخه سکلو پنتادي ین چې د اېشېدو تودوخه یې د سانتي ګراد 41° ده د پام وړ ترکیب بلل کېږي. دا ترکیب له بنزیني ترکیب سره یو ځای پیدا کېږي چې د اړوند دای میر له لارې په لاس راوړل کېږي. که تودوخه لوړه شي نو دغه دای میر بېرته په سکلو پنتادي ین سره بدلېږي.




سکلوپنتادی ین

دای میر


سکلو پنتادي ین یو فعال کیمیاوي ترکیب دی، هغه له هلوځونو او هایدرو هلوځونو سره د دوه ګونو اړیکو پر بنسټ او همدارنګه په دي یني سنیز کې ګډون کوي او ترکیبي اړوند تعاملات سرته رسوي. سکلو پنتادین ین همدارنګه په قلوي چاپیریال کې (د سودیم ایتالیټ الکولي چاپیریال) کندنسیني

تعامل سر ته رسوي. دا تعاملات په عادي ډول د الفاتیګ الیدهایدونو او کیتونونو سره سرته رسېږي او په پایله کې فولوینونه لاسته راځي. فولوینونه د رنګونو په جوړولو کې خورا مهم رول لري د ساري په توګه:




دای میتایل فولوین

د دې ډلې يو بل تركيب سكلو هکزن دی چې د اېشېدو تودوخه ئې $82-83^{\circ}\text{C}$ او هغه د سكلو هکزانول له دې هايډرېټېشن څخه په لاس راځي، که هغه اوکسيډايز شي نو اديپينېک اسيد لاسته راځي. په دې وروستيو کلونو کې کيميا پوهانو زيار ايستلی تر څو په سنتېټيکي ډول د دې لړۍ پولي سکليک ترکيبونه جوړ کړي. د ساري په توگه اد منتان ($\text{C}_{10}\text{H}_{16}$) چې د ويلېکېدو تودوخه ئې 268°C ده او دلومړۍ ځل لپاره له نفتو څخه لاسته راغلی، د هغه ټولې څلورگونې کړۍ د هغې په ماليکول کې د هر ډول فشار څخه خلاصی او يوه گونۍ دی.




د شپږ غړي لرونکي ترکيبونو څخه په دغه هايد. کاربنونو کې د زيات پام وړ تركيب سكلو هکزانول نومی الکول دی چې د اېشېدو تودوخه ئې د سانتي گراد ۱۶۱ درجې ده، په تخنيک کې د فينول له کتلستې هايډروجنېشن څخه لاسته راځي.



سكلو هکزايل اسيتات ($\text{C}_6\text{H}_{11}\text{OCOCH}_3$) چې خاصيتونه ئې ايزو امایل اسيتات ته ورته دي په ډېرو ځايو کې د هغه په ځای پکارېدلای شي. د سكلو هکزانول له دې هايډرېټېشن څخه سكلو هکزان لاسته راځي، خو که دا اوکسيډېشن د

کرومیک مخلوط په مرسته او یا د شورې اسید په مرسته سرته ورسېږي د تعامل د شرایطو په پام کې لرلو سره سکلو هکزانون (د اېشېدو تودوخه نې 156,5°C) او یا ادیپینیک اسید چې د پولي امیدي سپنسیو لکه کپرون او نیلون د لاسته راوړلو په صنایعوکې د لومړنیو موادو په توګه پکارېږي لاسته راځي.



دوهم څپرکی

اروماتیک ترکیبونه

د نولسمې پېړۍ په دوهمه نیمایي کې ځینې اروماتیک ترکیبونه د ځینې بوتو په پاڼو او دانو کې پېرندل شوي وو، دهغو بڼه بوی لرونکو بوتو او ونو د پاڼو، گلانو او دانو چې په بڼه توګه پېرندل شوي وو یوه برخه شمېرل کېده نو ځکه یې هم دا ترکیبونه د بڼه بوی لرونکو او یا دا چې په عام ډول ئې د بوی لرونکو ترکیبونو په نوم پېرندل خو دا نوم اوس د دوی لپاره یو ځانګړی کړی کې د ځانګړو اړیکو په درلودلو سره یو شمېر مالیګولونه جوړ کړي دي. د اروماتیک ترکیبونو کیمیا په حقیقت کې د بنزین او د هغه د مشتقاتو او همدارنګه د نفتلین، انتراسین او داسې نورو او د هغوی د اړوندو مشتقاتو کیمیا ده. د دې ترکیبونو د زیاتوالي او اهمیت له امله کیمیا پوهانو ډېره هڅه کړې ده چې اړونده ترکیبونه ئې زیات تر کتنې او څیړنې لاندې ونیسي. همدارنګه د دې لړۍ طبیعي اروماتیک والی د پام وړ او د دې ترکیبونو نظري او عملي څیړنې ئې هر ورو غرزولي دي، د دې بهیر په اړوندو ترکیبونو د p -اکترونود کاربني اتومونو د تړلي سیستم یا ګروپ چې شمېر ئې $(2 + 4_n)$ دی یو ځانګړي سیستم چې n پکښې ۳، ۲، ۱، ۰ او داسې نور قیمتونه ځانته غوره کوي، بلل کېږي. دا مقصد د کیکولي د قانون په نوم سره هم یادېږي او دا ډول سیستم د بنزول په کړۍ کې په بڼه توګه د تطبیق وړ دی چې هلته بیا د پورتنۍ فورمول ($n=1$) دی.

نو ویلای شو چې دا ګروپ یا سیستم چې د یوې ډلې اتومونو څخه جوړ شوی، اروماتیکي ترکیبونو ته ټاکلي فزیکي او کیمیاوي خاصیتونه ور په برخه کوي، چې ورته اروماتیکي کرکتر هم ویل کېږي. د اروماتیکي کرکتر له مخې دا ترکیبونه د زبات ثبات په لرلو، د اکسیدېشنې عمل په وړاندې با ثباتي، د دوه ګوني اړیکې پر بنسټ د ترکیبي تعاملات ستونزې، په آساني سره د کړۍ د هایدروجنې اتومونو بدلون یا په بل ډول د الکتروفيلي تعویضي تعاملاتو (لکه نایترېشن، سلفیورېشن، هلوجنېشن، اسیلېشن، الکیلېشن او داسې نور) په آساني سره سرته رسول ټول اروماتیکي کرکترونه بلل کېږي. پدې ترکیبونو کې ځینې تعویضي ګان هم د ځانګړو خاصیتونو لرونکي دي، لکه د اروماتیک هایدروکسیل ګروپ اسیدي خاصیت، دامینو ګروپونو ډېر کمزوری قلوي خاصیت، د ازوتېشنې او دې ازوتېشنې تعاملاتو په غبرګون کې مقاومت او همدارنګه د هغوی دکړیو په هستو کې دهلوجن ځای نیول ټول هغه کرکترونه دي چې اروماتیکي بلل کېږي پورتنۍ یاد شوي ټول شیان اروماتیکي ځانګړي خاصیتونه دي چې د دې لړۍ ترکیبونه ئې لرونکي دي. په همدې ډول د یادولو

ور خبره دا ده چي د π - الکترونونو انرژي پدې سیستم کي د الیفاتیکی اړوندو خنځیرونو په پرتله (دوه گوني اړیکه کي) ډېر کم دي. که په یوه کړۍ کي د دي ډول بدلون په پایله کي انرژي بدلون و نه مومي هغه سیستم ته په هېڅ ډول اروماتیک سیستم نه ویل کېږي. همدارنگه که د π - الکترونونو انرژي د کړۍ د جوړېدو په مهال زیات شي نو دا ډول کړۍ د انتي اروماتیک کړۍ په نوم سره یادېږي. د ساري په توگه که له ۳،۱- بوتادي یڼ څخه سکلو بوتادي یڼ جوړ شي نو د π - الکترونونو انرژي زیاتېږي. نو دلته بیا د سکلو بوتادي یڼ انتي اروماتیک خاصیت له ورايه څرگند دی، خو په زړه پوري بل مثال دا دی چي که د ۷،۵،۳،۱ - اوکتاتراین ترکیب په سکلو اوکتاتراین بدلون ومومي نو دلته د π - الکترونونو د انرژي بدلون نه لیدل کېږي او په څرگنده توگه ویلای شو چي دا ترکیب اروماتیکي ترکیب ندی.

د پورتنیو مطالبو سره یو ځای دا هم باید په یاد ولرو چي نور د پام وړ معیارونه هم شته چي اروماتیک ترکیبونه په اروماتیک کرکتر سره تثبیتوي. په یوه سطحه کي د کړیو جوړښت پدې مانا چي کړۍ پدې ترکیبونو کي په یوه سطحه کي ځای لري او دا معیار د سپکروسکوپي په مرسته په ښه توگه په اثبات رسېدای شي چي د دي ترکیبونو په کیمیاوي خاصیتونو پوري اړه لري.


هېر مو نشي چي په بنزولي کړۍ برسېره ځیني نور داسي ترکیبونه هم شته چي بنزولي کړۍ نلري خو د اروماتیک خاصیت لرونکي او په الي سکلیک ترکیبونو پوري اړوند دي.

همدارنگه یو لړ زیات هتروسکلیک ترکیبونه هم شته چي هغوی هم د اروماتیک خاصیتونو لرونکي دي.

یوه بنزیني کړۍ لرونکي اروماتیک هایډروکاربنونه:

بنزین: بنزین (C_6H_6) د اروماتیک هایډروکاربنونو خورا ساده غړی چي په ۱۸۲۵ کي فارادي هغه د روښنایي په گاز کي کشف کړ او بیا په ۱۸۴۵ کال کي هافمن د ډبرو سکارو له قیر څخه هغه جلا کړای شوی. بنزین چي یو ساده جوړښت لري د کیمیا پوهانو د ډبري پاملرنې وړ گرزېدلی دی. په ۱۸۶۰ کلونو کي زیات زیار ایستل شوی تر څو د بنزین لپاره مناسب فورمول پیدا کړي، چي په ۱۸۶۵ کال کي د کیکولي لخوا وړاندې شوی فورمول ډېر روغ او په زړه پوري فورمول وشمېرل شو.


دا فورمول چي ۵،۳،۱- سکلوهکزاترای یڼ دی یو شپږ غړي لرونکي سکلیک هایډروکاربن، او درې دوه گوني جوړه اړیکي لري. بنزین چي فورمول ئي دا ډول دی:






له هغه څخه په بڼه توگه څرگندېږي چې ټول سره سپر هایدروجنی اتومونه په دغه کړۍ کې بیخي سره یو شان او ځینې نور ځانگړي او پدې جوړښت پورې اړوند خاصیتونه لري.

سره لدې هم کېکولې دا څرگنده نشوای کړای چې بنزین ولې د یوه عادي غیر مشبوع هایدروکاربن په څېر کیمیاوي خاصیتونه نلري. د ساري په توگه بنزین د برومین اوبلن محلول نه بیرنگه کوي او په همدې ډول د پوتاشیم پرمنگنات قلوي محلول رنګ هم له منځه نه وړي، په داسې حال کې چې برومین د بنزین په کړۍ کې د هایدروجنی اتومونو ځای نیولي شي چې دا تعامل مشبوع هایدروکاربنونو ته ورته تعامل دی او په پایله کې ئې بروم بنزین (C_6H_5Br) لاسته راځي.

په همدې ډول د شورې له اسید سره بنزین دا ډول تعامل سرته رسولای شي چې بیا هم د نیټرو گروپ د بنزو په کړۍ کې د هایدروجن ځای نیسي او نیټرو بنزین ($C_6H_5NO_2$) جوړېږي. سره له دې هم په ځانگړو شرایطو کې بنزین جمعي تعاملات سرته رسولای شي. د کتلستي هایدروجنیشن عمل لاندې له بنزین څخه سکلو هکزان لاسته راځي.




که د روبننایي تر اغېزې لاندې بنزین کلورینیشن شي نو بیا هکزاکلورو سکلو هکزان ($C_6H_6Cl_6$) جوړېږي. بنزین له اوزون سره غیر ثابت تړای اوزوناید جوړوي. له دې مطلبونو څخه داڅرگندېږي چې بنزین د یوه غیر مشبوع ترکیب په توگه هم څرگندېدای شي، خو دا هم باید وویل شي چې دا تعاملات تر عادي شرایطو لاندې په ډېره کمزورۍ سره سرته رسېږي.




دا چې د کاربن اتومونه په بنزین کې یو منظم هکزاگون جوړوي او ټولې اړیکې ئې لکه چې مخکې وویل شول سره یو شان پیاوړې دي او جوړښت ئې د SP^2 هایبریدیزیشن پر بنسټ ولاړ دی دلته درې عادي اړیکې 6 اړیکې (دوه ئې $C-H$ اړیکې او یوه ئې $C-C$ اړیکه) دي چې اړوند کونج ئې د دوی تر منځ

120° دی چې دلته درې ولانسونه پکښې پکار اچول شوي دي، خو څلورم الکترون څنگه چې څرگندېږي د هر کاربنی اتوم له خوا په کړۍ کې په دوه اړخیزه توګه په عمودي ډول ځای په ځای شوی دي او هر $1-P$ الکترون د هر کاربنی اتوم له ګاونډي کاربنی اتوم سره خپل منځني عمل د اړیکې په جوړولو کې سرته رسوي.




لکه په پورتنۍ شکل کې چې معلوميږي ټول P الکترونونه د کړۍ په شاوخوا په یو شان په ګرزېدو راګرزېدو دي او له همدې امله ټول شپږ واړه π الکترونونه لکه په یوه دوه ګوني عادي اړیکه کې د یوې جوړې په توګه په ثابت ډول نډې ځای پر ځای شوي او ځکه هم یو عمومي π سیستم جوړوي چې په دوراني ډول د خپل جوړښت لرونکی دی.

د الکترونونو تکاثف د بنزین په کړۍ کې د π -وړانګو په مرسته تثبیت شوی چې په ښه توګه څرګنده شوې چې دا تکاثف د کړۍ په هره برخه کې یو ډول پدې ډول ویل کېږي چې د بنزین په کړۍ کې په رښتیا سره د کاربنی اتومونو تر منځ یوه ګوني او دوه ګوني اړیکې په ثابت ډول شته والی نلري او ټولې اړیکې پدې کړۍ کې سره یو شان دي. په پورتنیو شکلونو کې تیاره سیوری د π الکترونونو ښودونکې او روښانه برخه د SP^2 هایبریدشو الکترونو حالت ښیي چې 6- اړیکې د کاربن – هایډروجن تر منځ تثبیتوي او دا ټول خصوصیتونه او ځانګړتیاوې اروماتیک سیستم جوړوي. د بنزولي کړۍ په جوړېدو کې ټو سره یو ځای 3 جوړې π الکترونونه چې یو ځانګړی الکتروني نظام دی او شپږ π الکترونونه پکښې برخه لري د اروماتیک سکسټ په نوم سره هم یادېږي. دپورتنیو مطلبونو په پام کې لرلو سره د بنزین دوه ډوله میزومیریک او یا دوه ډوله بدلون چې د هغه په کړیو کې لیدل کېږي په پوره ډول سره یو شان دي.




ایزومیری او نوم اېښودنه

دا چې په بنزولي کړۍ کې ټول کاربنی اتومونه سره یو شان ځواک او پیاوړتیا لري نو ځکه یو تعویضي ترکیب ئې هیڅ ایزومیر نلري. که په کړۍ کې دوهم تعویض هم ځای ونیسي نو بیا څرگندېږي چې دوه تعویضي ترکیبونه یې درې ډوله (اورتو - میتا او پارا) دي.




پدې مانا چې دوه تعویضه ایزومیرونه یوازې درې دي. په همدې ډول په بنزیني کړۍ کې درې تعویضه ایزومیرونه او څلور تعویضه ایزومیرونه هم درې، درې خو بیا پنځه او شپږ تعویضه ایزومیرونه یوازې یو، یو دي.



که د بنزین په کړۍ پورې الکایلي رادیکالونه نښتي وي نو دا ډول ترکیبونه د بنزیني مشتقاتو په نوم سره یادېږي. د بنزین دا ډول مشتقات د بنزیني هومولوگونو په نوم سره هم یادېږي. د دې لړۍ عمومي فورمول څنگه چې څرگنده ده (C_nH_{2n-6}) دی. د الکنیل او الکاینیل غیر مشبوع رادیکالونه هم د کړۍ په څنګ پورې تړلو تعویضي ځنځیرونو څخه شمېرل کېدای شي. د دا ډول بنزینوید ترکیبونو مالیکولونه له دوو برخو څخه جوړ شوي دي، لومړۍ برخه ئې بنزیني کړۍ او د هغوی په کړیو پورې تړلي ځنځیرونه دي. د دې ترکیبونو ایزومیرونه د نوموړو ځنځیرونو په جوړښت او څرنگوالي او همدارنګه د هغوی په ځای او موقعیت پورې اړه لري.

د پورتنیو مطالبو په پام کې لرلو سره د دوی په نوم اېښودنه کې زیاته د پام وړ موضوع داده چې لومړۍ په کړۍ پورې د تړلي رادیکال نوم اخیستل کېږي او بیا پر هغه د بنزین نوم ورزیاتېږي. د دوی پخواني رواجي نومونه هم د یادونې وړ او په لاندې ډولۍ ښودل کېږي.




کولای شو دا ډول فرمولونه په ټولنیز ډول هم ولیکو د ساری په توګه ۲،۱- دای میتایل بنزین چې په دې ډول $[1,2-C_6H_5(CH_3)_2]$ هم لیکل کېږي.

دا هم باید ووايو چې هغه بنزیني مشتقات چې د څنګ ځنځیر ئې نامشبوع وي، د دغه ځنځیر د نامشبوعیت په پام کې لرلو سره د هغوی نومونه اېښودل کېږي.

دا هم باید په یاد ولرو چې اروماتیک هایدروکاربنونو ته ارینونه (arenes) هم ویل کېږي، چې مانا ئې اروماتیک رادیکالونه یا اریلونه (aryls) ده. د ساري په توګه (C_6H_5-) (فینیل) (C_6H_4-) (فینیلین) چې د اورتو، میتا او پارا ډولونو


لرونکي دي. $(C_6H_5 - \overset{\overset{H}{|}}{C})$ د دې لړۍ خورا غوره مثالونه دي. د فینايل (phenyl) راډیکال د phenyl څخه چې د بنزین زور نوم دی اخیستل شوی دی.



لاسته راوړل:

څنگه چې مخکې مو هم وویل اروماتیک هایډروکاربنونه د ډبرو سکارو او نفتو څخه لاسته راوړي، خو د دې تر څنگه دا هم ډېره د اهمیت وړ خبره ده چې دا هایډروکاربنونه د پارافیني هایډروکاربنونو څخه هم لاسته راوړي. د دې ترکیبونو د لاسته راوړلو د اروماتیک او نا اروماتیک ترکیبونو څخه په کیمیاوي ډول په لاندې ډول دي.


ارینونه د نه اروماتیک ترکیبونو څخه په لاندې ډول لاسته راځي:
۱. د سکلو هکزان او د هغه د اړوندو مشتقاتو د کتلستي دي هایډروجنیشن څخه دا ترکیبونه لاسته راځي. په دې لاندني تعامل کې تور پلاډیم او 300°C تودوخه پکارول شوي دي.



په پورتنی تعامل کې که پلاتین له کورندوم یا المینا (المونیم اوکساید) سره وکارول شي نو بیا په کار ده چې تودوخه 450°C وي او دا صنعتي استحصال دی چې بنزین د هغه پر بنسټ لاسته راځي او همدارنګه هغه د بنزین د هایډروجنیشن سر چپه تعامل دی.

۲. د الکانونو له دي هایډروسکلایزیشن یا پدې مانا چې که د الکانونو له هغه کاربنی اتومونو څخه چې بیا کړۍ جوړه شي، هایډروجنی اتومونه لیرې کړو او د پلاتین او ډبرو سکارو په مرسته چې د چاپیریال تودوخه ئې هم د سانتي ګراد

۳۰۰ درجې وي نو بيا دا تعامل امکان لري چې په ښه توګه سرته ورسېږي، کېدای شي دلته د کروم، مولېډينم او وناديم اوکسايډونه هم وکارول شي. دلته به ښه لاره دا وي چې د کروم اوکسايډ د المونيم اوکسايډ سره يو ځای په 500°C تودوخه کې وکارول شي.




د پورتنۍ تعامل پر بنسټ کېدای شي، ايتايل بنزين اوکسايلين هم له اوکتان څخه لاسته راشي. دا ډول پورته ياد شوي تعاملات د پترولو د اروماتيزېشن په نوم سره هم يادېږي.

دا تعامل په صنايعو او عملي کيميا کې ځکه د زيات اهميت وړ ګڼل کېږي چې د هغه په مرسته د پترولو له الکاني او سکلو الکاني هايډروکاربنونو څخه اروماتيک هايډروکاربنونه لاسته راځي.


۳. د استلين او د هغه د هومولوګ بهير هايډروکاربنونو د پوليمرايزېشن څخه هم اړوند اروماتيک هايډروکاربنونه لاسته راځي. (دا مو مخکې ويلې دي.)

۴. د ګوګرو اسيد تر اغيزې لاندې له اسيتون (د اسيتون کنډنسيشن) څخه هم دا ترکيبونه لاسته راځي. دا د لاسته راوړلو ميتود هم د (۳) ميتود په څېر يوازې لابراتواري ميتود ګڼل کېږي.




ارينونه په همدې توګه په لاندې ډول له اروماتيک ترکيبونو څخه لاسته راځي.

۱. د الکایل هلايدونه په مرسته له اروماتیک هايډروکاربنونو څخه هم د دې بهير ترکیبونه لاسته راځي، کېدای شي چې د الکایل هلايدونو په ځای اوليفينونه هم وکارول شي.




ايتايل بنزين

۲. د اروماتیک کيتونونو له ارجاع څخه هم دا ترکیبونه لاسته راځي.





پروپايل بنزين

۳. د ورتس سنتز (۱۸۶۴) پر بنسټ د ارايل هلايد څخه پدې ډول چې د ارايل هلايد اولکایل هلايد مخلوط يا گډوله د فلزي سوډيم سره يو ځای کوي او په پايله کې اړوند ترکیبونه لاسته راځي.




ايتايل بنزين

کېدای شي چې دا تعامل په دوو پړاوونو کې په لاندې ډول سرته ورسېږي.




۴. د اروماتیک اسيدونو له قلبي مالگو څخه، پدې ډول چې هغوی له قلبي او يا سوډاليم سره گډ او بيا ئې د تودوخې تر اغېزې لاندې ويلي کړي.



سوډيم بنزوآت

۵. د نامشروع اروماتیک اسيدونو له دې کاربوکسيلشن څخه هم دا ترکیبونه لاسته مراتلای شي.




بنزین او د هغه نږدې مشتقات بیرنگه مایعات دي چې ځانگړي بویونه لري، خو د هغوی لوړ استازي بیا جامد ترکیبونه دي چې د دې ترکیبونو د ویلېکېدو او اېشېدو تودوخې د هغوی په اړوند داړخ ځنځیرونو په څرنگوالي او ځای پورې اړه لري. هغه ایزومیرونه چې د اړخ ځنځیرونه ئې ځانگړي لرونکي وي د خپلو اړوندو نارمل حالتونو په پرتله ئې پورتنۍ تودوخې ټیټې دي، پارا ایزومیرونه د ویلېکېدو ډېرې لوړې تودوخې لري. د بنزین د اېشېدو تودوخه $80,1^{\circ}\text{C}$ په داسې حال کې چې د هکزان د اېشېدو تودوخه $68,8^{\circ}\text{C}$ ده. هغه ایزومیرونه چې څو رادیکال لرونکي دي د یو رادیکال لرونکو په پرتله د اېشېدو لوړې تودوخې لري. که رادیکالونه سره نږدې شي د هغوی د اېشېدو تودوخې لانوری هم لوړېږي.

نوم	د وليلېکېدو تودوخه په C^o	د اېشېدو تودوخه په C^o	کثافت په d_4^{20}
Benzene	+5.5	80.1	0.879
Toluene	-95	110.6	0.866
Ethylbenzene	-94	136.2	0.866
Xylene (dimethylbenzene)			
o-	-25	144.4	0.896
m-	-47	139.1	0.881
p-	+13	138.4	0.854
Propylbenzene	-99	159.2	0.861
Cumene (isopropylbenzene)	-96	152.4	0.862
Styrene (vinylbenzene)	-31	145.0	0.906
Phenylacetylene	-45	142.0	0.930


د بنزين او د هغه هومولوگ بهير کيمياوي خاصيتونه:

بنزين يو مشبوع طبيعت لري، په داسې حال کې چې د هغه (C_6H_6) ترکيب په روښانه توگه يو غير مشبوع ترکيب دی (د هکزان په پرتله د شپږ اتومه هايډروجنونو کم درلودونکی دی)، دا ځکه چې هغه ترکيبي تعاملاتو ته ميلان لري او د اکسيديشن تعاملاتو په سرته رسولو کې مقاومت کوي. دا هم څرگند ده چې جمعي تعاملات په ستونزمنه توگه سرته رسوي او دهغوی د سرته رسولو لپاره ځانگړي شرطونه پکار دي. الکتروفيلي ترکيبي تعاملات د دې بهير خورا مهم او په زړه پوري تعاملات گڼل کېږي، په همدې ډول اروماتيک ترکيبونه په نوکليوفيلي او راډيکالي تعاملاتو کې هم گډون کوي.


د ترکيبي تعاملاتو څېره په لاندې ډول د XY په ماليکول کې چې X^+ يوه الکتروفيلي برخه او Y^- يو انيون دی. او د هغوی يو له بله څخه بېلېدنه دا ډول




څرگندېږي چې دلته الکتروفيلي برخه د اروماتيکي هستې په π - الکترونونو اغيزه کوي، چې په دې ډول په هسته کې په تيت شوو الکترونونو دا اغيزه داسې سرته رسېږي چې په پايله کې π - کومپلکس په دې ډول جوړېږي.




دلته د کړۍ د شپږ π - الکترونو څخه چې په يوه کاربني اتوم پورې اړوند دی يوه نوې کوولانسي σ - اړيکه جوړېږي چې پکښې خامخا دوه الکترونونه برخه اخلي نور څلور الکترونونه د کړۍ په پنځو کاربني اتومونو پورې اړوند پاته کېږي او په پايله کې دلته σ - کومپلکس داسې جوړېږي.



رامنځته شوی کاربونیم آیون د شپږو یاد شوو کاربنی اتومونو له ډلې څخه د SP^2 هایپریدیزیشن څخه SP^3 هایپریدیزیشن ته اوړي چې د یوه تترائیدرال حالت لرونکی دی. اروماتیک کړۍ دلته د ځان ثبات بېرته تر لاسه کوي، نو ځکه پروتون جلا او اروماتیک بڼه غوره کوي.




په پایله کې بېل شوی پروتون له y^- انیون سره اړوند ترکیب جوړوي.



بنزین په ښه توګه ترکیبي تعاملات سرته رسوي دا ځکه چې دلته ډېر انرژي ته اړتیا نه لیدل کېږي. هغه کیمیاوي مواد چې د زیات انرژي لرونکي دي، لکه د آزاد کلورین اتومونه، د لمر د وړانګو تر اغېزې لاندې او همدارنګه هایډروجنی اتومونه د کتلست تر اغېزې لاندې له بنزین سره په ښه توګه تعاملات سرته رسولای شي، په دې ډول تعامل کې د ډېر انرژي لرونکي اوزن هم ګډون کولای شي.

پورتنی ډول تعاملات چې اروماتیک بهیر ئې سرته رسوي په صنایعو او کیمیا پوهنه کې ډېر زیات اهمیت لري، خو ډېر نامتو ئې په لاندې ډول څرګندوو.


۱. نایتریشن: نایتریشن تعامل د نایټرو ګروپ (NO_2) پر بنسټ سر ته رسېږي. که د ګاټه نایټریک اسید ګډوله له سلفوریک اسید سره بیا په پام کې ولرو نو د نایټریشن عمل په پایله کې نایټرونیم آیون (NO_2^+) پدې ګډوله کې دا ډول جوړېږي.




هایډروکسونیم آیون نایټرونیم آیون

منځته راغلي نایټرونیم آیون بیا په اروماتیک هایډروکاربن یرغل کوي او د π -الکترونونو دریځ تر اغېزې لاندې نیسي، دلته لومړی π -کومپلکس او بیا وروسته 6-کومپلکس (کاربونیم آیون) چې دنیټرو ګروپ او کاربنی اتوم تر منځ د کووالنسي اړیکې د جوړېدو لامل ګرزي منځته راځي.

په وروستي پړاو کې د HSO_4^- له پروتون سره یو ځای او اړوند ترکیب جوړوي چې د دې تعامل بله څرگنده برخه نیټرو ترکیب دی.




پورتنی تعامل په شیماتیک ډول داسې لیکل کېږي.




په پورتنی تعامل کې د اوبو شته والی د تعامل د درېدو لامل ګرزي، دا ځکه چې بېرته نایټرونیم آیون جوړېږي. لدې امله پدې مخلوط کې د ګوګرو اسېډ یو څه زیات اچول کېږي تر څو اوبه د هغه په مرسته جذب او وزغملې شي.

۲. هلوځنېشن: د کټلست په شتوالي کې هلوځنونه د بنزین په کړۍ کې ځای نیولی شي. د المونیم او اوسپنې هلایدونه دلته د زیات پام وړ ګڼل کېږي چې هغوی دا دی: $AlCl_3$, $AlBr_3$, $FeCl_3$, $FeBr_3$ او داسې نور.

دا هم څرګنده ده چې کټلستونه د الکتروفیلیک زراتو فعالیت زیاتوي او د هلوځني اتومونو تر منځ پولارایزېشنې عمل پیاوړی کوي. د ساري په توګه په انهایدروز المونیم کلوراید کې د المونیم اتوم چې په خپل وروستي مدار کې یوازې ۶ الکترونونه لري چې د کلوریني اتوم د آزادې الکتروني جوړې په مرسته خپل اوکتیت پوره کوي. دلته د کلورین د مالیکول دوهم اتوم مثبت چارج غوره کوي او پدې ډول ئې الکتروفيلي خاصیت لا نور هم پیاوړی کېږي.




انهایدروز فیبریک کلوراید هم پدې عمل کوي.




کلوربنزین

د هلوجنونو فعالیت په پورتنی ډول تعاملاتو کې د دې بهیر پر بنسټ ولاړ دی:




دا چې فلورین ډېر زیات کیمیاوي فعالیت څرګندوي نو ځکه ئې مشتقات هم په عام ډول په غیر مستقیم ډول لاسته راوړل کېږي، په داسې حال کې چې نیغ په نیغه آیودینیشن هم ښه پایله نلري او اړوند ترکیبونه په ښه توګه لاسته نه راځي، نو ځکه هم د آیودین د خورا کم فعالیت له امله د هغه اړوند مشتقات ددې ازوترکیبونو په مرسته لاسته راتلای شي. کلورین او برومین له اروماتیک ترکیبونو سره د رادیکال تعامل پر بنسټ د تودوخې یا روښنایي تر اغېزې لاندې د هایډروجنی اتومونو ځایونه په اړخ پورې نښتي ځنځیر کې او یا له کړۍ سره د جمعي تعامل په پایله کې اړوند ترکیبونه جوړوي.

۳. سلفونېشن: دلته د سلفو ګروپ د بنزین په کړۍ کې د هایډروجن اتوم ځای نیسي. خوبیا هم د پام وړ خبره دا ده چې که د تودوخې تر اغېزې لاندې ګاټه د ګوګرو اسید او یا اولېم له اړوند اروماتیک هایډروکاربن سره ګډ شي نو بیا د لاندې تعامل پر بنسټ اروماتیک سلفونیک اسید جوړېدای شي.




بنزین سلفونیک اسید



سلفونېشن تعامل، هلوجنېشن او نایترېشن تعاملاتو ته چې رجعي دي کوم ورته والی نلري.



۴. دا چې د الکایل گروپ دلته په اروماتیک کړۍ کې ځای نیسي نو ځکه دغه تعامل ته هم د اروماتیک ترکیبونو الکایلیشن ویل کېږي. د اړوندو ترکیبونو لاسته راتلل په دې ترکیبونو کې له دوه لارو سر ته رسېږي. الف) د فریدل کرفتنس (۱۸۷۷) د تعامل پر اساس اړوند ترکیبونه د انهایدروز المونیم هایدرونو تر اغیزې لاندې د الکایل هایدرونو او بنزین له تعامل څخه لاسته راځي.




لکه چې مخکېني مو هم وویل دلته هم کتلست په الکایلیشن تعامل کې د اړوند ترکیب قطبیت زیاتوي او دا ډول بنودل کېږي.




ب) د اولیفینونه په مرسته د بنزین الکایلیشن: د اولیفینونه په مرسته د بنزین الکایلیشن د ځینې کتلستونو لکه المونیم کلوراید، بورون ترای فلوراید، فوسفوریک اسید په شتوالی کې سرته رسېږي، لدې تعامل څخه په صنعت کې د

ایتایل بنزین او ایزوپروپایل بنزین (Cumene) د لاسته راوړلو لپاره ډېره ګټه اخیستل کېږي.





ایتایل بنزین




Cumene

د پورتنۍ تعامل میخانیکیت هم پدې پورې تړلی دی چې څنګه اسیدي پروتون داوولیفین له مالیکول سره کاربونیم آیون جوړوي، چې بیا وروسته په خپل وار سره هغه له بنزین سره تعامل کوي.




۵. د اسیلېشن له لارې هم د اروماتیک بهیر هایډروکاربنونه او د هغوی مشتقات لاسته راټولای شي. په دې تعامل کې د اسیل $\text{R}-\text{C}=\text{O}$ ګروپ اروماتیک کړی ته ننوزي او د دې تعاملاتو پایله کېتونونه دي. اسيلي عاملونه دلته اسید کلورایدونه یا انهایډر اسیدونه دي چې د انهایډروزالمونیم کلوراید په شتوالي کې تعامل پای ته رسولای شي.




کیتون

د اروماتیک هایدروکاربنونو جمعي تعاملات


۱. هایدروجنیشن: د دې لړۍ یو په زړه پورې تعامل گڼل کېږي. دا تعامل د سانتی گراد په ۱۵۰ درجې د نکل په شتوالي او د سانتی گراد په ۵۰ درجو کې د پلاتین په شتوالي کې چې د کتلتونو رول لوبوي سرته رسېږي.




پورتنی تعامل ته ورته تعامل هلوچنونه (کلورین، برومین) هم سرته رسوي او پدې هکله پخوا مو وویل چې د لمر وړانگو تر اغیزې لاندې (د ماورای بنفش وړانگو تر اغیزې لاندې) هغه دا ډول سر ته رسېږي.



په همدې ډول دنورو غیر مشبوع ترکیبونو په څېر بنزین له اوزون سره تعامل کوي او ترای اوزوناید جوړوي دا ترکیب ډېر زیات چاودیدونکی ترکیب دی. که اوبه ور رسېږي نو بیا ژر تر ژره په درې مالیکوله گلای اوکسل بدلیږي.




بنزين ترای اوزوناید



اکسیدپښني تعاملات


په اروماتیک ترکیبونو کې د بنزیني کړیو زیات مقاومت چې د اکسیدیشن عمل په غبرگون کې ئې ښئي، د دې ترکیبونو د خورا مهمو خاصیتونو څخه گڼل کېږي.

هغه اکسیدیشن کوونکي ترکیبونو لکه نایتریک اسید، د کرومیک اسید مخلوط، د پوتاشیم پرمنگنات محلول او هایدروجن پراوکساید په عادي شرایطو کې پر بنزین هېڅ اغېزه نلري. بنزین د پارافیني هایدروکاربنونو په پرتله هم د اکسید کوونکو معرفونو په غبرگون کې لا زیات مقاومت لري. لدې څخه دا څرگندېږي چې اروماتیک ترکیبونه له هغو ترکیبونو سره چې دوه گوني اړیکې لري، توپیر لري. کله چې په لوړه تودوخه 400°C دوناډیم پنتااوکساید کتلست په شتوالی کې اتموسفیریک آکسیجن اغېزه وکړي نو انهایدرايد مالینیک اسید لاسته راځي چې له دې تعامل څخه په صنعت کې ډېر کار اخیستل کېږي.




که بنزینی کری د اړخ ځنځیر لرونکي وي او یا په بل عبارت په کری پوري الکایل رادیکال نښتی وي، نو د آکسیدېشن معرف تر اغېزي لاندې دا ډول ځنځیرونه اوکسیدایز کېږي.


دا چې د اړخ ځنځیر څه ډول دی، په هر ډول د قوي او ځواکمنو آکسیدېشن کوونکو تر اغېزي لاندې هغه شلېږي او په کری پوري نښتی کاربني اتوم په کاربوکسیل بدلېږي او د بنزینی کری کاربن هیڅ تغیر یا بدلون نه مومي. هغه بنزینی هومولوگونه چې د اړخ یوازي یو ځنځیر ولري د آکسیدېشن عمل په پایله کې له هغوی څخه یو اساسه اسید (بنزوئیک اسید) لاسته راځي.




هغه هومولوگ اروماتیک ترکیبونه چې د اړخونو دوه ځنځیرونه ولري نو د پورتنی تعامله پایله دای بسیک اسیدونه دي.



دا هم باید وویل شي که ایتایل بنزین یا دا ډول نور الکایل بنزینونه د هوا د آکسیجن په مرسته اوکساید شي، هایدروپراوکسایدونه لاسته راځي. پدې تعامل کې د کری پر بنسټ او د اړوند کاربني اتوم د ځای له مخې دکاربن د α - موقعیت په تعامل کې برخه اخلي.



د پام وړ خبره دا هم ده چې که په کړۍ پورې د اړخ داسې ځنځير نښتۍ وي چې دريمې راديکالي حالت ولري نو دلته د اکسیدېشنې عمل په پايله کې له هغه څخه مخکې بنزیني کړۍ اکسیدېشن کېږي. د ډېرو ځواکمنو اکسیدانونو تر اغېزې لاندې د ساري په توګه د RhO_4 مخلوط له NaOCl سره کولای شي سکلو هکزايل بنزين په سکلو هکزان کاربوکسيلیک اسيد اوکسیدېشن کړي.



په بنزين کې د الکتروفيلي تعويضي ګانو لورۍ نيول (توجیه کېدل)

ډېرې څېړنې سرته رسېدلې تر څو د بنزين په کړۍ کې د تعويضي ګانو د ځای پر ځای کېدو څرګندوالی وڅېړي، پدې لاره کې د جرمني ساینس پوه (Holliman) هلې ځلې چې په ۱۹ پېړۍ کې ئې کړې دي د یادونې وړ دي. مخکې مو هم وویل چې یو تعویضه بنزیني ترکیب ایزومیر نلري او د کړۍ په شپږګونو کاربنی اتومونو پورې په یو ډول هر چېرې چې وي نښلې. که په نوموړې کړۍ دوهم ایزومیر وریات شي، نو بیا دلته درې ډوله (اورتو، میتا، پارا) ایزومیرونه جوړېږي.

په کړۍ کې د نوي ایزومیر ننوتل او په ځانګړې توګه د نوی الکتروفيلي تعويضي ننوتل دغه کړۍ ته د هغه تعويضي په طبیعت او څرنگوالي او همدارنګه د مخکني تعویض یا لومړي تعویض چې لا پخواني په کړۍ کې ځای نیولی دی په څرنگوالي پورې اړه لري. په بل عبارت په اروماتیک کړۍ کې د تعويضي ځای په ځای کېدل په غوڅه توګه د مخکني تعویض په اغېزه پورې اړوند دي نو ځکه دا له ورايه څرګندېږي چې دوهم ننوتونکي تعويضي به په اروماتیک کړۍ کې څرنگه ځای نیسي او کوم لورۍ به نیسي.

د لوري نیوونکي څرنگوالي له مخې تعویض ګان په دوه ډلو سره ویشل کېږي. دا وېش په بنزیني کړۍ کې د الکتروفيلي تعویض ګانو په اړوند پدې ډول دي:

لومړۍ ډول لوري نیوونکي (توجیه کېدونکي) تعویضي خپل ځای په اورتو او پارا موقعیت کې ځانته غوره کوي او هغوی دا دي
 $OH-NH_2, -NHR, -NR_2$; هلوچنونه او داسې نور.

دوهم ډول لوري نیوونکي تعویض ګان چې په میتا موقعیت کې ځانته ځای غوره کوي او د میتا لوري نیوونکو په نومونو سره یادېږي، دا دي:
 $-CN, -COOH, -SO_3H, -NO_2, -CF_3$ او داسې نور.

دا هم باید وویل شي چې تعویض ګان په مطلق ډول هم ځای نیوونکي ندي، کله نا کله درې واړه (میتا، اورتو، پارا) تعویضي ټول سره یو ځای لاسته راځي او کله هم دوه ډوله له بل ډول څخه زیات او یا هم برعکس لږ وي چې په هر صورت دا هم جوتنه ده چې د حل کوونکي، د کتلست او د تعامل د چاپیریال په څرنگوالي پورې اړه لري.

که د لوري نیوونکو په اړوند یو څه نور مخ ته لاړ شو داسې هم ویلای شو چې د هغوی د ښې کتنې او څیړنې په موخه هغوی پدې ډول په دوو ډلو ویشو. لومړۍ ډله تعویضي ګان الکترون ورکوونکي یا له ځانه د الکتروني ورځې د تکاثف لري کوونکي تعویض ګان دي چې په څرګند ډول الکترونونه له ځانه لرې کوي او هغوی دا دي:


$OH, OR, RCOO, SH, SR, NH_2, NHRNHCOR, NR_2, -N \equiv N-, CH_3, CH_2R, CR_3, F, Cl, Br, I$

دوهمه ډله لورۍ نیوونکي تعویض ګان د اتومونو هغه ګروپونه دي چې کولای شي الکترونونه له بنزیني کړۍ څخه کش کړي او هغه دا تعویضي ګان دي:


$SO_3H, NO_2, CHO, COR, COOH, COOR, CN, CCl_3, \dots$

د ډېرو څېړنو په لړ کې څرګنده شوې ده چې اورتو او پارا لورۍ نیونه اصلاً له ځانه الکترون لري کوونکي عملیه ده چې بنزیني کړۍ ته الکتروني ورځ ور کش کاري، په داسې حال کې چې میتا لورۍ نیونه بیا د نوموړې کړۍ څخه د یادې شوې ورځې را ځانته کول یا راکش کول دي. که د بنزین په کړۍ کې د الکتروني ورځې تکاثف کموالی ومومي نو بیا د دې کړۍ فعالیت د الکتروفيلي تعویضي تعاملاتو په اړوند هم کمېږي.

څرګنده خبره ده چې په اورتو او پارا موقعیت کې الکتروني تکاثف د پورتنیو مطالبو په پام کې لرلو سره زیاتېږي نو ځکه هم الکتروفيلي ګروپونه په دغه ځایونو کې ژر خپل موقعیت اختیاروي.



نو که چېرې بیا یو میتا تعویضی په بنزین کړی کې وجود ولري نو د پورتنی تعامل په پوره غبرگون د اورتنو او پارا موقعیت څخه الکتروني تکاثف کمېږي نو به ځکه خامخا تعویضی په میتا موقعیت کې ځای په ځای کېږي. د ساري په توګه میتا ایزومیر له هر څه د مخه د نایتریشن په عملیه کې داسې منځته راځي.




هغه قطبي یا پولار کیمیاوي ترکیبونه چې معمولاً له اروماتیک ترکیبونو سره تعامل کوي په دوو ګروپونو ویشل کېږي چې الکتروفيلي او نوکلیوفيلي ترکیبونه دي او هغه کیمیاوي تعاملاتې لارې چارې چې پدې چوکاټ کې په اروماتیک ترکیبونو کې ډېرې زیاتې او د پام وړ دي، الکایلشن، هلوجنیشن، سولفونیشن او نایتریشن تعاملات دي چې دا ټول یاد شوي تعاملات د الکتروفيلي ترکیبونو سره سرته رسېږي، خو دا هم باید وویل شي چې د نوکلیوفيلي ترکیبونو سره تعاملات هم په زړه پورې ګڼل کېږي د ساري په توګه له NaOH او NH_2Na سره د اروماتیک ترکیبونو تعاملات او داسې نور.

لکه مخکېني مو چې وویل لومړی ډله لوري نیوونکي الکتروفيلي تعاملاتو ته آسانتیا ور په برخه کوي، دا ځکه چې نوی تعویضی په آساني سره په اورتنو او پارا موقعیت کې ځای نیسي.

دوهمه ډله لوري نیوونکي تعویض ګان الکتروفيلي تعاملات له ستونزو سره مخامخ کوي، هغوی نوي تعویضی میتا موقعیت ته توجیهه او ځکه نوکلیوفيلي آسانتیا رامنځته کوي.

پر لوستل شوو مثالونو برسېره لاندني نور مثالونه هم تر څیړنې لاندې نیسو.



په همدې توگه لکه په پورته ډول چې څرگنده شوه په دوهمه ډله لوري نیوونکو کی چې الکتروفیلی خصوصیت لري تعامل په ستونزمنه توگه سرته رسېږي یعنی لوری نیوونکی عمل په میتا موقعیت کې سرته رسېږي. که تعویضی له لومړۍ ډلې څخه وي او تعامل کوونکی ترکیب نو کلیو فیلي وي نو لوری نیوونکی میتا موقعیت ته ځي. بیا هم په کلکه باید په یاد ولرو چې په پورتنیو ډول ډول تعویضي تعاملاتو کې زیات وخت د تعامل په چاپیریال کې درې واړه په گډوله توگه رامنځته کېږي او دلته نو د تعامل ځانگړتیا او شرائط د زیات اهمیت وړ دي. ځینې اروماتیک ترکیبونو ته په لاندې ډوله کتنه کوو:

بنزین او د هغه د هومولوگونو صنعتي پکارونه: د (Pit) ډبرو سکارو او پترولیم د اروماتیک ترکیبونو خورا مهمې سرچینې گڼل کېږي. په $1000-1200^\circ\text{C}$ تودوخه سره له پیت څخه نږدې په سلو کې ۷۵ برخې د *Coke gas*، د ډبرو سکارو قیر، امونیا او داسې نور ترکیبونه تر لاسه کېږي. نوځکه ویلای شو چې د اروماتیک ترکیبونو خورا لویه سرچینه د ډبرو سکاره دي، د کوک د غاز *Coke-gas* همدارنګه د سونګ موادو په توگه هم پکارېږي په هغه کې میتان، هایډروجن، کاربن مونواوکساید، اتلین، استلین، نایتروجن، هایډروسیانیک اسید، کاربن ډای اوکساید او داسې نور برخه لري. د ډبرو سکارو- قیر ډوله ماده *Coal tar* چې یوه تور رنګه نصواری گاته تیل ډوله له اوبو څخه درنده ماده ده یو ځانګړی بوي لري، د هغه جوړښت په هغه تودوخه پورې اړه لري چې د هغه د پاکولو په مهال هغه ته ورکول کېږي.

له 500°C څخه په کمه تودوخه، پدې مانا چې په ټيټه تودوخه له هغه څخه هغه قير ډوله ماده بېلېږي چې زيات شمېر الکانونه او سکلو الکانونه لري. په 1000°C او يا له هغه څخه په لوړه تودوخه، له هغه څخه زيات شمېر اروماتیک ترکیبونه (شمير ئي له 300 څخه هم زيات دی) لاسته راځي. که لږ نور هم هغه په ځير سره تر څېړنې او کتنې لاندې ونيسو، نو ویلاى شو، چې د ډبرو سکارو له قير ډوله مادې څخه د تقطير په مهال لاندې ډول ډول ترکیبونه تر لاسه کېدای شي.

۱. سپک تیل: د تقطير په پروسه کې تر 170°C پورې لاسته راځي چې په هغه کې بنزين، تولوين، کسایلين، ستايرين، ايتايل بنزين، پيريدين او داسې نور برخه لري.

۲. منځني تیل: له $170^{\circ} - 240^{\circ}\text{C}$ پورې هغوی د تقطير عمل په پایله کې تر لاسه کېږي. پدې فرکشن کې نفتلين، فينول او کریزول ونډه لري.

۳. درانده تیل چې د تودوخې له $240^{\circ} - 270^{\circ}\text{C}$ واټن کې د نفتلين او دهغه د مشتقاتو په لرلو سره تقطير کېږي.

۴. انتراسين: دا فرکشن چې د تودوخې په $270 - 360^{\circ}\text{C}$ واټن کې تقطير کېږي د انتراسين، فينانترين او داسې نورو لرونکى دی.


۵. رېښتینی ثابت قير (Pitch): د تقطير د عمليې وروسته جامد ډوله قيري ماده ده چې دسړکونو او د ودانولو په نورو چارو کې ور څخه کار اخيستل کېږي. د سوزېدونکو او داسې نورو موادو په څېر هم ور څخه کار اخيستل کېدای شي. همدارنگه د دې فرکشن له وروستيو برخو څخه آن تر دې چې جامد کرسټلي مواد هم لاسته راځي، کار اخيستل کېږي.

هغه ترکیبونه لکه فينول چې اسيدی خاصیتونه لري د اوبلنو القلي محلولونو په مرسته له مخلوط څخه ځانگړي کېږي او د پيريدين په شان بيا قلوي ترکیبونه د اوبلنو رقيقو اسيدی محلولونو لکه سلفوريک اسيد په مرسته ځانگړي کېدای شي. که د ساري په توگه يو تن د ډبرو سکارو قير بيا تر څېړنې لاندې ونيسو او له هغه څخه ځانگړي ډول ډول ترکیبونه بېل کړو نو به له هغه څخه 16 کيلوگرامه بنزين، $2,5$ کيلوگرامه تولوين، $0,3$ کيلوگرامه کسایلين، د $40 - 60\text{kg}$ کيلوگرامه نفتلين، له 5 ، 20 کيلوگرامه انتراسين او 20 کيلوگرامه هغه ترکیبونه چې فينولي طبیعت لري لاسته راځي.

په عضوي سنتيز کې د *Coke* کيمياوي صنايعو زيات شمېر مواد د ډېر اهميت وړ گڼل کېږي. په رېښتيا چې ویلاى شو چې په کيمياوي صنعت کې دا ترکیبونه د ډېر زيات اهميت وړ ترکیبونه گڼل کېږي او په دغه برخه کې تل د هغه یادون کېږي.

دا هم بايد په ياد ولرو چې د يو لړ اروماتيك تركيبونو سمبالوونكي مواد د تيلونو د پاكولو يا چنولو په صنايعو كې پېرندل كېږي چې د زياتې پاملرنې وړ دي.

په صنعت کې د بنزين پکارول په لاندې ډول په ښه توګه تر کتنې لاندې نیول کېدای شي.



په بنزین بر سېره کسایلین، دورین (Cyrine, (Dourine او Styrene د دې لړۍ خورا مهم ترکیبونه گڼل کېږي چې په عضوي سنتیز او کیمیاوي صنایعو کې د زیات اهمیت وړ دي.

اورتوکسایلین د فتالیک انهایدرايد د لاسته راوړلو لپاره پکارېږي دا ترکیب د مصنوعي رابر او پولي ایستر د لاسته راوړلو په صنایعو کې د تعامل اصلي یا لومړنۍ عامل یا پیل کوونکي بلل کېږي. پاراکسیلین د تېرې فتالیک اسید $(C_6H_4(COOH)_2 - 4,1)$ یو مهم ترکیب دی چې د سنتیتیکي سپنسیو چې د

تیرایلین (Dacron) په سنتیز کې لوی رول لري، پکارېږي. Durene (۱،۲،۴،۵- تترامیتایل بنزین) چې د پترولیم په کتلستي استحصال کې لاسته راځي د ځینې رابرونو او هغه پولي میرونو په لاسته راوړلو کې چې حرارتي ثبات لري ور څخه کار اخیستل کېږي.

Cymene هم چې د دې لړۍ یو مهم ترکیب بلل کېږي د پارامیتایل ایزو پروپایل بنزین په نوم هم یاد او په ځینو تیلونو او تارپینونو کې پیدا کېږي چې د تیرې فتالیک اسید په لاسته راوړلو کې ور څخه زیات کار اخیستل کېږي.

وینایل بنزین یا فینایل اتلین چې د Styrene په نوم سره یادېږي، یو ښه بوی لرونکی اوبلن ترکیب دی. دا ترکیب لومړی ځل د Styraخ رابر څخه لاسته راوړل شو چې د ډبرو سکارو په قیر ډوله ماده کې پیدا او د سپکو تیلو یوه برخه گڼل کېږي. په صنعت کې هغه د ایتایل بنزین له دې هایډروجنیشن څخه هم په لاس راځي. د هغه مهمه ځانگړتیا دا ده چې داسې اروماتیک ترکیب دی چې په کړۍ پورې تړلی د اړخ ځنځیر ئې هم دوه گوني اړیکه لري. دا ترکیب پولیرایزیشن تعامل سرته رسولای شي او د تعامل په پایله کې پولي ستایرین جوړېږي.

اروماتیک هلوچني مشتقات


د کیمیاوي خاصیتونو له مخې د اروماتیک ترکیبونو هلوچني مشتقات په دوه ډوله دي.

۱. هغه هلوچني مشتقات چې هلوچني اتوم د هغه په اروماتیک کړۍ کې ځای نیولی وي.

۲. هغه هلوچني مشتقات چې په څنګ پورې تړلي ځنځیر کې د هلوچني اتوم لرونکي وي.

لکه مخکېنۍ چې مو څرګنده کړې بنزین یوازې یو ډول هلوچني مشتق جوړولای شي، خو دا په هغه وخت کې ده چې په کړۍ کې یو هلوچني اتوم ځای ولري. که په بنزین کې دوه هلوچني اتومونه ځای ولري نو بیایي ایزومرونه درې او په دې ډول د هغه دوه تعویضه مشتقات درې دي، خو دا هم څرګنده ده چې دواړه هلوچني اتومونه سره یو شانته دي. که هلوچني اتوم په هم هغه یو ډول وي نو درې تعویضه ئې څلور ډوله مشتقات او پنځه او شپږ تعویضه ئې یو یو ډول مشتقات لري.

تولویڼ بیا څلور ډوله هغه مشتقات لري چې پکې یوازې یو هلوچني اتوم برخه لري او یو ئې هغه تولویني مشتق دي چې هلوچني اتوم ئې بیا د اړخ په ځنځیر کې ځای په ځای شوی دی.




د لاسته راوړلو لارې چارې

۱. هلوچني مشتقات د هلوچنونو او اروماتیک ترکیبونو تر منځ د نیغ په نیغه تعامل په پایله کې لاسته راځي. دا تعامل په درې ګونو لارو چارو سرته رسېدای شي.




الف: که هلوچن د دوه ګوني اړیکې پر بنسټ له اروماتیکي کړۍ سره تعامل وکړي.

ب: که هلوچن د اروماتیکي کړۍ هایډروچني اتوم بدل او د هغه ځای ونیسي.


ج: که د اروماتیک کری د هایدروجن خای الکایل هایدی رادیکال ونیسی. که هایدروجنی اتوم دکوم هلوجنی اتوم په مرسته بدلېږي نو دکتلت شته والی هم هرو مرو کار دی.




څرگنده خبره ده چې په پورتنی تعامل کې د اوسپنې درې ولانسه کلوراید د کتلت په توګه پکارېږي. په همدې ډول د ځینې نورو فلزاتو کلورایدونه لکه $AlCl_3, SbCl_3, SbCl_5$ او داسې نور) هم د کتلت په توګه پکارېدای شي. دلته کتلت د هلوجن د پولاریزیشن لپاره پکارېږي چې بیا په بنزیني کری کې د الکتروفیلی تعامل لپاره لاره برابروي. د ساري په توګه د $FeCl_3$ په مرسته کلورینیشن دا ډول دی.



او پدې توګه تعامل مخ په وړاندې ځي. د اړخ د ځنځیر هلوجنیسي عمل د بلشتین د قانون له مخې د وړانګو او یا تودوخي تر اغیزې لاندې سرته رسېږي. پدې ډول تعامل کې میخانیکیت رادیکالي دي. دا موخه په ټولین کې په لاندې ډول تر کتنې لاندې نیسو:




پورتنی تعامل د سلفوریل کلوراید او بنزین تر منځ د بنزائیل پراوکساید (د کتلسټ په توګه) په شتوالي کې هم په ښه توګه سرته رسیدای شي.



دا چې هلوځونه لومړۍ ډله لوری نیونکي دي نو ځکه دوهم هلوځني اتوم د هلوځنیشن عملي په پایله کې د پارا موقعیت لوری نیسي.



که پارافلور، کلور بنزین بیا هم کلورینیشن شي نو دریم اتوم هلوځن د کلورین په غبرګون کې بیا اورتو موقعیت ته ځي، نه دا چې د فلورین په غبرګون کې ځانته د اورتو موقعیت غوره کړي، دا ځکه چې فلورین زیات مثبتیت لري،

یعنې: $F > d$




۳،۴- دای کلورفلوربنزین پارافلورسلوربنزین

۲. اروماتیک هلوځني مشتقات هغه وخت هم لاسته راټلای شي چې د بنزین کړۍ امینو ګروپ په هلوځني اتوم بدل شي، دلته لومړۍ دي ازوترکیب جوړېږي او بیا هر ډول هلوځني مشتق چې وغواړو د دې تعامل په مرسته ئې لاسته راوړای شو.





د هغه اروماتیک هلوځني مشتقاتو چې هلوځني اتوم یې د اړخ په ځنځیر کې ځای ولري لاسته راوړلو یوه بله ځانګړې لاره دا هم ده چې عمليه په اصل حقیقت کې کلورمیتایلسن او اروماتیک ترکیب له فارم الیهاید او د مالګې له

اسید سره د کتلست په شتوالي کې ($ZnCl_2$) تعامل کوي او کلورمیتایل ګروپ د اروماتیک کړۍ د هایډروجنی اټوم ځای نیسي.



د دې تعامل میخانیکیت دا ډول دی.



فزیکي خاصیتونه


د بنزین او د هغه د هومولوگونو مشتقات مایع (اوبلن) او یا کرسټلي ترکیبونه دي، د ساري په توګه پارا ډای کلوربنزین (دویلېکېډو تودوخه نې $53^\circ C$) او یو جامد کرسټلي ترکیب دی.

د دې ترکیبونو کثافتونه له یوه څخه لوړ دي، د هغوی د اېشېډو تودوخه له فلوریني مشتقاتو څخه پیل بیا تر آیوډیني مشتقاتو پورې لوړېږي. هغه هلوځني مشتقات چې هلوځني اټوم په اروماتیک کړۍ کې ولري، بوی نې هم اروماتیکي وي، په داسې حال کې چې هغه هلوځني مشتقات چې د اړخ په ځنځیرونو کې هلوځني اټوم لري (د کړۍ څخه د α په موقعیت کې)، هغوی بلوسوونکي اغېزه لري او اوبنکي بهوونکي خاصیت څرګندوي. دا ډول ترکیبونه په ټولیزه توګه (هر یو چې وي) په اوبو کې نه حلېدونکي دي خو په عضوي حل کوونکو کې حلېږي.


کیمیاوي خاصیتونه

ارایل یا اریل هلايدي مشتقات د الکیل هلايدي ترکیبونو په پرتله ډېر ثابت او په تعاملاتو کې هغه ډول ګډون نکوي، دا ترکیبونه د سودیم هایډورکساید، د سپینو زرو له مالګو، سیانایډونو، سلفایډونو او سودیمي الکولاتونو یا امونیا سره د تعامل تر هغو شرطونو لاندې چې الکیل هلايدونه تعامل کولای شي، دوی تعامل سر ته نه رسوي.


کلوریا بروم بنزین یوازي د سانتي گراد په ۳۰۰ درجو سره د قلیاتو سره تعامل کوي، له دې څخه په کمه تودوخه هم د کتلست تر اغېزې لاندې له امونیا سره تعامل کولای شي. د پودري مس او یا د مسي مالگو په شتوالي کې په (۱۸۰-۲۰۰°C) تودوخه سره هم هغه ډول تعاملات سرته رسولای شي. د تعامل د چاپیریال شرائط په اروماتیک ترکیبونو کې د زیات اهمیت وړ گڼل کېږي، کله نا کله داسې هم امکان لري چې هغه گروپ چې کړی ته ورننوزي د هلوچن ځای نه نیسي او خپل اړوند ترکیب په بل ایزومیري موقعیت کې جوړوي. د ساري په توګه د پاراکلورتولین د هایدرولیز په پایله کې په مساوي توګه اړوند ایزومرونه جوړېږي.



په لاندې ځانګړو شرایطو کې په استثنائي ډول د اورتوکلورانیزول څخه د امینېشن په پایله کې میتا امینوانیزول لاسته راځي.



۲. اروماتیک هلوچني مشتقات له فلزاتو سره نږدې په یو ډول هغه شان تعامل سرته رسوي، کوم چې الیفاتیکی دا ډول ترکیبونه ئې سرته رسوي.



له دې لارې کولای شو چې د هلوچن په ځای داسې نور گروپونه هم ځای پر ځای کړو د ساري په توګه د کاربوکسیل گروپ:




۳. د هلوچني مشتقاتو د اروماتیک کړۍ هایدورچني اتومونه د دې توان لري چې په نورو هلوچني اتومونو، نیټروګروپونو، سولفوګروپونو او داسې نورو سره بدل شي، خو دا ډول تعاملات ټول د بنزین سره په پرتله کې د ډېرو ستونزو سره سر ته رسېدای شي. دا خو څرګنده ده چې هلوچني اتومونه نوي تعویضي اورتو او پارا موقعیت ته توجیه کوي. که کلوربنزین کلورینېشن شي نو بیا دلته په زیاته اندازه سره پارا دای کلوربنزین او یو څه کم اورتو دای کلور بنزین هم منځته راځي، د مینا کلوربنزین د منځته راتلو ونډه دلته بیخي کمه ده. دا چې د بنزین په پرتله پورتنی هلوچني تعاملات په ډېره کمه چټکتیا سرته رسېږي اساسي علت ئې دا دی چې د لومړۍ هلوچني اتوم وړ ننوتل بنزولي کړۍ ته په دغه کړۍ کې د الکتروني وریځې د ټکاتف د کموالي لامل ګرزي. په کیمیاوي صنایعو کې داروماتیک هلوچني مشتقاتو له ډلې څخه کلور بنزین د پام وړ ترکیب ګڼل کېږي. د فینول د لاسته راوړلو په مهال هغه یوه منځنۍ ترکیب ګڼل کېږي، همدا رنگه د حشره وژونکو او انلین په لاسته راوړلو کې هم هغه د یوه منځني ترکیب ځای لرونکی دی.

په همدې ډول دای کلور بنزین هم یوه حشره وړونکی ترکیب دی چې په کرنیزو چارو کې وړ څخه کار اخیستل کېږي. بنزایل کلوراید هم د دې لړۍ بل ترکیب دی چې د بنزایل الکول او عطر جوړولو په چارو کې وړ څخه کار اخیستل کېږي.


اروماتیک سلفواسیدونه

دا هغه ترکیبونه دي چې په بنزولي کړۍ یا په هغه پوري تړلی د اړخ په ځنځیر کې د سولفو ګروپ (SO_3H) شته والی ولري. دا ترکیبونه په مونو، دای او ترای سلفو اسیدونو سره ویشل کېږي.

تولوين سولفو اسید (اورتو، میتا، پارا) $CH_3-C_6H_5-SO_3H$ بنزول سولفو اسید $C_6H_5-SO_3H$




میتا بنزول دای سلفو اسید



سی میتریک بنزول ترای سلفو اسید

د لاسته راوړلو لارې چارې


دا سلفو اسیدونه د اړوندو هایډروکاربنونو او یا د هغوی د مشتقاتو د سلفوریشني عملیې په پایله کې لاسته راځي. که بېله تودوخې بنزین د ګاټه سلفوریک اسید سره یو ځای کړو نو د هغوی د تعامل په پایله کې به مونو بنزین سلفو اسید لاسته راشي.




که د سلفوریک اسید ګاټه والی په دې تعامل کې ۶۵٪ ته ورسېږي نو دلته سلفوریشني تعامل درېږي. دا د ګاټه والي کموالی د تعامل په چاپیریال کې د اوبو ورو ورو جوړېده او زیاتوالی دی او د دې لپاره چې د دې عمل مخنیوی وشي نو د ګوګرو اسید ونډه پدې تعامل کې له حساب شوي ونډې څخه باید زیاته وي تر څو د نوموړي اسید ګاټه والی کم نشي او تعامل ونه درېږي.

د دې لپاره چې د دې تعامل سلفواسیدونه له سلفوریک اسید څخه بیل کړای شو، د هغوی د اړوندو مالګو د انحلالیت له عملیې څخه کار اخلو. د سلفو اسیدونو کلسیمي او باریمي مالګې په تودو اوبو کې ښې حلېږي، په داسې حال کې چې د سلفوریک اسید اړوندې مالګې په هغه کې نه حلېږي. زیات وخت د سولفو اسیدونو سودیمي مالګې چې د خوړو له مالګې سره جوړېږي په آسانه توګه جلا


کېدای شي. تعامل او د هغه اړوند الکتروفيلي میخانیکیت لاندې ډول دی. د $H_3SO_4^+$ آیون دلته فعال عامل گڼل کېږي.



دا هم باید په یاد ولرو چې د سلفر (VI) ترای اوکساید یو ډېر پیاوړی او ځواکمن الکتروفيلي عامل دی چې تعامل په ښه توګه سرته رسوي، ځکه په دغه ترکیب (SO_3) کې د آکسیجن درې اتومه د سلفر د اتوم د الکتروني ورځې تکاثف ډېر زیات رابنګته کوي نو ځکه په صنعت کې ډېره ښه لاره گڼل کېږي.



دا هم باید په یاد ولرو چې که چېرې په پورتنۍ تعامل کې SO_3 او یا لوګی ورکونکې د گوګرو اسید وکارول شي نو بیا یو څه سولفون هم دا ډول جوړېږي.



دای او ترای سولفو اسیدونه داروماتیکي هایډروکاربنونو د سولفوریشني تعامل په پایله کې چې د لوګی ورکونکي گوګرو اسید او تودوخي په مرسته د (Ag_2SO_4 او داسې نورو) کنلستونو په شتوالي کې سرته رسېږي، لاسته راځي. په الکتروفيلي تعویضي تعامل کې سولفو ګروپ نوي تعویضي ته په میتا موقعیت کې آسانتیا برابره او هغه لوری ته ئې ورکاري، خو د بنزین هومولوګونه په اورتو او پارا موقعیت کې سلفورېشن کېږي.


فزیکی خاصیتونه

کرسټلي مواد او په اوبو کې حل کېدای شي او هایګروسکوپیک (د لند والي جذب کوونکي) خاصیتونه لري. د عضوي کیمیا د خورا مهمو موادو څخه گڼل کېږي، ځکه سلفو ګروپ په نورو ګروپونو سره د بدلېدو وړ دي. یو څه


خاصیتونه ئی الیفاتیکی هلوچنی مشتقاتو ته ورته والی لري. دا ترکیبونه په دریوگونو گروپونو سره ویشل کېږي او دا ویش د کیمیاوي خاصیتونو پر بنسټ ولاړ دی.

کیمیاوی خاصیتونه

۱. هغه تعاملات چې د سلفو گروپ پر اساس سر ته رسېږي.
۲. هغه تعاملات چې پکې سولفوگروپ په نورو گروپونو بدلېږي.
۳. په بنزیني کړۍ پورې اړوند تعاملات.
۱. د سولفو گروپ تعاملات: دا تعاملات په لاندې ډول څېړل کېږي:
 ۱. په سلفو اسیدونو او نورو پیاوړو او ځواکمنو اسیدونو پورې د اړوندو مالګو منځته راتلل.




۲. د کلور انهایدرایدونو را منځته کېدل (د سلفو کلورایډونو جوړېدل)




بنزین سولفوکلورایډ


دا هم باید په یاد ولرو چې په عام ډول سلفوکلورایډونه د کلورسلفونیک اسیدونو او هایدروکاربنونو د تعامل په پایله کې لاسته راځي.



د سلفو اسیدونو کلورانهایدرایدونه د انهایدرايد عضوي اسیدونو په څېر په اړوندو ایسترونو، امایډونو او نورو داسې مرکباتو سره بدلېدای شي.




د بنزین سلفواسید ایتایل اسټر




بنزین سلفایډ

د سلفو اسیدونو ایسترونه مایع یا جامد ترکیبات دي چې ډېر ښه الکالیني ترکیبات شمېرل کېږي. د سلفو اسیدونو امایډونه بیا کرسټلي ترکیبونه دي، په قلویتاتو کې حل کېدای شي. د هایپو کلورایتونو سره د سلفو اسیدونو له امایډونو څخه د هایدروچني اتومونو د بدلېدو پر بنسټ تعامل دا ډول سرته رسېږي.




۳. که سولفو اسیدونه په ځواکمنه توګه د پودري جست په شتوالی کې چې د ګوګرو اسید په محلول کې اچول شوي وي، ارجاع شي، تیوفینولونه منځته راځي.




II. د سلفو گروپ د بدلېدو تعاملات:


۱. هایدرالیز: د اوبو د ډېر تاوده پراس په مرسته په اسیدي چاپیریال کې له سلفو اسیدونو څخه اروماتیک هایدروکاربنونه لاسته راځي.



الکتروفيلي تعویضي میخانیکیت ئي دا ډول دی.




که د اروماتیک ترکیبونو د سلفورېشنې تعامل راگرزېدونکی (رجعي) تعامل یا حالت په پام کې ونیسو نو دلته سلفو گروپ داسې رول لوبوي چې لوري نیوونکي گروپونه په میتا موقعیت کې ځای ونشي نیولای. د ساري په توګه په لاندې تعامل کې:




۲. د قلوي مذابي (ويلي شوي) تعامل:



که د سلفو اسېدونو مالګي له قلوپاتو سره د تودوخي په مرسته ویلي کړو، فینولاتونه لاسته راځي. د رنگونو په صنایعو کې دا یوه ډېره د پام وړ او مهمه پروسه ګڼل کېږي.




سودیم فینولات



۳. د سیانایدونو سره د سلفو اسیدونو د مالگو د ویلېکېدو په پایله کې نیتریلونه لاسته راځي. له دې امله د سلفورېشن له تعامل څخه په اروماتیک عضوي اسیدونو باندې د اروماتیک هایدروکاربنونو د بدلون لپاره کار اخیستل کېږي.



III. د بنزولي کرۍ تعاملات: دا څرگنده ده چې د سلفو گروپ الکتروفيلي تعویضي تعاملات له ستونزو سره مخامخ کوي، نوځکه نوی تعویضي ته د میتا لوری ور په نښه کوي.




متابروم سلفوبنزین

د دې په پام کې لرلو سره دهلاید بنزینونو د سلفورېشن تعامل په پایله کې تقریباً په استثنايي توګه پاراهلوجن سولفو اسیدونه جوړېږي. له سلفو اسیدونو څخه په صنایعو کې ډېره ګټه تر لاسه کوي. د سودیم سلفونیتونه د فینولونو د لاسته راوړلو لپاره پکارېږي. درنګونو په چارو کې هم ور څخه کار اخیستل کېږي. له دې ترکیبونو څخه د رنګونو په صنایعو کې د داسې موادو په څېر کار اخیستل کېږي چې په اوبو کې د رنګونو د حل کېدو توان پیاوړی کړي.

دا ترکیبونه په همدې ډول د درملو جوړولو په چارو کې پکارېږي او د سلفایدونو د جوړولو په لاره کې ور څخه ګټه اخیستل کېږي.

اروماتیک نایتروترکیبونه

دا هغه مرکبات دي چې په خپلو اړوندو اروماتیک کریو او یا په کریو پوري اړوندو د اړخ ځنځیرونو کې، نیترو گروپ ولري. د هغوی غوره مثالونه نیترو بنزین $C_6H_5NO_2$ ، نیترو تولوین (اورتو، میتا او پارا ایزومیرونه)




او دای نیترو بنزین (اورتو، پارا او میتا ایزومیرونه) دي.

هغه نیتروترکیبونه چې د هغوی په اروماتیک کریو کې نیتروگروپونه ځای لري د هغوی څخه د رنګونو، چاودېدونکو موادو، عطري ترکیبونو په صنایعو کې کار اخیستل کېږي، دا ترکیبونه همدارنګه د عضوي حل کوونکو په توګه هم پکارېږي.


هغه نیتروترکیبونه چې نیتروگروپ نې په کری کې ځای پر ځای شوی وي

د لاسته راوړلو لارې چارې


دا ډله نیترو ترکیبونه د نیترو ګڼوله یا مخلوط چې د شورې اسید او د ګوګرو اسید څخه لاسته راغلي په مرسته له اروماتیک هایډروکاربنونو سره د نایترېشن عمليې په پایله کې لاسته راځي.




که نیترو بنزین نایترېشن شي نو بیا دوهم نیترو گروپ په میتا موقعیت کې ځای په ځای کېږي، خو باید ووايو چې دلته د تعامل د سرته رسېدو د پاره یو څه لوړه تودوخه او د اړوند اسید ګاټه والی هر ورو ګڼل کېږي. دریم نیترو گروپ په دې تعامل کې په ډېره ستونزمنه توګه په میتا موقعیت کې بیا هم ځای په ځای کېدای شي. د پام وړ خبره دا ده چې که لوګی ورکوونکی نایتریک اسید په یو څه زیاته ونډه سره د ګوګرو له اسید سره ګډ کړو د لاندې تعامل پر بنسټ یوازې په سلو کې ۴۵ برخې د ترای نیترو بنزین ترکیب هغه وخت لاسته راځي چې د تعامل دا چاپیریال په اړونده تودوخه پنځه ورځې وساتو.




دا هم بايد وويل شي چې نور نيترو تركيبونه هم د ځانگړو لارو په مرسته لاسته راځي. د ساري په توگه د نيترو انلين د آكسيډېشن له لارې:



كله چې مخكې له مخكې په بنزيني كړۍ كې تعويضي ځاى ولري، نو دلته د نايترېشن عمل آسانه كيږي او كېدای شي چې په عادي شرايطو كې تعامل تر سره شي او درې گروپه نيترو په بنزين كړۍ كې ځاى پر ځاى شي.




د بنزين دهغو مشتقاتو د نايترېشن په پايله كې چې دوه ډول ډول تعويضي گروپونه ولري، د داسې حالاتو په پام لرلو سره د هغوی فضائي ايزوميري اغېزې هم په پام كې نيول كيږي. د ساري په توگه كه دا تعويضي گان په پارا موقعيت كې ځايونه ولري، نو بيا نيتروگروپ هغه تعويضي ته نږدې ځاى نيسي چې وړوكی وي.



په نایترېشنی تعاملاتو کې د نیټرو مخلوط څرنګوالی د اهمیت وړ موضوع ګڼل کېږي او لکه چې هر وخت دا خبره معموله ده د تعامل شرایط خپل ځانګړی اهمیت ساتي.


د ساري په توګه که 90% د ګوګرو اسید په دې تعامل کې وکارول شي تعامل په مناسبه توګه سرته رسېږي، خو که دا ګاټه والی 80% ته راټیټ شي نو د تعامل چټکتیا هم ۳۰۰۰ ځله راښکته کېږي. د دې تعامل د سرته رسېدو په اړوند داسې اټکل کېږي چې ګواکې د ګوګرو او شورې اسیدونو تر منځ لاندې تعادل شتوالی لري.




او په دې ډول په دې نایترېشنې چاپیریال کې نایټریک اسید دا ډول اسوسېشن کېږي.



د NO_2^- په مرسته نایترېشن په اصل حقیقت کې د هایډروجن بدلون په NO_2 سره دی چې بیا نوموړی هایډروجن له هایډروسلفیت سره د ګوګرو اسید جوړوي.



دا هم باید ووايو چې کولای شو د نایترېشن عمل د نایټریک اسید او اسید انهایډرایډ دمخلوط په مرسته سرته ورسوو، دلته اسیتایل نایټریت د یوه ځواکمن الکتروفیل په توګه د نایترېشن کولو دا عمل په ښه توګه سرته رسوي.



فزيکي خاصيتونه


مونو نيتروترکيبونه مايع او يا جامد مواد دي. هغوی يا بيرنگه او يا سپين رنگه زېر، له اوبو څخه درانه او په هغه کې نه حلېږي چې د ترخه بادام په څېر بوی لري، زهري مواد شمېرل کېږي. په ځانگړې توگه بايد ووايو چې نيتروبنزين ځکه ډېر زهري شمېرل کېږي چې له اورگانيزم څخه په ستونزمنه توگه جلا کېدای شي (له بدن څخه د امينو فينول په توگه چې د هغه د مشتقاتو يا هومولوگونو په پرتله چې د امينو بنزوئیک اسيد په څېر دی په ستونزمنه توگه جلا کېږي).

نيترو ترکيبونه په لوړو تودوخو سره په اېشېدو راځي د هغوی د تودوخو دا لوړ والی د نيتروگروپونو په قطبيت پورې پوره اړوند دی. د دې ترکيبونو قطبيت په هغوی کې د ځينې هغو عضوي ترکيبونو د بڼه حل کېدو لامل گرزي چې په عادي عضوي حل کوونکو کې د حل کېدو وړ نوي (د ساري په توگه د طبيعي رنگ يا انديگر حل کېدل)

کيمياوي خاصيتونه


د دې لړۍ کيمياوي خاصيتونه د نيترو گروپ په ځانگړتيا، د اروماتیک کړۍ او همدارنگه د هغوی پر يو بل باندې اغېزې پورې اړه لري.

۱. د دې ترکيبونو ډېر مهم کيمياوي خاصيت د هغوی د نيترو گروپونو د ارجاع کېدو قابليت دی چې دلته د تعامل پايله د هغوی اړوند امينونه دي. مهمه خبره دا ده چې د نيترو بنزين له ارجاع څخه لومړی د دې تعامل په رڼا کې انلین لاسته راغلی دي چې د هغه پر اساس په کيمياوي تخنالوژي کې ډېر زيات ترکيبونه تر لاسه شوي دي. په ځانگړې توگه په همدې ډول يو شمېر رنگونه، درملې توکي او فوتو کيمياوي توکي تر لاسه شوي دي. دا چې د اروماتیک نيتروترکيبونو څخه کوم مواد او څه ډول مواد تر لاسه شي د اړوندو تعاملاتو په شرايطو پورې اړه لري چې په دغه پروسه کې ډېر د پام وړ منځني ترکيبونه تر لاسه کېږي خو بيا هم د تعامل وروستۍ پړاو اروماتیک امينونه دي. په معمولي ډول هغوی په اسيدې کيمياوي چاپيريال کې منځته راځي. بايد په ياد ولرو چې ارجاعي عمل په کيمياوي اسيدې چاپيريال، قلوي چاپيريال خنثی او کمزوري اسيدې چاپيريال کې سرته رسېدای شي نو ځکه زيات شمېر د پام وړ ترکيبونه لاسته راتلای شي. نننيو کيمياوي څېړنو ښودلې ده چې د اروماتیک نيترو ترکيبونو له ارجاع څخه ډېر مهم ترکيبونه لاسته راغلي چې د انسانانو په ژوندانه کې د زيات پام وړ گڼل کېږي د ساري په توگه:




د پورتنۍ تعاملاتي تابلو په اړوند بايد په ياد ولرو چې (۱-۴) تعاملات په خنثۍ او اسيدې چاپيريال کې ځکه سرته رسېږي چې په اسيدې تعاملاتي چاپيريال کې د تعامل منځني محصولات ځانگړې کېدای نشي. په خنثۍ اسيدې چاپيريال کې کولای شو نيترو بنزين او فينایل هایدروکسایل امین جلا خو بيا په قلوي چاپيريال کې نيترو او يا نيتروزو بنزينونه له فينایل هایدروکسایل امین سره کندنېشن کېږي چې بيا ازوکسي بنزين جوړېږي (د ۷-۵ تعاملات).

که ارجاعي عمل په الکتروليتيکي توگه سرته ورسېږي نو بيا نور ډول ډول په زړه پورې ترکیبونه رامنځته کېږي. دلته د یادونې وړ خبره دا ده چې د ډول ډول کيمياوي ترکیبونو رامنځته کېدل د الکتروډونو په پوتانشیل پورې اړه لري. د دې لپاره چې دا خبره ښه څرگنده شي، چې د اروماتیک نيتروترکیبونو له ارجاعي عمل څخه د کيمياوي تعاملاتي چاپيريال د شرایطو او څرنگوالي په پام کې لرلو سره کوم منځني په زړه پورې ترکیبونه لاسته راځي، لاندنۍ کيمياوي تعاملاتي شېما په پام کې نیسو.




۲. اروماتیک نيتروترکیبونه د بنزين په څېر يو زيات شمېر هغه تعاملات چې پکې د اروماتیک کړۍ هایدروجنې اتومونه بدلېږي سرته رسولای شي. په

الکتروفیلی دا ډول تعاملاتو کې نیترو گروپ دنوي تعویضي وړ ننوتل کړی ته له ستونزو سره مخامخ کوي نو ځکه ئې میتا موقعیت ته ورکښوي. په نوکلئوفیلی تعویضي تعاملاتو کې د نیترو گروپ نوي تعویضي ته د اورتنو یا پارا موقعیت لوری ورکوي نو ځکه که نیترو بنزین د تودوخي تر اغېزې لاندې له پوډر ډوله KOH سره تعامل وکړي نو په پایله کې د اورتنو او پارا نیترو فینولاتونو ګډوله لاسته راځي.





۳. دا چې نیترو گروپ زیات الکترونو اکسپتري خاصیت لري نو د ده د ځای په اړوند په اورتنو او پارا موقعیت کې دهغه اغېزه هم څرګنده ده او که په دې هکله اورتنو او پارا نیترو کلور بنزینونو ته پام واورو نو هلوځن د نیترو گروپ تر اغېزې لاندې زیات خوځېدونکي حالت ځانته غوره کوي او ځکه په آسانه توګه په هایډروکسایل بدلېږي، کېدای شي چې په الکوکسي یا امینو گروپ سره هم همدا ډول بدلون رامنځته شي.




که په همدې ډول ترای نیترو ترکیبونه په پام کې ونیول شي د کړی هایډروجنی پاتې اتومونه خوځېدونکي او تعاملات سرته رسېږي. د ساري په توګه ترای نیترو بنزین د تعامل په قلوي چاپیریال کې اوکسیدیشن کېږي او دا عمل د پوتاشیم

هکزا سیان فیریت (III) سره په ښه توګه سرته رسېدای شي او بیا نو ترای نیترو فینول جوړېږي، خو بیا له هایدروکسایل امین سره اړوند امین (پکرامید) منځته راځي.





دا هم باید په پام کې وټرو چې که ترای نیترو بنزوئیک اسید له اوبو سره د تودوخي تر اغېزې لاندې و اېشو نو په پایله کې دا ترکیب په دې ډول دی کاربوکسایلیشن کېږي.





د نیتروګروپ په شتوالی کې د هغه میتایل ګروپ هایدروجنی اټومونه چې په اروماتیک کړۍ پورې نښتي دي ډېر زیات خوځیدونکی حالت ځانته غوره کوي او اړوند ترکیبونه کوم چې منځته راځي د پارا موقعیت پر بنسټ د کندنښني

تعامل لاسته راوړنه ده. د ساري په توګه که پارا نیترو تولوین د تودوخي تر اغېزې لاندې د KOH له الکولي محلول سره یو ځای کړو، نو هغه د هوا د اکسیجن په مرسته اکسیدیشن کېږي او بیا نو دای نیترو ستلین په لاس راځي.



دای او ترای پارا دای نیتروستلین دپه یاد سره کندنسیشن او په پایله کې دای او ترای نیترو ستلینونه جوړېږي.



د نیترو اروماتیک ترکیبونو د زیات اهمیت له امله اوس د هغوی ځینې ځانګړو استازو ته په لاندې ډول کتنه او د هغوی لندې یادونې کوو. نیترو بنزین چې د دې لړۍ یو خورا د اهمیت وړ ترکیب دی، د سانتي ګراد په (۲۱۰) درجو په اېشېدو راځي او څنګه چې مو ولیدل په زیاته اندازه د بنزین له نایترېشن څخه په لاس راځي. په خالص او پاک حالت کې هغه یوه بېرنگه مایع ده چې ترڅه بادام ته ورته بوی لري. په اوبو کې نه حلېږي او له اوبو څخه ئې دروندوالی ډېر دی په همدې ډول هغه ډېر زیات زهري دی. د عضوي موادو یو حل کوونکی دی، بیخي ډېر د انلین د لاسته راوړلو لپاره پکارېږي. د دې لړۍ

بل ترکیب ترای نیترو بنزین دی چې د بنزین د نایترېشن په پایله کې لاسته راتلای شي خو د دې تعامل څخه لاسته راوړنه کمه ده، نو له دې امله ئې د ترای نیترو تولوین له اکسیدېشن او دي کاربوکسیلیشن څخه په لاس راوړي. د هغه د ویلېکېدو تودوخه د سانتی گراد ۱۷۲ درجې ده چې یو ځواکمن چاودېدونکی ترکیب گڼل کېږي.


نیترو تولوینونه هم د دې بهیر د اهمیت وړ ترکیبونه دي. څرگنده خبره ده چې هغوی د تولوین د نایترېشن په مرسته لاسته راځي، د هغوی له پلې څخه پارانیترتولوین کرسټلي ماده ده. نیترو تولوینونه د تولوئیدینو د لاسته راوړلو لپاره پکارېږي، هغوی د رنگونو د لاسته راوړلو لپاره په زړه پورې منځني ترکیبونه شمېرل کېږي.

ترای نیترو تولوین (تروتیل یا تول) چې د تولوین له نایترېشن څخه په لاس راځي، زیړه کرسټلي ماده ده چې په ۸۰،۶°C سره ویلې کېږي. خورا مهمه چاودېدونکې ماده ده.

هغه نیترو ترکیبونه چې په اړخ پورې تړلي ځنځیر کې نیترو گروپ لري

دا ترکیبونه هم په هغه ډول لارو چارو لاسته راځي په کومو چې مخکښې نیترو ترکیبونه یانې هغه ترکیبونه چې نیترو گروپ ئې په الیفاتیک ځنځیر کې وو لاسته راتلل.


۱. د بنزین د هولومولوگونو څخه د نایترېشن کولو له لارې د رقیق نایتریک اسید په مرسته:




په دې تعامل کې رادیکال ډوله نایتروجن دای اوکساید بنسټیز رول لوبوي.



۲. د هغه هلوچني مشتقاتو له تعامل څخه چې هلوچني اتوم ئې د کړۍ په اړخ پوې تړلي ځنځیر پورې اړوند وي د سپینو زرو له نایترایت سره لاسته راځي.




۳. د هغه ∞ - نیترو اسیدونو له دی کاربوکسیلیشن څخه چې دنیتروگروپ د هغوی د اړخ په ځنځیر کې ځای ولري او دا د فینایل نیترو میتان د لاسته راوړلو یوه غوره لاره گڼل کېږي.




فزيکي او کيمياوي خاصيتونه

د دې لړۍ نيترو ترکيبونه مایع او یا جامد مواد دي چې په اوبو کې ښه نه حلېږي. د هغوی له مهمو خاصیتونو څخه دا دی چې ارجاع کېدای شي او مالګې هم جوړولای شي.

۱. دا نيترو ترکيبونه په ډول ډول لارو چارو سره ارجاع کېدای شي چې د تعاملاتو پایله بیا هم امینونه دي. د هغوی ځانګړتیا د نایتريک اسید د اړوندو ایسترونو څخه په دغه تعامل کې ښه څرګندېدای شي.




۲. دا نيترو ترکيبونه کولای شي په هغه ډول ډول تعویضي تعاملاتو کې ګډون وکړي چې په اروماتیک کړۍ کې سرته رسېږي. دا هم باید په یاد ولرو چې په دې تعاملاتو کې نيترو میتایلي ګروپ ګډ لوری نیوونکی خاصیت لري. هر څومره چې د کړۍ له هستې څخه لرې وي په هماغه اندازه اورتنو او پارا الکایلي لوری نیوونکی خاصیت ئې هم ځواکمن وي. د ساري په توګه :
د میتا ایزومیر رامنځته کېدل به دا ډول وي.



هایدروکسي اروماتیک ترکیبونه

د اروماتیک هایدروکاربنونو مشتقات دي چې په دوو گروپونو سره وېشل کېږي.

لومړی گروپ ئې فینولونه نومېږي، خو دوهم گروپ ئې د اروماتیک الکولونو په نوم سره یاد شوي دي. په فینولونو کې هایدروکسایل گروپ نیغ په نیغه په بنزولي کړۍ پورې نښتی دی په داسې حال کې چې د هایدروکسایل دغه گروپ بیا د اړخ په ځنځیر پورې اړوند دی. که څه هم دا پوښتنه رامنځته کېدای شي چې ینولي شکل په ساده الیهایدونو او کیتونونو کې ثابت حالت او شکل نلري او په پوره ډول په کاربونیلي څېره ثابت پاته کېږي خو ډېر زیات فینولونه په استثنائي ډول ینولي شکل لري.




دا چې په فینولونو کې د کیتونونو په پرتله ینولي شکل ثابت حالت لري نو دا د هغوی له یو بل سره په تړلو ډېرو ثابتو اړیکو پورې اړوند دی.


فینولونه

د هایدروکسایل گروپونو د شمېرې په اړوند فینولونه په یو او څو اتومه فینولونو سره وېشل کېږي. دا هم باید ووايو چې ځینې فینولونه زیات صنعتي اهمیت هم لري.

د فینولونو نوم اېښودنه یا داچې د اروماتیک هایدروکاربنونو د مشتقاتو په توګه او یا دا چې په پخوانۍ رواجي، منطقي نوم اېښودنه سره سرته رسېږي. د بنزین په کړۍ پورې اړوند فینولونه کېدای شي آن تر دې چې شپږ اتومه هم وي.



فینول




پاراکریزول

یو اتومه فینولونه


دا چې دا د اهمیت وړ ترکیبونه څرنګه لاسته راوړو لازمه ده چې په اروماتیک کړۍ کې د OH ګروپ ور داخل کړو او د دې لپاره څو لارې چارې شته چې په لاندې ډول ورته کتنه کوو.

۱. که د سولفو اسیدونو د مالګو او قلویتو ګډوله د تودوخې تر اغېزې لاندې ویلې کړو نو بیا دا ترکیبونه لاسته راټلای شي.




دا میتود په کیمیاوي صنایعو کې ډېر پکارول کېږي. که څه هم دا تعامل له سودیم هایدروکساید سره په $320-350^\circ C$ تودوخه ښه سر ته رسېږي، خو که بیا دلته د $NaOH$ پر ځای KOH وکارولی شي نوبه د لاسته راغلو موادو ونډه ډېره وي.

۲. د هلوچني مشتقاتو له هایدرولیز څخه دا لری ترکیبونه لاسته راځي. په کیمیاوي تخنالوژي کې د کلور بنزین څخه فینول په ښه توګه دا ډول په لاس راوړي.




دا چې په برسېره تعامل کې په هسته پورې نښتی کلورین لږ کم متحرک دی، نو لدې امله تعامل د مسي مالګو په شتوالي کې په اوتوکلارونو کې د سودیم هایدروکساید له (8%) محلول سره په $250^\circ C$ کې سرته رسېدای شي.

۳. د هایدروپراوکسایدونو له تجزیې څخه هم دا ترکیبونه لاسته راځي. په کیمیاوي صنایعو کې په همدې ډول فینول د ځینې الکایل بنزینونو د هایدروپراوکسایدونو له اسیدي تجزیې څخه هم لاسته راوړي. د ساري په توګه په لاندې ډول چې د کومول هایدروپراوکساید تجزیه او اسیتون او فینول لاسته راغلي دي.



په پورتنی تعامل کې د دي ازوتېشن عمل د تودوخې تر اغېزې لاندې ښه سرته رسېدای شي.

۶. کولای شو چې د فینول هومولوگونه د سولفو هلوجني يا د بنزين د اميني مشتقاتو له هومولوگونو څخه لاسته راوړو، خو په همدې ډول د فینول په کړۍ کې د الکایلي گروپ ور ننه ایستل هم د دي ترکیبونو د لاسته راوړلو یوه لاره ده. د فینولونو الکایلېشن په آسانه توگه سرته رسېدای شي، دا پدې مانا دی چې د OH گروپ د څه نا څه زیات فعالیت له امله دلته د تعامل چټکتیا د بنزين او د هغه د هومولوگونو د الکایلېشن په پرتله په ښه توگه سر ته رسېږي. هېر مو نشي د کتلست په توگه دلته زنک کلوراید په الکولونه کې د اکایلېشنی عمل د چټک کونکي په توگه په کارېږي.



فزیکي خاصیتونه



په عام ډول دا ترکیبونه کرسټلي مواد دي چې په اوبو کې په ستونزمنه توگه حلېږي د اوبو له بخار سره په خپل اړوند براس سره بدلون مومي. دا ترکیبونه خپل ځانگړي بویونه لري دانتی سپټیک خاصیت لرونکي او ډېر زهري دي. په پوستکي کې تویي شي، نو هغه سوزي.

دا هم باید وویل شي چې له اوبو سره کرسټالو هایدریتونه جوړوي چې هغوی بیا د اړوندو فینولونو په پرتله د ویلېکېدو د ټیټو تودوخو لرونکي دي.

کیمیاوي خاصیتونه



په فینولونو کې په همدې ډول چې هایډروکسایلي گروپ د ډېر فعالیت لرونکی دی، اروماتیکي کړۍ هم دکیمیاوي تعاملاتو له مخې ډېره فعاله شمېرله کېږي.

۱. که فینولونه د الکولونو یا اوبو سره پرتله کړو نو دا ترکیبونه د لوړ اسیدي خاصیت لرونکي دي خو د اسیدونو (عضوي اسیدونو) په پرتله بیا ډېر کمزوري اسیدونه شمېرل کېږي. فینولونه له همدې امله د سودیم هایدروکساید له محلول سره تعامل کوي او فینولاتونه جوړوي، خو بیا هم نشي کولای CO_2 له کاربوناتونو څخه جلا کړي، په داسې حال کې چې فینولونه د کاربونیک اسید په مرسته له فینولاتونو څخه جلا کېدای شي.




پورتنۍ تعامل د فینولونو او الکولونو یا عضوي اسیدونو د یو بل څخه د بېلولو لپاره پکارېږي.

۲. د فینولونو الکیلېشن هغه وخت چې په فینولاتونو هلوځني مشتقات اغېزه وکړي په ښه توګه سرته رسېدای شي. دا تعامل هغه وخت په ډېره آساني سره سرته رسېږي چې مسي پوډر او همدارنګه الکیل سلفیتونه د سلفو اسیدونو ایترونه او یا دای ازومیتان د تعامل په چاپېریال کې وکارول شي.



د فینولونو ایترونه ثابت کیمیاوي ترکیبونه دي، خو که له سودیم او یا $NaNH_2$ سره یې په خنثی حل کوونکي چاپېریال کې د تودوخې تر اغېزې لاندې راولو نو هغوی بیا د الیفاتيک بهیر ایترونو په څېر ټوټه کېږي. دا هم باید په یاد ولرو چې دا ترکیبونه ډېر کم د قلیاتو تر اغېزې لاندې راځي.


۳. فینولونه د اتلین له اېپوکساید سره تعامل کوي چې د دغه کاندنسیشنی عمل په پایله کې د فینولي ایتر پولي اتلین ګلايکول لاسته راځي.




دا ډول ایترونه او بیا په ځانګړې توګه هغه ډله ئې چې د فینول په مالیکول کې الکیلې ګروپ شتوالی ولري د سطحي اړوند برخې فعال ترکیبونه ګڼل کېږي. په

دې حالت کې بيا د ماليکول الکايل فينايلي برخه، هايډروفوب او پولي اتلين گلايکولي برخه ئې هايډروفيلي خاصيت لري. نو ځکه له هغوی څخه په تخنيک او صنعت کې زياته گټه اخيستل کېږي او له همدې امله ئې د سپڼسيو او نورو نساجي توکو د پاکولو لپاره پکاروي.

۴. کولای شو چې د فينولونو ايسټرونه داسيدونو د انهايډرايدونو او يا د هغوی دهلوجن انهايډرايدونو له تعامل څخه د فينولاتونو او ياد فينولونوله محلول سره په پيريدين کې لاسته راوړو.




۵. په زياته ستونزمنه توگه د فينولونو هايډروکسايلي گروپ په هلوجني اتوم سره بدلېدای شي. دلته د فوسفورس ترای کلورايد له تعامل څخه د فينولونو سره د فوسفورس اسيد ايسټرونه لاسته راځي.




که په پورتنۍ تعامل کې بيا فوسفورس پنتاکلورايد وکارول شي بيا هم ايسټرونه لاسته راځي خو هغوی به بيا کلورفينولونه وي چې هغه بيا فينولونه کلورينېشن کوي.

۶. که فينولونه د پودري زنک (Zn) په شتوالي کې تقطير کړو نو بيا دلته د هايډروکساييل گروپ په هايډروجني اتوم سره بدلېږي.




۷. دا هم څرگنده خبره ده چې هايډروکسايلي گروپ په اروماتيک کړۍ ډېره اغېزه لري، د هغه تعاملاتي ځواکمني لاپسي پياوړې کوي چې په اورتو او پارا موقعيت کې ښه را څرگندېږي نو ځکه فينول په ټولو ممکنو تعويضي او کاندنسيشن تعاملاتو کې په ښه توگه گډون کولای شي.

که د هلوجنونو په مرسته او يا نورو هلوجنېشن کوونکو موادو تر اغېزې لاندې فينول هلوجنېشن کړو، تعامل په ښه توگه په پارا موقعيت کې په چټکتيا سره سرته رسېږي. د کلورينېشن په پايله کې دلته زياته برخه اورتو ايزومير لاسته راځي. د اروماتيک کړۍ دهلوجنېشن پايله د ترای هلوجن فينولونو منځته راتلل دي چې که بياهلوجنېشن نور هم اوږد شي نو بيا نور اړوند هلوجني مشتقات هم رامنځته کېدای شي.




۸. که فینول د رقیق نایتریک اسید په مرسته نایتریشن کړو نو د اورتو او پارا نیترو فینولونو ګډوله منځته راځي او دا چې اورتو ایزومیر ئې د اوبو د براس په مرسته ډېر په آساني سره په براس بدل او جلا کېږي نو ځکه هم د نوموړي ګډولي بېلېدل په اړوندو برخو ګران کار ندی. که لاسته راغلي نیترو فینولونه بیا هم د ګاټه نایتریک اسید په مرسته نایتریشن کړو نو بیا ترای نیترو فینول چې ورته پکریک اسید هم وائي لاسته راځي.



دا چې د فینول د نایتریشن په مهال کېدای شي هغه آکسید شي نو لازمه ده چې د نایتریشن دا عملیه په یو څه نرمو شرایطو کې تر سره شي.

۹. که فینولونه سلفیوریشن شي نو بیا پارا او اورتو سلفواسیدونه جوړېږي. د کوتې په تودوخه د ګاټه سلفیوریک اسید په مرسته سلفورېشن کېږي او دلته اړوند اورتو ایزومیر لاسته راځي، په داسې حال کې چې که دا تعامل په (100°C) تودوخه سرته ورسوو، نو بیا پارا ایزومیر منځته راځي.




۱۰. فینولونه په آساني سره له الیهایدونو سره کاندنسیشنی تعاملات سر ته رسوي.

الف: که کوم پارافینی الیهاید د قلوي یا اسیدی کتلست تر اغېزې لاندې له فینول سره یو ځای کړو نو کاندنسیشنی عمل په اورتو یا پارا موقعیت کې سرته رسېدای شي چې ډېر زیات عملي اهمیت لري، دا ځکه چې د دې تعامل په مرسته د اهمیت وړ پلاستيکونه او لاکونه لاسته راځي.




په عادي تودوخه د لاسته راغلي مالیکول اوږدوالی د فینول او الیهاید په هغه کاندنسیشنی تعامل پورې اړوند دی کوم چې په مستقیمه کرښه سرته رسېږي.



که پورتنی تعامل د تودوخې تر اغېزې لاندې سرته ورسېږي نو بیا به لاسته راغلی لاک یا پلاستیک منشعب ډوله مالیکول ولري.

ب: فینولونه کولای شي همدارنګه له اروماتیک الیهایدونو سره ورته تعامل سرته ورسوي چې په پایله کې د اهمیت وړ ځینې رنګونه لاسته راځي. لکه په لاندې ډول د ترای فینایل میتاني بهیر رنګونه:



د زیات تخنیکي او صنعتي اهمیت له امله د دې بهیر ځینی نامتو استازو ته لنډه کتنه کوو.

فینول: کرسټلي ترکیب دی چې په (43°C) سره ویلي او په (181°C) تودوخه سره په اېشېدو راځي. په اوبو کې حل کېدای شي او دا ترکیب په عام ډول د کاربالیک اسید په نوم سره هم یادېږي. خپل ځانګړی بوی لري، پوستکي سوزي.

په درملې چارو کې یو له انټي سپټیک ترکیبونو څخه ګڼل کېږي. دا چې پروتیني امینو اسیدونه د بنزین کړۍ لرونکي دي نو دانسان او نورو حیواناتو په بدنونو کې کله چې تجزیه کېږي په پایله کې یو ترکیب هم فینول دی نو ځکه هغه د دې ژوندیو په میتازو کې هم پیدا کېږي. فینول د ډبرو سکارو څخه په لاس راځي خو د سنتتیکي میتودونو پر بنسټ هغه له کلور بنزین څخه تر لاسه کوي. هغه همدارنګه د بنزین سلفو اسیدونو او فلوئیتو د ګډولي له ویلي کېدو، د کومول له لارې د پروپیلین څخه او همدارنګه هغه بنزوئیک اسید او داسې نورو څخه هم په لاس راوړي. لکه مو چې مخکې وویل فینول د یو زیات شمېر پلاستیکونو د لاسته راوړلو لپاره پکارېږي، هغه همدارنګه د درملې موادو، رنګونو او چاودېدونکو موادو د جوړولو په چارو کې د پام وړ مهمه ماده ګڼل کېږي.

انیزول چې د فینول میتایل ایتر بلل کېږي د دې لړۍ یو بل ترکیب دی، هغه اوبلن او د سانتي ګراد په 153 درجو سره په اېشېدو راځي. د عطرونو او رنګونو د جوړولو په چارو کې ور څخه کار اخیستل کېږي. فینیتول چې هغه هم د فینول ایتایلي ایتر دی، اوبلن ترکیب، د اېشېدو تودوخه ئې د سانتي ګراد 172 درجې او انیزول ته په ورته ډول پکارېږي.


د دې لړۍ داسې نور د پام وړ ترکیبونه کریزولونه دي چې په ګډوله توګه د هغه درې واړه اړوند ایزومیرونه د ډبرو له سکارو څخه لاسته راځي. دا درې واړه ایزومیرونه په همدې ډول دهغوی له اړوند د امینونو څخه د دې ازوترکیبونو څخه لاسته راتلای شي.

کریزولونه د پلاستیکونو، رنګونو، ضد مکروبي موادو د صنایعو په چارو کې پکارېږي. هر څومره چې د فینولونو د هومولوګونو اړوند الکایلي ګروپونو پیچلي وي په هم هغه اندازه د هغوی زهري خاصیت – کموالی مومي پداسې حال کې چې د هغوی بکتریا وژونکي خاصیت زیاتېږي. د ساري په توګه د کریزول بکتریا وژونکي خاصیت له فینول څخه دوه ځله زیات او د امایل میتاکریزول دا خاصیت د فینول په پرتله 250 ځله ډېر دی.

د دې لړۍ ترکیبونو ځینی خاصیتونه ډېر په زړه پورې دي. د ساري په توګه تیمول چې د 2 - ایزوپروپایل 5 - میتایل فینول په نوم سره هم یادېږي او داسې یوه کرسټلي ماده ده چې د سانتي ګراد په 51 درجو ویلي او په 232 درجو په


اېشېدو راځي په يو شمېر زياتو عطري طبيعي تيلو کې پيدا کېږي. او د غاښونو په روغتيايي کلينيکي چارو کې ور څخه کار اخيستل کېږي د هغه ايزومير چې (کار وکرول) نومېږي، هم د نوموړو تيلونو په جوړښت کې برخه لري او يو گټور کيمياوي ترکيب دی.

د دې لړۍ يو بل په زړه پورې ترکيب چې په بادپانو کې زيات پيدا کېږي پاراپرينيل انيزول نومېږي چې هغه ته انيتول هم وايي او د عطرونو د جوړولو په صنايعو کې ور څخه کار اخيستل کېږي. د دې ترکيبونو فورمولونه دا دي:




دوه اتومه فينولونه

څرگنده ده چې هغه فينولونه چې په اړونده اروماتیک کړۍ پورې د هايډروکسايډ دوه گروپونه ولري د دوه اتومه فينولونه په نوم يادېږي.





دوه اتومه فينولونه چې کرسټلي ترکيبونه دي په آسانه توگه په اوبو کې حلېږي او د هغو لارو، چارو په پکارولو سره لاسته راځي، کومې چې د يوه اتومه فينولونو د لاسته راوړلو لپاره ور څخه کار اخيستل شوی وو، دا هم جوته ده چې دا لارې چارې کټ مټ هغه ډول نه کارولي کېږي او خامخا به په هغوی کې ځينې بدلونونه هرومرو گڼل کېږي. کيمياوي خاصيتونه ئې هم يو اتومه فينولونو ته د هغوی د ځانگړتيا او ماليکولي جوړښت په پام کې لرلو سره ورته دي. د ساري په توگه:

۱. د دې فینولونو اسیدي خاصیت د یو اتومه فینولونو په پرتله ډېر دی. برسېره پر قلوي فلزاتو له نورو داسې موادو سره هم مالګې جوړوي. د ساري په توګه که پیري کتخین د پلامب اسیتات له محلول سره یو ځای کړو نو په پایله کې د پلامب اړونده نه حل کېدونکي مالګه د تعامل له چاپیریال څخه جلا کېږي.




۲. د فینولونو په پرتله د کړۍ د هایډروجنی اتومونو په برخه اخیستو سره، تعویضي او کاندنسیشنی تعاملات په دوه اتومه فینولونو کې په آساني سره سرته رسېږي، آن تر دې چې په نرمو شرایطو کې هم له هغوی څخه دوه او درې تعویضه فینولونه لاسته راځي.




سټیفینیک اسید

۳. دوه اتومه فینولونه ډېر پیاوړي ارجاع کوونکي دي نو ځکه ډېر په آسانه توګه اوکسیدایز کېږي. په لاندې ډول د اکسیدیشني عمل په پایله کې له پیروکتخین او هایډوکینون څخه اړوند ترکیبونه لاسته راځي.




اورتوکینون




پاراکینون

د دوه اتومه فینولونو له ډلې څخه د ځینو مهمو ترکیبونو ئې په لنډه توګه یادونه کوو. پېریکتین چې د ویلېکېدو تودوخه ئې (104°C) او د اېشېدو ئې (245°C) ده، که یو څه وخت له $FeCl_3$ یو ځای او وساتل شي زرغون رنگ جوړوي چې که سودا پر هغه ورزیات شي نو بیا سور رنگ جوړېږي. دا ترکیب په طبیعي ډول په یو شمېر بوټو او همدارنګه د آس په میتيازو کې پیدا کېږي. په صنعت کې پېروکتین له ګوايا کول څخه داسې لاسته راوړي چې دا ترکیب د $AlCl_3$ په مرسته د تودوخې تر اغېزې لاندې دي میتایلیشن کوي او یا دا چې د سلسیلیک الیهاید څخه د هایډروجن پراوکساید او کلوي تر اغېزې لاندې هغه لاسته راوړي.




دا ترکیب د فوتوګرافي په تخنیک او همدارنګه د ځینې نور موادو لکه ادرنالین په لاسته راوړلو کې پکارېږي. ګویاکول هم چې د دې لړۍ یو بل د پام وړ ترکیب دی په درملې چارو کې وړ څخه کار اخیستل کېږي. ریزارسین چې د ویلېکېدو تودوخه ئې (118°C) او د اېشېدو تودوخه ئې (276°C) ده، هغه هم د دې لړۍ یو د پام وړ ترکیب او د یو شمېر ارزښتناکو رنګونو د لاسته راوړلو لپاره او همدارنګه په روغتیايي چارو کې له هغه څخه د مکروب وړونکې په توګه کار اخلي. دا ترکیب د $FeCl_3$ سره ښکلی بانجاني رنگ جوړوي. په همدې ډول هایډروکینون چې په 170°C سره ویلې او په بوټو کې د یوه ګلايکوزید په څېر چې کیمیاوي فورمول ئې دا ډول دی پیدا کېږي.




نوموړی ترکیب د کینون له ارجاع څخه په صنعت کې په لاس راوړي، هغه په آسانه توګه بیا په کینون سره هم اوکساید کېدای شي.

درې اتومه فینولونه


په لاندې ډول د درې اتومه فینولونه درې ډوله ایزومیري فورمولونه ښودل کېږي.



پيروگلول




اوکسی هایدروکینون




فلوروگلايسين

درې واړه پورتنی ایزومیرونه د نورو فینولونو په څېر د عمومي لارو چارو په مرسته لاسته راځي. پيروگلول له گالیک اسید څخه چې په طبیعت کې ډېر دی داسې لاسته راوړي چې دا اسید په اوتوکلاو کې له اوبو سره تودوي. اوکسي هایدروکینون له کینون څخه بیا دا ډول په لاس راوړي.




په همدې ډول دریم ایزومیر چې فلوروگلايسين دی د ۱،۳،۵ - تراى امينو بنزين څخه د مالګې اسید تر اغېزې لاندې په لاس راوړي، خو په صنعت کې ئې دا ډول استحصالوي.




درې واړه پورتنی ایزومیرونه کرسټلي ترکیبونه دي چې په اوبو کې ښه حلېږي.

د پيروگلول مشتقات په طبيعي ډول په يو لړ بوټو کې پيدا کېږي. پيروگلول د يو پياوړي ارجاع کوونکي په توګه پکارېږي نو ځکه په ګازونو کې د اکسيجن د شته والي د ونډې د معلومولو لپاره او همدارنګه په فوټوګرافي کې پکارېږي، همدارنګه له هغه څخه په درملې چارو او د ځينې رنگونو په جوړولو کې کار اخيستل کېږي.


فلوروګلايسين چې مشتقات يې په پېچلې توګه په طبيعت کې ډېر دي د پنتوز د څرګندولو لپاره هم د يوه ريکټيف په توګه کار اخيستل، د فورفورال او لګنين په معلومولو کې هم له هغه څخه کار اخيستل کېږي. دا ترکيب د ټولو پورتنیو ايزومرونو په پرتله په خپله اړونده توتوميری څېره په آسانه توګه راګرزېدای شي او له هايډروکساييل امين سره ترای اوکسيم جوړوي.




په همدې ډول که هغه د تودوخي تر اغېزې لاندې د CH_3I او KOH په مرسته ميتايليشن شي نو بيا هکزاميتايل سکلو هکزان ترای اون منځته راځي.



فلوروګلايسين په همدې ډول د دای ازوميتان تر اغېزې لاندې ميتايليشن کېدای شي او په پايله کې د هغه اړوند ميتايلي ايتر رامنځته کېږي.



دا هم يو څرگند حقيقت دی چې داسې پوښتنه به راوړاندې شي چې کېدای شي چې پولې هايډروکسي بنزينونه شتوالی ولري؟
 د دې پوښتنې ځواب مثبت دی او دا ترکیبونه شتوالی لري، د هغه غوره مثال هکزا هايډروکسي بنزين دی چې د لاندې تعامل له لارې د کاربن مونو اوکسايډ او پوتاشيم له تعامل څخه تر لاسه کېږي.




فينولونه يو لوی گروپ ترکیبونه دی چې برسېره په خپلو پورتنیو او يادو شوو ترکیبونو نور ترکیبونه هم لري. د ساری په توګه د هغه اړوند تعویض فينولي ترکیبونه لکه هلوچني فينولونه چې د فينولي کړی د هايډروجن اټوم په هلوچن سره بدل شوي دي. همدارنګه فينول سلفو اسيدونه او نيتروفينولونه دا ډول ترکیبونه دي چې په فينولي کړی کې د هايډروجن اټوم په سلفو يا نيترو گروپونو سره بدل شوي دي.


اروماتیک الکولونه

مور لا مخکې وویل چې په اروماتیک الکولونو کې د هایدروکسیل ګروپ د اړخ په ځنځیر پورې تړلی وي. د دې ترکیبونو د لاسته راوړلو لارې چارې او په همدې ډول د هغوی کیمیاوي خاصیتونه د فینولونو په پرتله ډېر زیات پارافیني الکولونو ته ورته والی لري. اروماتیک الکولونه د ایسترونو په څېر په آزاد ډول په بوټو او ونو کې پیدا کېږي دا ترکیب د بنو بویو لرونکي او لدې امله د عطرونو په جوړولو کې ور څخه کار اخیستل کېږي. د زیات اهمیت له امله دهغوی د لاسته راوړلو ځینې لارې چارې څېړو، خو مخکې له مخکې باید ووايو چې د هغوی لاسته راوړل د هایدروکسیل ګروپ په موقعیت پورې چې له بنزیني کړۍ څخه په کوم واټن پروت دی اړه لري.


۱. هغه الکولونه چې د هایدروکسایل ګروپ ئې په α موقعیت کې ځای ولري، په دې مانا چې د اړخ ځنځیر په هغه کاربنی اتوم پورې نښتی وي کوم چې د کړۍ سره ګاونډی وي، په ډېره آسانه توګه د اړوندو هلوځني مشتقاتو څخه لاسته راځي. دلته په اړوند هلوځني مشتق د هایدرولیز عمل سرته رسېږي. د دې لپاره چې دا عملیه په ښه توګه سرته ورسېږي نو د سودا له محلول سره د کم مهال لپاره د تعامل چاپېریال تودوي.




۲. اروماتیک الکولونه همدارنګه د دوو الډیهایدونو له ګډولي څخه د قلوي له ګاټه محلول سره لاسته راځي د ساري په توګه په لاندې تعامل کې د فورم الډیهاید او بنزالډیهاید څخه د KOH تر اغېزې لاندې بنزایل الکول او فارمیک اسید لاسته راځي.




۳. د سودیمي الکولي محلول په مرسته هم د ایسترونو د ارجاعي عمل په پایله کې دا ترکیبونه لاسته راځي.




۴. هغه الکولونه چې د هایډروکسایل ګروپ ئې په β - موقعیت کې ځای ولري هغوی بیا د هلوځني مشتقاتو د هایډرولیز له لارې لاسته راځي نو بیا اړوند هلوځني مشتقات له قلیاتو سره یو ځای او په پایله کې هلوځني اسیدونه جلا او اړوند الکولونه تر لاسه کېږي.



د پورتنۍ ډول الکولونو د لاسته راوړلو یوه بله بڼه لاره دا ده چې که عضوي ایپوکسایدونه له عضوي فلزي ترکیبونو سره چې اروماتیک رادیکیل ولري یو ځای کړو، نو بیا دا الکولونه لاسته راځي.




په صنعت کې بیا دا ډول الکولونه د اروماتیک هایډروکاربنونو او ایپوکسایدونو له تعامل څخه د المونیم کلوراید کتلست په مرسته لاسته راوړي.




په پورتنۍ تعامل کې د فرعي ترکیب په توګه همدارنګه د اتلین ګلايکول فینایلي ایتر هم لاسته راځي. چې فورمول ئې $(C_6H_5-O-CH_2-CH_2OH)$ دی.

۵. هغه الکولونه چې هایډروکسایلي ګروپ ئې د اړخ په ځنځیر کې د γ په موقعیت کې ځای ولري د اړوندو غیر مشبوع اروماتیک الکولونو له هایډروجنېشن څخه لاسته راځي.




۶. د پارافیني لړۍ الکولونو په څېر د اړوندو عمومي لارو چارو په مرسته هم دا الکولونو لاسته راوړي. د ساري په توګه د بنزالدیهاید څخه د هایډریشن عمل په مرسته اړوند الکول لاسته راځي.




د کیمیاوي خاصیتونو له مخې دا الکولونه پارافیني مشبوع الکولونو ته ډېر ورته دي نو هغه شان تعاملات هم سرته رسوي. د فینولونو سره په توپیر هغوی له قلیاتو سره تعامل نشي کولای خو بیا هم کولای شي اړوند الکولاتو نه جوړ

کړي (د پارافيني الکولونو په څېر عمل کوي). خو دلته بايد په ياد ولرو چې دا الکولاتونه د قلوي فلزاتو سره د تعامل په پايله کې جوړېږي. په همدې ډول دا الکولونه د پارافيني الکولونو په څېر له اسيدونو سره اړوند ايسټرونه جوړوي، د دې الکولونو ځينې ځانگړتياوې دا دي. الف: هغه الکولونه چې دهايډروکساييل گروپ ئې د اړخ په ځنځير کې په ∞ - موقعيت کې ځای ولري په آسانه توگه په هلوچني اتوم بدلېدای شي. دا عمل د دې الکولونو او هايډروهلوجني اسيدونو د تعامل په مرسته سرته رسېدای شي.



ب: هغه الکولونه چې د OH گروپ ئې بيا د β په موقعيت کې وي نو په آسانه توگه دى هايډریتېشن کېږي او ور څخه اړايل اوليفينونه لاسته راځي.




د اروماتیک الکولونو ځينې د پام وړ استازي دا دي:

بنزایل الکول: داسې مایع ده چې د سانتي گراد په ۲۰۶ درجو سره په اېشېدو پيل کوي. دا ترکیب په اوبو کې ښه نه حلېږي. په طبیعت کې هغه په ځينې عطري او ښه بوی لرونکو غوړو او تیلو کې پیدا کېږي. په چنبیلي او سنبل گلونو او همدارنگه د گلایکوزید په ډول په جوارو کې هم پیدا کېږي. لدې ترکیب څخه د عطرونو په جوړولو کې کار اخیستل کېږي.


۲- فینایل ایتانول يا β - فینایل ایتایل الکول چې دا هم مایع ترکیب او د اېشېدو تودوخه ئې 219°C ده په گلابو او نیرویلني تیلو کې پیدا کېږي. له دې څخه هم په پرفیومري کې کار اخیستل کېږي، هغه د عطرونو د ښه بوی په ساتلو کې د ثبات ورکونکي په توگه د گلابو د مصنوعي تیلو په نوم پکارېږي.

د دې لړۍ بل استازی - فینایل پروپانول يا γ - فینایل پروپایل الکول دی، چې دا هم د سنبل گلونو ته ورته بوی لري. په طبیعت کې په ايسټري ډول ځينو ښه بوی لرونکو تیلونو کې پیدا کېږي او په عطر جوړولو کې ور څخه کار اخیستل کېږي.

په همدې ډول بايد ووايو چې د دې لړۍ غیر مشبوع اروماتیک الکولونه هم د پام وړ ترکیبونه چې په طبیعت کې هم پیدا کېږي او ځينې ئې د ساري په توگه په لاندې ډول د اړوند الډيهايد څخه د ارجاعي عمل په پايله کې تر لاسه کوي.




لازمه ده چې په پام کې وگرځو چې داسې ترکیبونه چې په پورتنیو موادو پورې اړوند خو په همدې ډول چې فینولي ګروپ لري، اروماتیک الکول هم دی او هغوی د فینول الکولونو په نومونو سره یادېږي. هغوی په طبیعت کې هم پیدا کېږي او نامتو استازی ئې ۲- اوکسي میتایل فینول چې د سالګنین په نوم سره هم یادېږي پیدا کېږي. دا ماده د لګنین د جوړېدو اساسي ماده ګڼل کېږي نو ځکه د ونو په جوړښت کې اساسي برخه ده. له پورتنۍ مادې سره سم د کانفییریل الکول بل دا ډول ترکیب هم په ونو کې پیدا کېږي، د هغوی دواړو کیمیاوي فورمولونه لاندې ډول دي.




اروماتیک امینونه

اروماتیک امینونه د پارافیني امینونو په څېر د امونیا له مشتقاتو څخه شمېرل کېږي. دا هم جوته ده چې امیني ګروپ نیغ په نېغه په کرۍ او یا هم د اړخ ځنځیر په کاربني اتوم پورې نښلېدای شي. دا ډله امینونه هم په لومړنیو، دوهمو او دریمو امینونو سره وېشل کېږي. دلته هغه امینونه چې امیني ګروپ ئې نیغ په نېغه په اروماتیک کرۍ پورې نښتي وي د زیات پام وړ او د اروماتیک هایډروکاربنونو مشتقات ګڼل کېږي. د اروماتیک امینونو لومړۍ او د پام وړ ډله د هغه اړوند لومړني امینونه دي، د هغوي عمومي فورمول $Ar-NH_2$ دی. د ساري په توګه فینیل امین (انلین) چې فورمول ئې $C_6H_5NH_2$ او همدارنګه اورتو، میتا او پارا امینوتولوینونه چې د هغه فورمول هم $(CH_3-C_6H_4-NH_2)$ دی، د دې لړۍ غوره مثالونه ګڼل کېږي. د هغوی د لاسته راوړلو ځینې لارې چارې دا دي.

۱. د امونیا په مرسته د بنزیني کرۍ د نیغ په نېغه امینېشن څخه د مغلقو کتلتونو تر اغیزې لاندې په سختو او پېچلو شرایطو کې لاسته راځي. هغه کتلتونه چې دلته کارول کېدای شي د مولبدنیم، ولفرام او یا کروم مالګې، او همدارنګه د نکل او مس له اوکسایډونو څخه عبارت دي.




۲. د نیتروترکیبونو له ارجاع کولو څخه هم اروماتیک لومړني امینونه لاسته راځي.




د گوگړو یا مالګي اسید له اوسپنې سره دلته د ارجاع کوونکي په توګه پکارېدای شي.

همدارنګه کولای شو قلعي د مالګي له اسید سره، هایډروجن سلفایټونه، هایډروجن سلفایډ له قلوي فلزاتو سره او په همدې ډول د ارجاعي عمل د کتلستي او الکتروکیمیاوي میتودونو په مرسته سرته ورسوو.

۳. اروماتیک امینونه همدارنګه د اروماتیکي بهیر هلوځني مشتقاتو څخه له امونیا سره لاسته راځي.





۴. دا ډله امینونه له عضوي اسیدونو څخه هم لاسته راتلای شي خو هغه لومړی په امید بدل او بیا ور څخه دا ترکیبونه لاسته راځي.




دوهمې امینونه بیا لاندې ډول لاسته راتلای شي، خو له هر څه دمخه باید ووایو چې د دې امینونو فورمول (Ar_2NH) دی خو د اروماتیک – پارافینی امینونو فورمول بیا ($\text{Ar} - \text{NH} - \text{Alk}$) دی د ساري په توګه دای فینایل امین ($(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{NH}$) میتایل فینایل انلین د $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NH} - \text{CH}_3$ فورمول لرونکي دي.


۱. دا امینونه (دوهمې پارافینی اروماتیک امینونه) د اړوندو هلوځني مشتقاتو یا الکولونو په مرسته د لومړنیو اروماتیک امینونو له الکایلېشن څخه لاسته راځي. په صنعت کې دغه الکایلېشن د الکولونو په مرسته د اسیدونو په شته والی کې په همدې ډول دریمې اړوند امینونه هم ور سره یو ځای لاسته راځي.




که و غواړو د پورتنی تعامل له مخې خالص دوهمي امینونه لاسته راوړو نو بیا د امینونو د اسیلی مشتقاتو له الکایلیشن څخه ګټه اخلو چې له هغه څخه لاسته راغلي ترکیبونه هایدرولیز او بیا اړوند امینونه لاسته راځي.



۲. د ازومیتېنونو یا شیف قلوي نومي له هایدروجنېشن څخه هم دا ترکیبونه لاسته راتلای شي.





۳. که اروماتیک امینونه دخپلو اړوندو مالګو سره یوځای دتودوخي تراغیزې راولو نوبیا هم دوهمي اروماتیک امینونه لاسته راځي.



درېمي امینونه لکه $(C_6H_5)_3N$ چې یو خالص اروماتیکي امین دی د دې امینونو بڼه مثال ګڼل کېږي دای فینایل میتایل امین $(C_6H_5)_2NCH_3$ او دای میتایل انلین $(C_6H_5N(CH_3)_2)$ د پارافیني اروماتیک امینونو غوره مثالونه ګڼل کېږي.

دواړه پورتنی ډول امینونه د الکایلیشن یا ارایلیشن په پایله کې چې له دوهمو یا درېمي امینونو سره سرته رسېږي لاسته راتلای شي.




د اروماتیک امینونو خاصیتونه



دا لړۍ کیمیاوي ترکیبونه جامد یا مایع دی چې د خپلو اړوندو بدو بویونو لرونکي دي.

ډېر زهري او په اوبو کې بڼه نه حلېږي. هر څومره چې په دې ترکیبونو امینو گروپونه ورزیاتېږي په هم هغه اندازه ئې په اوبو کې انحلالیت زیاتوالی مومي. د کیمیاوي خاصیتونه له پلوه د هغوی تعاملات په امینو گروپ او اروماتیکي کړۍ پورې اړوند دي.



۱. دا ترکیبونه ډېر کم او مړاوی قلوي خاصیت لري او د یسوسیټني انفکاک ئې دپارافیني امینونو په پرتله ډېر کم دی.



۲. د پارافیني امینونو په څېر د دې بهیر لومړني او دوهمي امینونه د دې وړتیا لري چې د امیني گروپ هایډروجن په الکایلي گروپ بدل کړي دا میتود د دوهمي او دریمي امینونو د لاسته راوړلو لاره هم گڼل کېږي.




۳. د دوهمي او لومړنيو اروماتیک امینونو هایډروجنی اتومونه د اسیلی کونکو عاملونو تر اغېزې لاندې په اسیلی ټوټو بدلون موندلی شي. د ساري په توگه د دې ډول تعامل په پایله کې د اسیت انهایډرایډ او یا د تودوخي تر اغېزې لاندې د استیک اسید په مرسته انلین په اسیت انلید بدلېږي.




د امینونو اسیلی مشتقات کرسټلي ترکیبونه دی، هغوی داسې امید اسیدونه دي چې قلوي خاصیتونه نلري. اسیلی امیدونه داسې ثابت ترکیبونه دي چې په آسانه توگه نه آکسیدېشن کېږي او یوازې د امینونو د آکسیدېشن په مهال د منځنیو موادو په څېر رول لوبوي.


۴. که لومړني اروماتیک امینونه یو لږ څه له اروماتیک الډیهایډونو سره تاوده کړو نو بیا په آسانه توگه د شیف قلوي یا ازومیتېنونه لاسته راځي.



که په لاسته راغلي ترکیب رقیق اسید ور زیات کړو نو هغه بیا په الډیهایډ او امین سره ټوټې کېږي.




۵. که لومړني اروماتیک امینونه: له کلوروفورم او د قلوې له الکولي محلول سره توده کړو. کاربایل امایدونه او یا ایزوسیاناتیدونه چې زړه بدوونکی ډیرزیات بډی لري لاسته راځي.




دا تعامل د لومړنیو امینونو د پېرندني د پاره پکارېږي.

۶. د نایترس اسید تر اغېزې لاندې د اروماتیک لومړنیو امینونو څخه په اسیدي چاپېریال کې د دای ازون مالګې لاسته راځي چې د ډېر چټک کیمیاوي تعامل لرونکي دي.



دا هم باید په یاد ولرو چې پارافیني امینونه هم په پورتنی تعامل کې ګډون کولای شي خو د دغه تعامل په پایله کې بیا الکولونه، ایترونه او داسې نور ترکیبونه منځته راځي.




په همدې ډول دوهمي اروماتیک امینونه هم تعامل سرته رسوي خو بیا دلته نیټرو زو امینونه لاسته راځي.



میتایل-N-نیټروزوانلین


دریمي اروماتیک امینونه له نایټریس اسید سره په یخني کې تعامل سرته رسولای شي او بیا نو پارانیټروزو ترکیبونه لاسته راځي، خو دریمي پارافیني امینونه په دې شرایطو کې مالګې جوړوي.



پارانیټروزو دایمیتایل انلین

که په پورتنی تعامل کې د پارا موقعیت تش نوي نو بیا نیټرو زوګروپ د اورتنو موقعیت ځانته اختیاريوي. لاسته راغلي پارانیټرو زو دای میتایل انلین د قلویاتو تر اغېزې لاندې په آساني سره په نیټروزوفینول او دوهمي امین ټوټې کېږي. دا


تعامل د ځانگړو پارافيني دوهمي امينونو د لاسته راوړلو لپاره ښه لاره گڼل شوي ده.




۷. د پارافيني امينونو سره په توپير اروماتيک امينونه په آساني سره اوکسايډ کېږي نو ځکه که هغوی د زيات وخت د پاره وساتل شي يو ځانگړی رنگ ځانته اختياري. دا هم روښانه ده چې که انلين په اسيدې چاپېريال کې اوکسايډ شي کينون لاسته راځي.

دا هم بايد ووايو چې که انلين د کرومیک اسيد په مرسته اوکسايډ کړو نو بيا دلته يو تور رنگ چې انليني تور رنگ ورته وائي جوړېږي.



که اروماتيک امينونه د ترای فلورو اسيتايل هايډرو پراوکسايډ په مرسته اوکسايډ کړو، نو دلته بيا اړوند نيترو ترکيبونه رامنځته کېږي او دا تعامل به له کومې ستونزې ښه سرته رسېږي.




۸. په الکتروفيلي تعاملاتو کې انلين او نور اروماتيک امينونه په آساني سره گډون کوي او په عمومي ډول دلته د پارا موقعيت ترکيبونه منځته راځي. د آزاد هلوجن په مرسته د انلين له هلوجنېشن څخه ډول ډول اړوند تعويضي ترکيبونه جوړېږي او بيا اوکسيډېشن کېږي نو ځکه ويلاى شو چې د آزاد هلوجنې اتوم په مرسته په عام ډول خپله امين نه هلوجنېشن کېږي او په دې مانا چې د هغه اړوند اسيلي مشتقات تر هلوجنېشن لاندې راځي.




خو دا هم بايد په ياد ولرو چې د هلوجن اميدونو په مرسته کولای شو د امينونو نيغ په ښه هلوجنېشن سرته ورسوو او دلته کولای شو چې هم هغه يو ډول يا دوه ډول ډول هلوجنې اتومونه ماليکول ته داخل کړو.





د پورتنیو ځانگړتیاوو په پام کې لرلو سره که دا امینونه نایتریشن شي نو له هر څه د مخه پارایزومیرونه جوړېږي خو د دې لپاره چې دلته نایتریشن عمل په بڼه توګه ترسره شي نو له هر څه د مخه هغوی اسټېبلېشن کوي او بیا لاسته راغلي نیټرو اسټېلېډونه هایدرولیز او په دې ډول نیټرو امینونه جوړېږي.




د سلفیوریشن عمل په پایله کې هم په همدې ډول اړوند پارایزومیر لاسته راځي.




۹. د کمزورو الکتروفیلی ترکیبونو لکه الډهایډونو سره هم دا امینونه تعامل سرته رسوي او دا هم یو کاندېنسېشن تعامل ګڼل کېږي چې په پایله کې یې د پارایزومیرونو ډای او تراي فینایل میتان اړوند ترکیبونه هغه وخت جوړېږي چې په دې تعامل کې دریمي اروماتیک امینونه برخه واخلي.



۱۰. کېدای شي چې ځانګړي اتومونه او ګروپونه په آساني سره نور هم په کړۍ پورې ونښلي. د ساري په توګه که د مالګي اسيد دای میتایل انلیني مالګه د فشار او تودوخې تر اغېزې لاندې راولو نو د دغه عمل په پایله کې د پاراتولوئیدین، کسایلیدین او مېزیدین ګډوله منځته راځي.




۱۱. که د نکل په شتوالي کې انلین هایدروجنېشن کړو نو بیا سکو هکزايل امین جوړېږي. خو دا هم باید وویل شي چې په دې تعامل کې همدا ډول له پورتنۍ ترکیب سره یو ځای د امینو ګروپ د توتې کېدو له امله بنزین، سکو هکزان او امونیا هم منځته راځي.



انلین د دې لړۍ خورا مهم استازی ګڼل کېږي یو اوبلن ډول ترکیب دی چې په (182°C) سره په اېشېدو راځي او د ویلېکېدو تودوخه ئې د سانتي ګراد (۶) درجې ده، هغه په اوبو کې حلېږي او یو تیل ډوله مخلوط جوړوي. انلین ډېر زهري ترکیب دی چې زیات وخت وساتل شي نو رنګ ئې هم ټینګېږي. د کلورینې شورې تر اغېزې لاندې سوسنې رنګ جوړوي. انلین د لومړي ځل لپاره په (۸۲۶ کال کې) د چوني او نیل له تقطیر کولو څخه لاسته راغلي او یو څه د ډېرو سکارو په قیر ډوله ماده کې هم طبیعتاً پیدا کېږي. په صنعت کې انلین د مسي یا نکلي کنلستونه په شتوالي کې د نیټرو بنزین له ارجاع څخه چې د براس په ډول وي د هایدروجن سره لاسته راځي. همدارنګه انلین په صنایعو کې یو څه د هغو پلاستيکي موادو د رنګ ساتلو لپاره پکارېږي چې د هغوی فزیکي خاصیتونه باید وساتل شي، هغه همدارنګه په رنګونو او درملې موادو کې هم پکارېږي.

د دې لړۍ بل د پام وړ ترکیب دای میتایل انلین دی، هغه هم مایع یا اوبلن ترکیب دی چې په 193°C سره په اېشېدو راځي. له هغه څخه د ځینو رنګونو او همدارنګه د ځینې چاودېدونکو موادو په لاسته راوړلو کې کار اخلي. دای فینایل امین همدارنګه بل داسې ترکیب دی چې کرسټلي او په 54°C سره ویلي کېږي. له دغه جامد استازی څخه هم د رنګونو د جوړولو په صنایعو کې


کار اخیستل کېږي. پاراتولوئیدین هم د دې لړۍ یو جامد ترکیب دی خو نور ایزومرونه مایع فزیکي حالت لري، د رنګونو په صنایعو او په ځانګړې توګه د فوکسین د لاسته راوړلو لپاره ور څخه کار اخیستل کېږي. باید په یاد ولرو چې داسې نور پورتنی ډوله ترکیبونه شته چې هلوځني، نیټرو او سولفو تعویضي امینونه دي چې په صنایعو کې د هغوی د اهمیت په اړوند ډېرې خبرې کېږي د ساری په توګه سوسان چې د پارا نیټرو انلین یو مشتق شمېرل کېږي فورمول ئې:




دی او د بورې په پرتله هغه ۳۵۰ ځله خوړ دی.

امینو فینولونه


له دې ترکیبونو څخه د کیمیا په لابراتوارونو کې زیات کار اخیستل کېږي. د دې ترکیبونو د لاسته راوړلو لپاره لومړۍ بڼه لاره دا ده چې هغوی د اړوندو نیټروفینولونو د ارجاع کولو له لارې لاسته راوړل شي. د ارجاع کولو دا عمل په قلوې محلول کې د پودري زنک او یا دای تیونات په شتوالي کې ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$) په بڼه توګه سرته رسېدلای شي.




په همدې ډول کولای شو د دوه اتومه فینولونو او امونیا له تعامل څخه هم دا ترکیبونه لاسته راوړو (د میتا ترکیبونو تعاملات په بڼه توګه دلته سرته رسېږي).



په صنعت کې پارا امینوفینول د ګاټه سلفیوريک په شتوالی کې د نیټرو فینول له الکترولیټي ارجاع څخه لاسته راوړي. دلته لاسته راغلی فینایل هایډروکاسیل امین د ګروپي بدلون په پایله کې په پارامینو فینول بدلېږي.




دا هم باید وویل شي چې د امینو فینولونو د لاسته راوړلو ډېره بڼه او مناسبه لاره په لابراتوارونو کې د هایډروکسي ازوترکیبونو د ارجاع لاره ده چې په دې تعامل کې بنودل کېږي.




امینوفینولونه جامد کرسټلي ترکیبونه دي، هغوی بېرنگه او په اوبو کې حلېږي. دا چې امینوفینولونه دوه فعال فنګشنې ګروپونه لري ځینې تعاملات په لاندې ډول په بڼه توګه سرته رسولای شي.


۱. امینوفینولونه له اسیډونو او فینولاتونو سره تعامل کوي او دا تعامل په قلوي چاپیریال کې داسې سرته رسېږي چې که له اسیډ سره ئې تعامل په پام کې ولرو نو به دلته تعامل دوه ګونۍ (امفوتیري) خاصیت را څرګند کړي.




۲. امینوفینولونه ځواکمن ارجاع کوونکي دي نو ځکه په فوتوګراپي کې ور څخه کار اخیستل کېږي.



۳. اورتو امینوفینولونه د ډول ډول ترکیبونو سره تعامل کوي او په زړه پورې یو شمېر هتروسکلیک ترکیبونه جوړوي. د ساري په توګه د هغوی تعاملات له اسیت انهایډرایډ او فوسجین سره دا ډول ترکیبونه رامنځته کوي.






امینوفینولونه هم د رنگونو او درملې ترکیبونو د لاسته راوړلو په صنایعو او همدارنگه په فتوگرافي کې ور څخه کار اخیستل کېږي. په یاد باید ولرو چې هغه امینوفینولونه چې امیني ګروپ ئې په اړخ پورې نښتي ځنځیر کې ځای لري د پام وړ ترکیبونه چې د درملې موادو په جوړولو کې پکارېږي، بلل کېږي.


په اروماتیک ترکیبونو پورې تړلي د پام وړ بل ګروپ ترکیبونه د ازو او دای ازو ترکیبونه دي چې د پروګرام د کموالي له امله د هغوی کتنه او څېړنه نکوو.

اروماتیک الډهایډونه او کیتونونه

دا هغه ترکیبونه دي چې د کاربونیل $\left(\overset{\text{O}}{\underset{\text{H}}{\text{C}}} = \text{O} \right)$ ګروپ لرونکي او پارافینی

الډهایډونو او کیتونونو ته ورته دي. دلته کیدای شي چې نوموړی ګروپ یا داچې په بنزیني کړۍ پورې نېغ په نېغه نښتی او یا دا چې د کړۍ د اړخ په ځنځیر کې ځای ولري. د هغوی نوم اېښودنه د رواجي پخوانۍ نوم اېښودنې پر بنسټ ولاړه ده چې د کړۍ د نورو ګروپونو د څرنگوالي په پام کې لرلو سره سرته رسېږي. ځینې غوره مثالونه ئې دا دي:






۴- میتوکسی - ۴- دای میتایل امینوبنزوفینون

د خاصیتونو له مخې هم دا گروپ ترکیبونه پارافیني الیهایدونو او کیتونونو ته ورته والی لري خو بیا هم دا څرگند حقیقت دی چې په دې خاصیتونو کې به هغوی ځینې ځانګړتیاوې هم لري. له بلې خوا دا هم ټولو ته جوته ده چې د اروماتیک الیهایدونو او کیتونونو د لاسته راوړلو لارې چارې پارافیني الیهایدونو او کیتونونو ته ورته والی لري او لکه چې مخکې مو وویل بیا هم دا خبره د پام وړ ده چې ځینې ځانګړتیاوې دلته هم زیات اهمیت لري.


۱. د هایدروکاربنونو د اکسیدیشن له لارې د الیهایدونو لاسته راوړل: دا د دې الیهایدونو، په تېره بیا د بنزالیهاید لاسته راوړل یوه ډېره پخوانۍ لابراتواري لاره ګڼل کېږي. د ځینې کتلستونو لکه ونادیم، مولبدنیم او داسې نورو اوکسایدونو په شتوالي کې د امونیم نایترایټ تر اغېزې لاندې د هوا د اکسیجن په مرسته دا الیهایدونه لاسته راوړل کېدای شي.



۲. د هیمي نال دای هلوځنه هایدروکاربنې مشتقاتو له هایدرولیز څخه هم دا ترکیبونه لاسته راتلای شي، که ټولین د کلورینیشن له لارې په بنزایل کلوراید بدل او هایدرولیز شي نو اړوند الیهاید لاسته راځي.




کېدای شي چې که بنزایل کلوراید ډوله هلوځني مشتقات هایدرولیز او اکسیدیشن شي. د ساري په توګه که د پلامب نایتریت اوبلن محلول او یا هم د مسو د نایتریت اوبلن محلول له پورتنۍ هلوځني مشتق سره یو ځای شي نو په لاندې ډول اړوند الیهاید لاسته راځي.




۳. کېدای شي چې داسې میتود وکارول شي چې د هغې په مرسته الډیهایډي فنګشنې ګروپ نېغ په نېغه اروماتیک کړی ته ور ننوزي او اروماتیک الډیهایدونه لاسته راشي، دا د لاسته راوړلو ځانګړې لاره ګڼل کېږي چې بیا د هغه په مرسته پارافیني بهیر الډیهایدونه لاسته نه راتلل.


که د $AlCl_3^+ Cu_2Cl_2$ کتلست او یا یوازې د $AlCl_3$ کتلست تر اغېزې لاندې (خو په یو څه فشار) اروماتیک هایډروکاربنونه د HCl او کاربن مونو اوکساید سره تعامل وکړي، نو بیا دا بهیر الډیهایدونه تر لاسه کېدای شي. دا هم باید په یاد ولرو چې په دې تعامل کې د بنزین مشتقات د خپله بنزین په پرتله په دې تعامل کې په ښه توګه ګډون کوي.



د فریدل کرفتس د تعامل پر بنسټ کولای شو په پورته ډول الډیهایډي ګروپ، اروماتیک کړی ته داخل کړو، په دې ډول چې اروماتیک هایډروکاربن دلته له دای کلورمیتایل اېتر سره د کتلست په شتوالي کې تعامل په لاندې ډول سرته رسوي.




۴. د کلورانهایډرایډونو د ارجاع کولو څخه د نکلي یا پلادیمي کتلستونو په شتوالي کې دا ترکیبونه لاسته راتلای شي. دا چې د پورتنۍ ډوله اسیدي مشتقاتو له لارې دا اروماتیک ترکیبونه لاسته راوړل کېدای شي په لابراتواري کارونو کې هغه د ډېر زیات اهمیت وړ ګڼل کېږي.




دا چې دا الډیهایدونه هم د ځینې لارو چارو په مرسته د پارافیني بهیر الډیهایدونو په څېر لاسته راتلای شي، لکه د لومړنیو الکولونو آکسیدېشن د مګنیزیم اړوند عضوي ترکیبونو په مرسته د هغوی لاسته راوړل او داسې نور، داسې میتودونه دي چې د دواړو لړیو د الډیهایدونو د لاسته راوړلو لپاره پکارېږي او هغه د دوی د لاسته راوړلو ګډ او شریک میتودونه شمېرل کېږي.

اروماتیک الډیهایدونه چې زیات شمېر ئې په اوبو کې نه حل کېدونکي دي د ترخو بادامو په څېر بوی لري. هغه الډیهایدونه چې د اروماتیک کړی څخه جلا الډیهایډي ګروپ لري د بویونو تیزوالی ئې زیات دی. اروماتیک الډیهایدونه د پارافیني بهیر الډیهایدونو په څېر کیمیاوي تعاملات سرته رسوي. هغوی د سپینو زرو د اوکساید په مرسته په عضوي اړوندو اسیدونو سره چې د کاربنی اتومونو





۳. د کنیزارو د تعامل پر بنسټ د قلوي محلول سره په اوبو یا الکولو کې اروماتیک الديهایدونه خپل اړوند الکولونه او یا اسیدونه جوړوي.




که د تودوخې تر اغېزې لاندې اروماتیک الديهاید له فارم الديهاید سره د سودیم هایدروکساید د ګاټه محلول په شتوالي کې تعامل وکړي نو بیا دلته اروماتیک الديهاید بيخي ټول په خپل اړوند الکول ارجاع کېږي په داسې حال کې چې فارم الديهاید په فارمیک اسید آکسیدیشن کېږي.




۴. اروماتیک الديهایدونه په آساني سره له اليفاتيک الديهایدونو، کيتونونو، ايسټرونو او انهایدراسيدونو سره کاندنسيشنې تعاملات سرته رسوي:




۵. د رنگونو په صنايعو کې د اروماتیک الديهایدونو تعامل له فينولونو سره د زيات اهميت وړ ګڼل کېږي. د ساري په توګه د ترای فينايل ميتاني بهير د رنگونو تعاملات:




۶. کلورین کولای شي له بنزالدیهاید سره تعامل وکړي او بنزوئیک اسید کلورانهایدراید جوړ کړي.



۷. په الکتروفیلی تعاملاتو کې الیهایدی گروپ را منځته شوی تعویضي د میتا موقعیت ته لوری ورکوي د ساري په توګه که بنزالدیهاید نایترېشن کړو نو بیا میتانیتروبنزالدیهاید جوړېږي.



د اروماتیک الیهایدونو مهم استازی بنزالدیهاید دی، هغه مایع ترکیب او د ترخو بادامو بوی لرونکی دی، د اېشېدو تودوخه ئې د سانتي ګراد ۱۷۹ درجې ده، دا الیهاید په هوا کې ژر اوکساید او په بنزوئیک اسید بدلېږي، نو ځکه هغه په داسې بوتلونو کې ساتي چې تر خولې ډک او سر پوښ ئې ډېر کلک تړلی وي چې هوا ورننه نه وزي. په طبیعت کې بنزالدیهاید د امیګدالین ګلايکو زید په توګه د ترخو بادامو په تیلو کې او همدارنګه دا الیهاید د شفتالانو، زردآلو او سرکیو او آلو د مندکو په پوستکو یا پوټکو کې پیدا کېږي. د انزایم تر اغېزې لاندې امیګدالین په بنزالدیهاید، سیانیک اسید او داي سکرایډ سره بدلېږي.




له بنزالدیهاید څخه د رنګونو او عطرونو په صنایعو کې زیات کار اخیستل کېږي خو دا هم باید په یاد ولرو چې د عطرونو د جوړولو په صنایعو کې له سینامیک ($\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}=\text{CH}-\text{CHO}$) الیهاید څخه هم زیات کار اخیستل کېږي.

هېر مو نشي چي ځيني داسي اروماتيك الديهايدونه شته چي په الديهايدي گروپ
برسېره په بنزيني كړۍ پورې نور تعويضي گان لكه هايډروكساييل او داسي نور
گروپونه هم نېغ په نېغه نښتي وي، لكه هايډروكساييل الديهايدونه او داسي نور.


اروماتیک کیتونونه

لکه مخکېني مو چې وویل دا ترکیبونه هم خپلو اړوندو پارافیني ترکیبونو ته ورته والی لري دهغوی د نوم اېښودنې په هکله مو هم یو څه څرگندونې وکړې او مثالونه مو وړاندې کړل. په همدې ډول د هغوی د لاسته راوړلو لارې چارې هم په هغه ډول دي، د ساري په توګه د دوهمي اروماتیک الکولونو له آکسیدیشن څخه اړوند کیتونونه لاسته راځي.




په همدې ډول په پورتنیو لاروچارو بر سېره ځینې ځانګړي میتودونه شته چې د هغوی په مرسته دا ترکیبونه لاسته راوړل کېږي.


۱. د فرید لکرفتس د تعامل پر بنسټ چې د دغه کیتونونو اساسي لاره ګڼل کېږي. د لاندې تعامل له مخې هغوی لاسته راوړل کېږي او لیدل کېږي چې د المونیم کلوراید تر اغېزې لاندې د ایتایل کلوراید څخه فینایل میتایل کیتون لاسته راځي.



۲. غیر مشبوع اروماتیک کیتونونه د اروماتیک الډهایډونو او پارافیني کیتونونو له کنډنسیشن څخه لاسته راځي.





کېدای شي چې د هایدروکسایل ګروپ لرونکي کیتونونه یا نې اوکسي کیتونونه د غیر کیتوني ترکیبونو د ایزومرایزېشن په مرسته لاسته راشي.




اروماتیک کیتونونه مایع یا جامد ترکیبونه دي چې د ګلانو په شان ښه بویونه لري، دا کیتونونه په اوبو کې نه حلېږي.

اروماتیک کیتونونه په چټکتیا سره په تعاملاتو کې ګډون نکوي نو ځکه هغوی د کیمیاوي خاصیتونو له مخې د پارافیني کیتونونو (چې له اروماتیک کیتونونو


څخه فعال کيمياوي ترکيبونه دي) زيات توپير لري. د ساري په توگه اروماتیک کيتونونه له سوديم باي سلفايت سره تعامل نکوي. د اروماتیک کيتونونو زيات شمېر له هايډروکساييل امين او هايډرازيني مشتقاتو سره تعامل کوي او اړوند ترکيبونه جوړوي.




د تعامل په بيلابېلو حالتونو او شرايطو کې له اروماتیک کيتونونو سره هايډروجن تعامل کوي او په پايله کې ډول ډول کيمياوي مواد جوړېږي. هغه کيتونونه چې کاربونيلي گروپ ئې په ∞ - موقعيت کې خای ولري او تر کتلستي هايډروجنېشن لاندې راشي نو د دا ډول هايډروجنېشن په پايله کې هايډروکاربنونه لاسته راځي.



که دا الډيهايدونه يا کيتونونه د زنک (Zn) له املگم سره د HCl په اوبلن محلول کې د تودوخي تر اغېزې لاندې راولو نو دلته بيا هم هايډروکاربنونه لاسته راځي. که له قلوي فلزاتو سره په اپروتوني چاپيريال کې کيتونونه ارجاع کړو نو بيا پيناکونونه لاسته راځي.




دا هم بايد ووايو چې اروماتیک کيتونونه د سوديم اميد تر اغېزې لاندې په لاندې ډول تجزيه کېږي.



د اروماتیک کيتونونو خورا غوره استازی اسيتوفينون دی، هغه په ۲۰ درجو سره ويلې کېږي او د سانتي گراد په ۲۰۲ درجو سره په اېشېډو پيل کوي. دا د

پام وړ ترکیب د ډبرو سکارو په قیر ډوله ماده کی پیدا کېږي، خو په صنعت کې هغه اوس د ایتایل بنزین له کتلستي آکسیدیشن څخه چې د هوا آکسیجن په مرسته سرته رسېږي په لاس راوړي.




له اسیتو فینون څخه د عطرونو د جوړولو په صنایعو کې کار اخیستل کېږي. په همدې ډول بنزوفینون هم د دې لړۍ یو داسې ترکیب دی چې په عطر جوړولو کې وړ څخه کار اخیستل کېږي.

کینونونه

دا یو ګروپ ځانګړي کړیوال کاربونيلي ترکیبونه دي او دا هم باید وویل شي چې هغه پوره کټ مټ اروماتیک ترکیبونه هم نه شمېرل کېږي، په دې مانا چې د کینونونو هسته اروماتیک خاصیت نلري، د دې سره سره کینونونه بیا هم په آساني سره د اروماتیک ترکیبونو څخه لاسته راځي او په همدې ډول د هغوی په کړۍ کې په بېلابېلو تعاملاتو کې هغه ډول بدلونونه سرته رسېږي کوم چې اروماتیک ترکیبونو ته ورته والی لري. اورتو او پارا کینونونه د هغوی غوره استازي دي چې د هغوی جوړښت د غیر مشبوع الي سکلیک ډای کینونونو غوندې دی.


د دې ترکیبونو (O=C1C=CC(=O)C=C1 ، O=C1C=CC(=O)C=C1) تعویضي اړوند مرکبات د پېښونو په څېر په طبیعت کې په ځینې بوټو کې پیدا کېږي په همدې ډول هغوی په بکتریاګانو او مرخړیو کې هم طبیعتاً پیدا کېږي. دا ترکیبونه د اورتو او پارا دوه تعویضه بنزیني ترکیبونو له آکسیدېشن څخه لاسته راځي خو دا هم باید ووايو چې تعویضي دلته هایدروکسي یا امینو ګروپونه دي. پاراکینون د آکسیدېشن په دغه عملیه کې ژر جوړېږي، دا ځکه چې هغه یو څه زیات ثابت ترکیب دی. اورتو کینون دلته د اوبو په نشتوالي کې ښه په لاس راځي. که امینونه آکسیدېشن شي نو د منځنیو ترکیبونو په توګه کینونیمینونه لاسته راځي.




د پورتنۍ تعامل پر بنسټ د هایدروکینون څخه پارا کینون په آسانه توګه لاسته راځي.

په صنعت کې بيا د انلين څخه د آکسيډېشنې عمل په مرسته پارا بنزوکينون په آساني سره لاسته راځي خو دا تعامل د کرومیک اسيد په مرسته چې د آکسيډېشنې عامل په توګه پکارېږي سرته رسېږي. کينونونه کرسټلي ترکيبونه دي چې د ډېر تېز رنگ لرونکي مرکبات ګڼل کېږي. پاراکينونونه زېړ رنگ، اورتوکينونه نارنجي او يا سور رنگ لري، د اوبو د پراس په مرسته ژر په ژره د پراس په توګه بدلېږي. داترکيبونه له فينول سره روښانه رنگونه جوړوي. کينونونه په عام ډول په هغو تعاملاتو کې ګډون کوي کوم چې د کيتونونو لپاره ځانګړي دي.


۱. د مالګې اسيد په مرسته د هايډروکساييل امين او پارا بنزوکينون له تعامل څخه مونو او ډای اوکسيمونه لاسته راځي چې بيا هغوی خپل توتوميري حالتونه هم په ښه توګه څرګندوي.




۲. کينونونه له برومين سره تعامل کوي او د هغه اړوند تعويضي کينون منځته راځي.






۳. کينونونه په آسانه توګه په ډای يني تعامل کې په لاندي ډول ګډون کوي.



له پورتنی تعامل څخه د رنگونو او درملونو د جوړولو په چارو کې ډېر کار اخیستل کېږي. کینونونه په همدې ډول په آسانه توګه هایډروجنېشن کېږي او پدې ډول له هغوی څخه اړوند هایډروکینونونه لاسته راځي.




۴. هایډروهلوجنونه هم د هایډروجن په څېر او همدارنګه په لاندې ډول د نورو داسې ترکیبونو سره تعاملات سرته رسولای شي.



پارابنزوکینون د کینونونو د ډلې خورا مهم کینون ګڼل کېږي، هغه طلايي ژېړ رنگه ترکیب دی چې د سانتي ګراد په ۱۶۶ درجو سره ویلي کېږي. له دغه


ترکیب څخه زیات وخت هایډروکینون لاسته راوړي. د هغه اړوند یو مهم ترکیب




ډاکسیدیشن کوونکي په توګه پکارول کېږي . په همدې ډول پاراتولوکینون چې مېټینون نومېږي د ویتامین (K_3) په سنتیز کې پکارېږي. د یادونې وړ ده چې د دې لړۍ ځینې ترکیبونه په طبیعت کې هم پیدا کېږي چې د درملې او رنګه ترکیبونو په توګه د پکارولو وړ ګڼل شوي دي.

اروماتيک عضوي اسيدونه


اروماتيک عضوي اسيدونه د بنزين هغه مشتقات دي چې کاربوکسيل گروپ نېغ په نېغه په بنزيني کړۍ پورې تړلی وي. هغه اسيدونه چې پکې بيا د کاربوکسيل گروپ د هغوی په څنګ پورې تړلي ځنځير پورې نښتې وي د اليفاتیک پارافيني – اروماتيک اسيدونو په نوم سره يادېږي. دا اسيدونه هم د کاربوکسيل گروپ د شمېر له مخې په يوه، دوه او څو اساسه اسيدونو سره بېلېږي. هغه اسيدونه چې کاربوکسيل گروپ يا گروپونه ئې نېغ په نېغه په بنزيني کړۍ پورې تړلی وي دهغوی نوم اېښودنه هم د اړوندو اروماتيک هايډروکاربنونو پر بنسټ ولاړه ده، خو که کاربوکسيل گروپ، په څنګ پورې تړلي پارافيني ځنځير کې ځای ولري نو بيا د هغوی نوم اېښودنه د پارافيني بهير د اړوندو اسيدونو له مخې سرته رسېږي. د لاندې مثالونو په مرسته ددې ترکيبونو نوم اېښودنه په ښه توګه څېړل کېدای شي.




بنزويک اسيد




ميټا ټولويک اسيد




ساليسيلک اسيد
(اورتو هايډروکسي بنزويک اسيد)




انيسک اسيد
(پارامتوکسي بنزويک اسيد)




فتالديهايډيک اسيد
(اورتوفارمايل بنزويک اسيد)




انترانیلیک اسید
(اورتو آمینو بنزوئیک اسید)




تیری فتالیک اسید (1،4- بنزین
دای کاربوکسیلیک اسید)




هیمی میلنیتیک اسید (1،2،3- بنزین
ترای کاربوکسیلیک اسید)



فینایل استیک اسید



میتایل فینایل استیک اسید
(2- فینایل پروپانوئیک اسید)




میلنیتیک اسید (1،2،3،4،5،6- بنزین
هکزاکاربوکسیلیک اسید)

د اروماتیک اسیدونو په زړه پورې برخه یو اساسه اروماتیک اسیدونه گڼل کېږي چې د ټولو هغو لارو چارو په مرسته چې پارافیني اسیدونه لاسته راځي، هغوی هم تر لاسه کېدای شي، نو ځکه د هغوی د لاسته راوړلو دا ډول ځیني لارې چارې په لاندې ډول تر کتنې لاندې نیسو.


دا هم باید په یاد ولرو چې موږ ته به هغه لارې چارې د زیات پام وړ وي چې ډېرې د کاروولو وړ او ځانګړې گڼل کېږي.

۱. د بنزین د هومولوگونو د الکایلي ګروپونو له آکسیدیشن څخه دا ترکیبونه لاسته راځي. د لاسته راوړلو دا لاره د اروماتیک اسیدونو لپاره یوه ډېره پکارونکې لاره گڼل کېږي.




د آکسیدېشن دا عملیه په قلوي چاپیریال کې د اړوند هایډروکاربن او پوتاشیم پرمنگنات تر منځ د اېشېدو په تودوخه او یا دا چې په تړلو تیوبونو کې د نایټریک اسید د رقیق محلول او اړوند هایډروکاربن تر منځ د تودوخي تر اغېزې لاندې لاسته راځي.

۲. د اروماتیک کیتونونو له آکسیدیشن څخه هم دا ترکیبونه لاسته راځي. دا هم باید ووايو چې دا آکسیدېشن د لاندې تعامل پر بنسټ د هایپو کلورایتونو په مرسته سرته رسېږي.




۳. د هغه درې هلوځنه مشتقاتو څخه د هایدرولیز له لارې چې درې واړه هلوځني اتومونه ئې په یوازې یوه کاربن اتم پورې نښتي وي هم دا لړ اسیدونه لاسته راتلای شي. د ساري په توګه که ټولین هلوځنیشن کړو نو بیا درې ډوله اړوند کلوریني مشتقات (بنزایل کلوراید، بنزیلیدیني کلوراید او بنزوترای کلوراید) لاسته راځي چې یوازې له بنزوترای کلوراید څخه د پورتنۍ یادې شوې لارې په مرسته بنزوئیک اسید لاسته راتلای شي.

۴. د نیټرویلونو له هایدرولیز څخه هم دا اسیدونه لاسته راتلای شي.




لکه څنګه چې څرګنده ده دا پورتنۍ میتود په پارافیني بهیر کې ډېر پکارېږي. په اروماتیک بهیر کې پکارول شوي نیټریلونه بیا د دای ازو ترکیبونو او یا د هلوځني مشتقاتو څخه چې پکې د مس سیاناید تعویض شوی او د پیریډین یا سولفاناتونو د مذابي په چاپیریال کې له پوتاشیم سیاناید سره لاسته راځي. پدې ترکیبونو کې چې د اسید نیټریل ګروپ د اړخ په ځنځیر کې ځای ولري نو بیا هغوی د اړوندو هلوځني مشتقاتو څخه د دغه لارې په مرسته لاسته راوړي.

۵. که اروماتیک هایدروکاربنونه د کاربونیکی اسید د هلوځني مشتقاتو سره تعامل وکړي نو بیا هم دا لړۍ ترکیبونه تر لاسه کېدای شي. د کاربوکسیل ګروپ په هسته پورې څنګ ته ځای نیولای شي، هغه د فریدل کرفټس د تعامل پر بنسټ د المونیم کلوراید تر اغېزې لاندې سرته رسېدای شي.




بنزایل کلوراید (کلورانهایدر بنزوئیک اسید)




میتایل بنزوآت (دبنزوئیک اسید میتایل ایستر)

د دې لپاره چې په پورته ډول تعاملاتو کې بنزوئیک اسید بېله کومې ستونزې څخه تر لاسه شي نو بیا بنزوئیک کلورایډ د تودوخې تر اغېزې لاندې د بنزوئیک اسید سره په بنزائیل کلورایډ بدلوو چې بیا وروسته هغه په آسانه توګه هایډرولیز او په پایله کې بنزوئیک اسید لاسته راځي.



۶. که فلزي عضوي ترکیبونه له کاربن ډای اوکسایډ سره تعامل وکړي نو بیا هم دا لړۍ ترکیبونه لاسته راځي.




په عام ډول په پورتنۍ تعامل کې لیتیمي یا مګنیزیمي عضوي ترکیبونه پکارول کېږي. یو اساسه عضوي اسیدونه چې د بنزین په کړۍ پورې اړوند دي، بیرنگه کرسټلي ترکیبونه او د ویلېکېډو تودوخې ئې د سانتي ګراد له سلو درجو څخه لوړې دي.


پارا ایزومیري اسیدونه د خپلو اړوندو ایزومیرونو په پرتله د ویلېکېډو لوړې تودوخې لري. د اړوندو پارافیني اسیدونو په پرتله هم دا اسیدونه د اېشېډو لوړې تودوخې لري، هغوی په یخو اوبو کې ښه نه حلېږي خو بیا په تودو اوبو کې ډېر ښه حلېږي. اروماتیک اسیدونه هم د پارافیني بهیر اسیدونو په څېر په ټولو هغو تعاملاتو کې ګډون کولای شي، کوم چې الیفاتیک اسیدونه ئې تر سره کوي. په دې اسیدونو کې هم ډکاربوکسایل ګروپ رول د زیات اهمیت وړ ګڼل کېږي.

۱. د دې اسیدونو له تعاملاتو څخه له فلویاتو او کاربوناتونو سره مالګې منځته راځي.


۲. د کاني اسیدونو (غیر عضوي اسیدونو) په تېره بیا د سلفوریک اسید تر اغېزې لاندې دا اسیدونه په تودوخه کې له الکولونو سره ایسترونه جوړوي.




۳. که تیانیل کلورایډ یا فوسفورس پنتا کلورایډ له اروماتیک اسیدونو سره تعامل وکړي نو بیا اړوند کلورانهایډرایډونه لاسته راځي.



۴. که د اروماتیک اسیدونو ګډوله د اسیت انهایدرايد سره د فوسفوریک اسید په شتوالی کې او یا د کلورانهایدرايد له تعامل څخه د اړوندو مالګو سره تعامل سرته ورسوي نو بیا په دواړو حالتونو کې انهایدرايد اسیدونه لاسته راځي.



۵. د بنزایل کلوراید او سودیم پراوکساید له تعامل څخه کرسټلي بنزائیل پراوکساید لاسته راځي.



د یو اساسه اروماتیک اسیدونو له ټولو غوره مثال بنزوئیک اسید دی چې په ځینو قیر ډوله طبیعي موادو کې پیدا کېږي. په ځانګړې توګه دا اسید په هغه طبیعي ماده کې چې د یو ډول خرما څخه لاسته راځي او د بنامار د وینو په نوم یادېږي شته والی لري. بنزوئیک اسید د ټولین له اکسیدېشن او د فتالیک اسید له دې کاربوکسیلېشن څخه په زیاته اندازه لاسته راځي. دا اسید بېرنگه پلاستیک ته ورته او یا د ستنو په شان جامد کیمیاوي ترکیب دی چې د سانتي ګراد په ۱۲۱،۵ درجو سره ویلي کېږي په داسې حال کې چې بیا د هغه د کرسټلو هایدريت د ویلېکېدو تودوخه یوازې د سانتي ګراد ۹۰ درجې ده. د رنګونو د جوړولو او د عطرونو دجوړولو او همدارنګه د کانسرو کولو په صنایعو کې زیات کار ور څخه اخیستل کېږي. دا چې هغه ښه انټي سپټیک یا مکروپ وژونکی خاصیت لري نو ځکه د خوراکی توکو دکانسرو کولو په چارو کې پکارېږي.


د بنزوئیک اسید خورا مهم مشتق د هغه کلورانهایدرا و یا بنزائیل کلوراید دی چې اوبلن ترکیب او ځانګړی بوی لري، دا ترکیب زیات اوبنګي بهوونکی خاصیت لري.

بنزائیل پراوکساید هم ځکه د زیاتي پاملرنې وړ د بنزوئیک اسید مشتق دی چې د پولیمیرایزیشن په تعامل کې د پیل کوونکي او مېتکر تعاملاتي ترکیب رول لوبوي. د ځینو خوراګي غوړو او ځیني اوړو د سپینوونکي په توګه هم پکارول کېږي.

ټولونیک اسید چې د میتایل بنزوئیک اسید په نوم یادېږي، د اورتنو، میتا او پارا کسایلونو د اکسیدېشن څخه لاسته راځي، په دې پورې اړوند ترکیب N, N-


دای ایتایل میتاتولین ایملد له دې امله چې د غوماشو پارونکي ماده ده د زیات اهمیت وړ ترکیب گڼل کېږي .

دهغه کیمیاوي فورمول $O=C-N(C_2H_5)_2$ دی.




داسې نور د دې لړۍ ځینې ترکیبونه هم شته چې په عطر جوړولوکي ور څخه کار اخیستل کېږي.

کېدای شي چې اروماتیک اسیدونه نامشروع هم وي او په همدې ډول باید په یاد ولرو چې څه نا څه سولفو بنزوئیک اسیدونه او فینول اسیدونه هم تر کتنې او څیړنې لاندې نیول شوي دي. په همدې ډول دای هایدروکسي عضوي اسیدونه او ترای هایدروکسي عضوي اسیدونه د کیمیا له مخې د اهمیت وړ ترکیبونه گڼل کېږي. د ساري په توگه دا ډول دوه هایدروکسي یو اساسه اسیدونه چې په طبیعت کې ډېر لیدل کېږي دهغه غوره مثال پروتوکتخینیک اسید دی، کرسټلي جامد ترکیب او له $FeCl_3$ سره زرغون نیلي رنګ جوړوي. دا اسید له اورتو هایدرو بنزوئیک اسید څخه د کلورینېشن تر عمليې لاندې لاسته راځي. د کلورینېشن څخه لاسته راغلی ترکیب بیا له KOH سره یو ځای او پورتنی نومول شوی ترکیب جوړېږي.




پروتوکتخینیک اسید

په همدې ډول د پیری گلول مشتقات چې د ترای هایدروکسي یو اساسه اسیدونو لویه برخه ده په طبیعت کې ډېر او غوره استازی ئې گالیک اسید دی چې هغه هم په هغو طبیعي موادو کې چې د دباغۍ په صنایعو کې ور څخه کار اخیستل کېږي پیدا کېږي او زیات دا ډول مواد هم د ځینې ونو او بوټو په پوتکو او پانو کې شته والی لري. هغه همدارنګه د پروتوکتخینیک اسید د هلوچني مشتقاتو له ویلېکېدو څخه د قلیاتو سره لاسه راځي.




گالیک اسید کرسټلي ترکیب دی او پیاوړی ارجاعي خاصیت لري. دا هم باید هېر نکړو چې اروماتیک امینو اسیدونه د اروماتیک ترکیبونو یوه د پام وړ بله برخه گڼل کېږي او هغوی هم د نورو ترکیبونو په شان چې امیني گروپ هم نېغ په نېغه په کړۍ او همدارنګه داړخ په ځنځیر پورې نښتی وي، چې هغوی د اړوندو نیترو ترکیبونو له ارجاع کولو څخه لاسته راځي. دهغه غوره مثال انترالیک اسید دی چې که اورتو نیتروتولون د گوګړو له اسید او یا د قلوې محلول سره یو ځای او بیا تر څه تودوخي لاندې ئې راولونو به هغه په لاندې ډول لاسته راشي.



څرګندېږي چې دا تعامل ارجاعي آکسیدېشنې تعامل دی.


انترانیلک اسید کرسټلي ترکیب دی چې په اوبو کې په آسانه توګه حلېږي او د راز راز رنگونو دجوړولو په چارو (په تېره بیا د نیل په جوړولو) کې ورڅخه کار اخیستل کېږي، د هغه میتایلي ایستر د ځینې گلانو لکه چانېلي او داسې نورو په غوړ ډوله موادو کې پیدا کېږي او د عطر جوړولو په صنایعو کې ور څخه کار اخیستل کېږي.

پارافیني بهیر ته ورته څو اساسه اروماتیک اسیدونه هم د عضوي اسیدونو مهمه برخه گڼل کېږي. د دې اسیدونو غوره مثالونه د فتالیک اسید په اورتو، میتا او پارا ایزومیرونو او همدارنګه په لاندې ډول څلور اساسه اسید په فورمولونو کې ښه څرګندېږي.



ڇو اساسه اسيدونه هم د يو، دوه اساسه اسيدونو په څېر لاسته راځي، خو دلته بايد چي دا شي په پام کي ولرو چي څو اساسه کوم اسيد لاسته راوړو نو ځکه په هغه شمېر د اړندو ترکيبونو اړوند فنګشنې گروپونه په دې پروسه کي ټاکل کېږي.

دوه اساسه اروماتيک اسيدونه کرسټلي جامد ترکيبونه دي چي په لوړو تودوخو ويلې کېږي. هغوی په اوبو کي (په تېره بيا تېرې فٽاليک اسيد) بڼه نه حلېږي. د دې اسيدونو کيمياوي خاصيتونو هم د يو اساسه اسيدونو په څېر دي او په همدې ډول درې اساسه اسيدونه هم هغوی ته ورته خاصيتونه لري. د دې لړۍ د زيات پام وړ ترکيب فٽاليک اسيد دی چي د نفتلين او همدارنګه د اورټوکسايلين له اوکسیديشن څخه لاسته راځي.






پورتنۍ ډول اکسیديشن د V_2O_5 تر اغېزې لاندې د هوا د اکسيجن په مرسته سرته رسېږي. فٽاليک اسيد د خپل اړوند فٽاليک انهايډرايد په توګه په صنايعو (په تېره بيا د رنگونو په صنايعو) کي پکارول کېږي. په فٽاليک اسيد او د هغه په انهايډرايد فٽاليک اسيد پورې تړلي زيات شمېر کيمياوي د اهميت وړ ترکيبونه شته چي ور څخه زيات کار اخيستل کېږي.


اروماتیک ترکیبونه چې د څو هغو بنزیني کړيو چې سره نښتي نوي لرونکي وي

د دې ترکیبونو خورا مهم استازی دای فینایل او د هغه اړوند مشتقات دي په همدې ډول زیات هغه شمېر ترکیبونه چې د الکانونو (په تېره بیا میتان) الکانونو او الکانونو ارایل تعویضي ترکیبونه بلل کېږي هم په دې ګروپ پورې اړه لري.



د دای فینایل ګروپ ترکیبونه چې د بنزین له پیرولیز څخه لاسته راځي د دې لړۍ خورا د اهمیت وړ ترکیبونه دي. که آیو د بنزین له سودیم یا مس سره یو ځای کړو او یا دا چې تالیم بروماید له مګنزیوم بروم بنزین سره تعامل وکړي نو دا ترکیب جوړېږي.





دای فینایل کرسټلي ترکیب دی چې په $(70^\circ C)$ ویلي کېږي او د اېشېدو تودوخه ئې د سانتي ګراد ۲۵۴ درجې ده. تر تودوخې لاندې بیا هم یو ثابت ترکیب دی چې په کیمیاوي تعاملاتو کې بنزین ته ورته والی لري. په صنایعو کې هغه د تودوخې ثابت ساتونکي او لېږدوونکي په توګه پکاروي. دا ترکیب د فورمول






له مخې د اور تو یا ۶,۲,۶,۲ میتا (M) ۵,۳,۵,۳ او یا هم p (پارا) یا ۴,۴ په ډول ښودل کېږي. د دې ترکیبونو اړوند دوهم ګروپ دای او پولي فینایل میتانونه دي چې د فریدل کرفټس د تعامل پر بنسټ د پولي هلوجن میتانونو او اروماتیک ترکیبونو څخه دا ډول لاسته راځي.



د هلايد ارایل میتانونو او اروماتیک ترکیبونو له تعامل څخه هم دا ترکیبونه لاسته راځي.




د دې ترکیبونو د لاسته راوړلو بله لاره هم شته او هغه دا چې د کاربونیلي ترکیبونو له هغه کاندنسیشنی تعامل څخه چې له اروماتیک هایدروکاربونونو او یا د هغه له مشتقاتو سره سرته رسېږي په لاس راوړي.




ترای فینایل کاربینول

د فزیکي خاصیتونو له مخې پولي ارایل میتانونه او دهغوی اړوند مشتقات کرسټلي ترکیبونه دي چې هغوی ټول د اروماتیک ترکیبونو د خاصیتونو لرونکي دي. د کریو تر منځ پوله کې ځای لرونکي هایدروجنونه پېر خوځنده او فعال اتومونه دي چې په کیمیاوي اړوندو تعاملاتو کې په ښه توګه ګډون کولای شي.




دای فینایل میتان

دای فینایل میتان د دغه ترکیبونو غوره مثال دی، د هغه د ویلېکېدو تودوخه د سانتی ګراد (۲۶-۲۷ درجې) ده چې مالټي ته ورته بوی لري. دوه لاندې تعاملونه د هغه د خورا مهمو تعاملاتو څخه ګڼل کېږي چې یو ئې د هغه آکسیدیشن دی چې بنزوفینون ور څخه لاسته راځي.




د هغه د اړوند مالیکولي کندنیشن څخه فلورن لاسته راځي.




فلورن

بنزوفینون هم د دي لړۍ يو بل ترکیب دی چې د هغه او د هغه د اړوندو مشتقاتو څخه د رنگونو د جوړولو او همدارنګه د عطرونو د جوړولو په چارو کې کار اخیستل کېږي. ترای فینایل میتاني رنگونه هغه ترکیبونه دي چې په ترای فینایل پورې اړوند او په بنزیني کړۍ پورې نښتي امینو یا هایډروکسي ګروپونه لري. امینو ترای فینایل میتانونه بېرنگه ترکیبونه دي، که اوکسیدیشن شي نو په اسیدي چاپیریال کې ور څخه رنګه مالګې لاسته راځي.


دای او پولي فینایل ایتانونه هم د دي لړۍ مهم ترکیبونه ګڼل کېږي ځینې د هغوی لکه د دای فینایل ایتان غیر سمیټریک کلوریني مشتق چې د کلورل او کلور بنزین د کاندنیشن څخه لاسته راځي او د p,p' -دای کلور دای فینایل ترای کلورایټان چې ورته ترای کلور میتایل p,p' دای کلور دای فینایل میتان او یا هم دی، دی، ټي (DDT) ورته ویل کېږي او د حشره وېرونکي په توګه ور څخه کار اخیستل کېږي. او دا ډول لاسته راځي.




(DDT) په اوبو کې ښه نه حلېږي او ژر تر ژره هم کله چې وکارول شي مالیکول یې ژر نه وړانږېږي او ورو ورو د ځینې نورو حیواناتو او انسانانو بدن ته ننوزي او روغتیايي ستونزې رامنځته کوي، نو ځکه په اوسني وخت له هغه څخه ډېر کار نه اخیستل کېږي، له دې امله د هغه اړوند ترکیب ۱،۱-دای (۴- میتوکسي فینایل) ۲،۲،۲ ترای کلورایټان هم چې مالیکول یې ژر ړنګېږي او له بدنه ژر وزي پکارېږي. چې د هغه فورمول دا ډول دی:




په دې ترکیبونو پورې اړوند داسې نور کیمیاوي مرکبات هم شته چې موږ دلته د هغوی له تفصیل څخه ډډه کوو. همدارنګه د هغوی بله اړونده ډله دای او پولي ارایل اتلیني او استیلني ترکیبونه دي. د ساري په توګه د دای فینایل اتلینونو د ساختماني ایزومرونو څخه (یو یې ترای فینایل او بل یې تترا فینایل اتلین) دی. په




په هر ډول بيا هم د دې لړۍ د ډېر پام وړ تركيب ستلېين نوميه هايډروكاربن دى چې فورمول ئې



دى . چې د بروم بنزاييل مگنيزيم او بنزالديهايد له تعامل څخه ئې لاسته راوړي. د دې تركيب د ويلېكېدو تودوخه 124°C خو د ماوراي بنفش وړانگو تر اغېزې لاندې هغه په سيس ايزومير بدليږي چې غوړ ډوله اوبلن تركيب او په 143°C سره په اېشېدو راځي.



د دې تركيب كيمياوي فعاليت په بنزيني كړۍ او دوه گوني اړيکه پورې اړوند دى او يو لړ تعاملات سرته رسوي. د ساري په توگه د هغه تعامل د قلوي فلزاتو سره چې د دوه گوني اړيکې پر بنسټ سرته رسېږي چې که بيا له الکول سره يو ځای شي نو په پايله کې ۱،۲ - دای فينايل ايتان لاسته راځي.




د رنگونو د جوړولو په چارو کې د ستلېن اړوند مشتقات لوړ مقام لري او د رنگونو د جوړولو په چارو کې په ټوليزه توګه د پام وړ په سلو برخو کې ستلېني ترکيبونه ځای لرونکي ګڼل کېږي. ځنګه چې مخکې مو هم وويل تر کتنې او څيړنې لاندې مخکني ترکيبونه تر زياتې اندازې د رنگونو په صنايعو کې پکارېږي نو ځکه په دغه صنعت کې د زيات پام وړ ګڼل کېږي.

سره نېټې بنزيني کړيوال ترکيبونه او د هغوی مشتقات

دا ډله اروماتيک ترکيبونه د اروماتيک مرکباتو يوه لويه برخه او ډېر ساده او لومړنۍ ترکيب ټي نفتلين دی چې له هغه وروسته بيا نتراسين او فينانترين راځي.


نفتلين $C_{10}H_8$ چې د لومړي ځل لپاره په ۱۸۲۰ کې د ډبرو سکارو له قير ډوله موادو څخه لاسته راغلو، يو بېرنگه کرسټلي ترکيب دی چې د ويلېکېدو تودوخه ټي د سانتي ګراد ۸۰ درجې او د اېشېدو تودوخه ټي ۲۱۸ درجې ده، دا ترکيب قير ته ورته بوی لري او دسوليمېشن (تصاعد) خاصيت لرونکی دی چې د کوتي په تودوخه هم تبخير کېدای شي او ځانګړی بوی لري – له دې ترکيب څخه د پويه (کويه) پر ضد په کورونو کې کار اخيستل کېږي. د دې ترکيب ماليکول له دوه بنزيني کړيو څخه جوړ او دواړه کړي د دووګاونډيو کاربني اتومونو د نېټلېدو په مرسته سره دا ماليکول جوړ کړی دی. نفتلين هم د بنزين په څېر ثابتې ځای په ځای دوه ګوني اړيکې نلري او همدارنګه يوه ګوني اړيکې هم نلري او دا په دې مانا ده چې هغه کانجوګېټ لس π – الکترونونه لري چې دکېکولي د قانون له مخې د دې ترکيب اروماتيکي خاصيت څرګندوي چې په لاندې فورمولونو کې په ښه توګه ليدل کېږي.




ټول کاربني اتومونه د نفتلين په ماليکول کې يو شان ندي، هلته ∞ – کاربني اتومونو (۱،۴،۵،۸ موقعيتونه) او β – کاربني اتومونه (۲،۳،۶،۷) موقعيتونه ځانته غوره کړي دي.

د څيړنو له مخې څرګنده شوې چې د نفتلين ماليکول يو مسطح جوړښت لري، چې پکې د ټولو کاربن – کاربن اتومونو تر منځ د دوه ګونو او يوه ګونو اړيکو


اوږدوالی د هغوی دواړو له مخې منځنۍ حالت لري. د بنزین په پرتله او همدارنګه دهغه د مشتقاتو په پرتله د نفتلین او د هغه د اړوندو مشتقاتو ایزومیرونه ډېر زیات دی. د نفتلین یو تعویضه ایزومیرونه دوه دی (α او β ایزومیرونه). که په نفتلین کې تعویضي دوه او دواړه یو ډول وي نو بیا ایزومیرونه په دې حالت کې لسو ته رسېږي. (7,2,6,2,3,2,8,1,7,1,6,1,5,1,4,1,3,1,2,1) که چېرې تعویضي ګان بیا سره توپیر ولري نو ایزومیرونه په پورتنۍ حالت کې ۱۴ ته رسېږي او که ایزومیري په ۸،۱ حالت کې وي دا ډول سره نږدې ایزومیري د Peri (سره نږدې) په نوم او ۶،۲ حالت کې دا معنی (amphi) یعنې له دواړو خوا معنی لري په نوم سره یادېږي. نفتلین بنزین ته ورته خاصیتونه لري او دا چې جمعي تعاملاتو ته ډېر میلان لري نو ځکه د بنزین په پرتله یې غیر مشبوع والی هم ډېر دی. په دې هایډروکاربن کې تعویضي تعاملات د β - موقعیت په پرتله په α - موقعیت کې ښه سرته رسېږي، خو د تعامل د چاپیریال د شرایطو سره سم دا حالت بدلون موندلی شي.




هلوجنیشن: که نفتلین هلوجنیشن شي نو بیا هلوجن په α - موقعیت کې ځای نیسي د ساري په توګه د هغه برومینیشن او د α - بروم منځته راتلل:




د نفتلین کلورنیشن په زړه پورې تعامل دی چې د هغه په پایله کې څو اتومه کلورین او آن تر دې چې ټول موقعیتونه یې په کلورین ډک شي رامنځته کېږي.




لاسته راغلی ترکیب د Halowax په نوم یادېږي، هغه د موم په شان او د یوه عایق په توګه پکارېږي. نایتریشن: د نایتریشن عملیه هم داسې سرته رسېږي چې د تعامل پایله بیا هم ∞ - نیټرونفتلین دی.



د حل کوونکي او تودوخي تر شرایطو لاندې (کله چې هغوی تغیر مومي) نفتلین د اسیلېشن تعامل په پایله کې ډول ډول ترکیبونه جوړوي.




که نفتلین په اورتو یا پارا موقعیت کې NO_2 ګروپ ته ځای ورکړی وي نو به دا معنا ولري چې هغه د ∞ په موقعیت کې تعویضي د ساري په توګه OH درلود، لکه په لاندې تعامل کې:




1- هایدروکسی 2- نیټرونفتلین 1- هایدروکسی 4- نیټرونفتلین α - نفتول

خو که تعویضي په β - موقعیت کې خای ولري نو بیانوي تعویضي ډېر نږدې ∞ - موقعیت کې خای پر خای کېږي.




2- هایدروکسی نفتلین 1- سلفونیک اسید β - نفتول (2-نفتول)

جمعي (ټوليز) تعاملات: د بنزين په پرتله نفتلین له هایدروجن سره په ښه توګه تعامل سرته رسوي. پدې تعامل کې په 160°C سره تر فشار لاندې هایدروجنیشن د نفتلین یوازې په یوه کړۍ کې سرته رسېږي چې تتراهایدرو نفتلین (Tetralin) او له هغه وروسته تر فشار لاندې په 200°C سره ډیکالین یا ډیکاهایدرونفتلین لاسته راځي.




تترالین او ډیکالین دواړه د اېشېدو د لوړو تودوخو لرونکي مایعات دی چې په 207°C او 190°C سره په اېشېدو راځي. دوی دواړه د غوړو او رابر حل کوونکي شمېرل کېږي.


آکسیدیشن: نفتلین د بنزین په پرتله په آسانی سره اوکسیدایز کېږي او په پایله کې یوه بنزینی کړۍ ږنګه او دهغه د اړونده ∞ - کاربني اتومونو څخه دوه کاربوکسیل گروپونو لاسته راځي چې بیا نو دوه اساسه فتالیک اسید جوړېږي.



پورتنۍ تعامل د هوا د آکسیجن په مرسته د تودوخې او کتلست تر اغېزې لاندې داسې سرته رسېږي چې په تعامل کې رامنځته شوی فتالیک اسید سمدلاسه یو مالیکول اوبه بایلي او فتالیک انهایدرايد جوړېږي.




د نفتالین اساسي زېرمه د ډبرو سکارو د قیر ډوله موادو څخه ده خو ور سره یو ځای فینول او داسې نور ترکیبونه هم پیدا کېږي چې د القلي محلول په مرسته له نفتلین څخه جلا کېږي. د نفتلین بله زېرمه خام معدني تیل دي چې د هغه اړوند مشتق یا میتایل نفتلین پکښې ډېر دی او په لاندې ډول په نفتلین سره بدلېدای شي. (په حقیقت کې دا تعامل د هغه کتلستي دي هایدروالکایلېشن دی.)



لکه چې مو وویل د نفتلین څخه یو زیات شمېر د پام وړ کیمیاوي ترکیبونه لاسته راځي.

انتراسین: دا اروماتیک هایدروکاربن په زیاته اندازه د ډبرو سکارو په قیر ډوله موادو کې پیدا کېږي. په خالص ډول انتراسین بېرنگه کرسټلي ترکیب دی چې د ویلېکېدو تودوخه ئې 217°C او د اېشېدو تودوخه ئې 354°C ده.

انتراسين په اوبو کې نه حلېږي او په اېشېدونکو بنزينو کې بيا ښه حل کېدای شي. انتراسين يو څو بنزيني کړۍ لرونکی اروماتیک ترکيب دی چې دا کړۍ په خطي مستقيم ډول يو له بل سره نښتې او په يوه مستوی کې ځای لري.




د انتراسين په ماليکول کې د نفتلين په شان د کاربن اتومونه کټ مټ هغه ډول ندي دلته د (۸،۵،۴،۱) موقعيتونو کاربني اتومونه د α او د (۷،۶،۳،۲) موقعيتونو کاربني اتومونه د β او بيا (۹ او ۱۰) کاربني اتومونه د meso په نوم سره يادېږي نو ځکه په انتراسين کې يو تعويضه مرکب درې ډوله (β ، α ، meso) ايزومرونه لري. د اړيکو اوږدوالی هم د انتراسين په ماليکول کې هر ځای يو ډول ندي، دا ځکه چې β - α اړيکي لنډې دي.


انتراسين د کيمياوي تعاملاتو له پلوه بنزين او نفتلين ته ورته دی خو کيمياوي فعاليت يې دهغې په پرتله يو څه زيات دی. له دې څخه څرگندېږي چې دا يو اروماتیک ترکيب دی، هلوځنښني، نايترېشنې او سلفورېشنې تعاملات په ښه توگه سرته رسوي او همدارنگه په جمعي تعاملاتو کې گډون کوي.

دا هم په اثبات رسېدلي چې د meso (۹، ۱۰) کاربني موقعيت تعاملاتي چټکتيا ډېره زياته ده او پورتنني تعاملات په دې موقعيتونو کې ژر تر ژره او په ښه توگه سرته رسېږي. د ډول ډول تعاملات په غبرگون کې ۹ او ۱۰ موقعيتونه سره يو شان دي کله چې په دې موقعيتونو کې تعاملات سرته ورسېږي نو بيا منځته راغلی ماليکول ډېر ثابت وي.


د ساري په توگه کلورين او برومين آن تر دې چې په ۰°C سره په پورتنيو موقعيتونو کې تعامل سرته رسوي او دای کلور يا دای بروم انتراسين جوړوي چې بيا له هغه څخه د تودوخې تر اغېزې لاندې هايډروهلوجن بيل او اړوند مونو هلوځنه ترکيب جوړېږي.




د انتراسین نایتریشن : د نایتریک اسید تر اغېزې لاندې بیا هم د نیترو گروپ په ۹ موقعیت کې ځای په ځای کېږي.




که څه هم ۹ او ۱۰ کاربنی اتومونه د تعویضي تعاملاتو په پروسه کې ښه موقعیتونه دي خو د گوگړو له اسید سره دا ترکیب ∞ - دای سلفونیک اسید جوړوي او دا به پدې مانا وي چې گواکې تعامل په ∞ - موقعیتونو کې سرته رسېدلی دی.



که انتراسین له اېشېدونکو الکولو سره چې سوډیم هم پکې وي، تعامل وکړي، دا په دې مانا ده چې د انتراسین تعامل له هایډروجن سره د جمعي تعامل په توګه ښه سرته رسېږي. که د هایډروجنیشن عملیه د کتلاست تر اغېزې لاندې سرته ورسېږي نو بیا دلته پر هایډروانتراسین ($C_{14}H_{24}$) جوړېږي.




د انتراسین آکسیدیشن د کرومیک اسید د ګډولې او داسې نورو اوکسیدانونو په مرسته سرته رسېږي او د تعامل پایله انتراکینون دی.



په انتراکینون برسېره، انتراسین د رنگونو په صنایعو په تېره بیا د الیزاریني رنگونو په جوړولو کې زیات پکارېږي.


فینانترن: دا چې د انتراسین یو ایزومیر او فورمول ئې ($C_{14}H_{10}$) دی هغه بېرنگه کرسټلي ترکیب او د ویلېکېدو تودوخه ئې 100°C او د اېشېدو تودوخه ئې 340°C ده دا ترکیب د ډبرو سکارو په څیر ډوله انتراسیني فرکشن کې پیدا کېږي. د هغه مالیکولي فورمول پدې ډول دی.




دا هم جوته ده چي فينانترن اروماتيك طبيعت لري. دهغه كيمياوي خاصيتونه انتراسين ته ورته خو بيا هم ورسره زيات توپيرونه لري. پدې د تركيب كې بيا هم د ۹ او ۱۰ كاربنې موقعيتونو زيات فعاليت دپام وړ موضوع ده. ځيني طبيعي مواد چي فعال فزيولوژيك تركيبونه گڼل كېږي فينانتريني كړۍ لري. د ساري په توگه ځيني هارمونونه، د D وېتامين، الكالوئيډونه او داسې نور تركيبونه چي په طبيعت كې زيات ليدل كېږي.

سره نښتي كړۍ لوړ اروماتيك تركيبونه

د ډېرو سكارو د قير ډوله موادو لوړ فرکشن كې پيدا كېږي او د درملو او رنگونو په جوړولو كې پكارېږي. د كړيو د ځای او د تركيب د جوړښت له مخي د هغه (د پولي سكليک ځيني تركيبونه) انتراسين ته ورته او ځيني ئي بيا فينانترن ته ورته والي لري. لكه چي مو وويل په انتراسين كې كړۍ ټولې سره په خطي مستقيم ډول پرته او لدې امله هغه د ۲،۳- بنزونفتلين په نوم هم يادېدای شي. كه دكړيو شمېر بيا څلورو ته ورسېږي بيا هغه د ۲،۳- بنزانتراسين (نفتاسين يا تتراسين) په نوم سره يادېږي چي د ويلېكېدو تودوخه ئي د سانتي گراد ۳۴۳ درجي ده.




Tetracene




Naphthacene


د تتراسين د مشتقاتو قسمي هايډروجنېشنې مواد د زيات اهميت وړ گڼل كېږي او د تتراسكلين گروپ انتي بيوتيک هم دهغوی يوه برخه گڼل كېږي. هغه سره نښتي زياتي كړۍ لرونكي تركيبونه چي فېنانترين ته ورته والی لري اروماتيك خاصيت لرونكي او د هغه غوره مثالونه دا دي.



Pyrene



Chrysene



Benzpyrene


دا هم په اثبات رسېدلي چې ځينې زيات كړى لرونكي تركيبونه ډېر خطرناك او زيان رسوونكي تركيبونه دي چې د سرطان د ناروغۍ لامل گرزي. د ساري په توگه بنزوپيرين چې فورمول ئې ($C_{20}H_{12}$) دى يو لدې ډول ډېرو خطرناكو موادو څخه شمېرل كېږي، هغه د كم اكسيجن په شتوالى كې پيروليز كېږي، لكه د موټرونو د ماشينونو د فعاليت په مهال او داسې نورو حالتونو كې بيا هم هغه ډول مواد لاسته راځي چې د سرطان د ناروغۍ لامل گرزي.

هغه اروماتيك تركيبونه چې بنزيني ندي

داسې كړيوال تركيبونه هم شته چې په هغوى كې π - الكترونونه په كړى كې كانجو گټ حالت لري خو د بنزيني كړى څخه بې برخي دي. دلته بيا يوازې دا د اهميت وړ ده چې د دې تركيبونو اروماتيك طبيعت په شپږو π - الكترونونو پورې اړوند دى، په دې مانا چې π - الكترونونو (sextet) جوړ كړى دى، نو ځكه هم په پورتنۍ نوم سره يادېږي. په همدې ډول دا هم بايد وويل شي چې په دې تركيبونو كې اروماتيك خاصيت يوازې په پورتنيو يادو شوو كاربنې اتومونو پورې اړوند ندى او په هترو اتومونو لكه اكسيجن، نايټروجن، سلفر او داسې نورو پورې هم تړلى دى. د خنثى ماليكولونو تر څنگ ځينې عضوي آيونونه (انيونونه او كتيونونه) كولاى شي اروماتيك خاصيت څرگند او تمثيل كړي چې همدا خپله اروماتيك خاصيت دى. د ساري په توگه سكلو پنتا دى ينوليم انيون او تروپايليم كتيون.


۱، ۳- سكلوپنتا دى ين او سكلوپنتا دى ينوليم انيون دواړه سره اړوند او د دوى دواړو په هكله ويلاى شو چې د C_6H_5 غير مشبوع هايډروكاربن د نورو داسې هايډروكاربنونو په څېر ندى، هغه اسيدى خاصيت لري، آن تر دې چې دا

خاصیت ئی له ۱- الکاینونو څخه هم ځواکمن دی، په هغه کې د CH_2 هایدروجن په فلز سره بدلېدای شي. په عضوي حل کوونکي کې هغه له القلي فلزاتو سره یو ځای کېدای شي چې په پایله کې هایدروجن ور څخه جلا او د C_5H_5 چارج رامنځته کېږي.




سکلوپنتادای ینولیم آیون

په لاسته راغلي انیون کې له ورايه څرگندېږي چې ناوېشلي دوه الکترونونه په یوه کاربن پورې تړلي نه او ځای په ځای ندي او هغوی د sextet د π - الکترونونو او د دوه گونو اړیکو د څلورو π - الکترونونو سره یو ځای اروماتیک سیستم رامنځته کوي. په انیون کې دا ټول کاربني اتومونه سره یو شان دي.




همدارنگه په تروپایلیم کتینون کې څرگندېږي چې: د سکلوهپتاترای ین څخه هایدرايد آیون (H^-) داسې رامنځته کېږي چې شپږ π - الکترونونه په کړۍ کې پاتې کېږي او ثابت الکتروني سکستت (Sextet) جوړوي.



تروپایلیم کتینون

تروپایلیم کتینون $(C_7H_7)^+$ یو ډېر فعال آیون شمېرل کېږي.


د یادولو وړ ده چې *Azulene* ($C_{10}H_8$) د هغه بای سکلیک ترکیبونو استازی دی چې بنزیني کړۍ نلري خو طبیعت ئې اروماتیک او هغه یو تیاره رنگه کرسټلي ترکیب دی. ازولین د نفتلین سره ایزومیر خو کړۍ ئې هغه ډول ندي، پدې مانا چې د هغه یوه کړۍ پنځه او بله اوه کاربنی اتومونه لري.



ازولین د نفتلین په پرتله کم ثابت ترکیب او د نفتلین ایزومیر دی، که د تودوخې تر اغېزې لاندې راشي نو په 350°C سره د هوا په نشتوالي کې له نفتلین سره د هغه ایزومیري حالت په ښه توګه څرګندېدای شي. هایدروکاربنونه د عضوي کیمیا بنسټ دی:


مخکېني مو د هایدروکاربنونو او دهغوی د اړوندو مشتقاتو کتنه او څېړنه وکړه، په هایدروکاربنونو کې د هایدروجني اتمونو ځای ځینې نورو عناصرو او ګروپونو نیوه چې نوی ترکیبونه لاسته راټلل، په وروستیو څو لسیزو کې هایدروکاربنونو زیات اهمیت پیدا کړی او په عضوي سنتیز او صنعت کې ئې لوړ ځای نیولی. دهغوی د اړوندو منځنیو ترکیبونو څخه د زیاتو ترکیبونو په لاسته راوړلو کې کار اخیستل شوی.

د ساري په توگه رابر، پلاستيکونه، مصنوعي سپڼسي او توکران، پودري صابونونه، رنگونه، درملې مواد او داسې نور. د هغوی د زیاتي پکارونې لپاره لاندې دیاگرام ته ځیر شي.




هتروسکلیک ترکیبونه


هغه ترکیبونه چې په خپلو کړیو کې په کاربنی اتومونو برسېره د نورو عناصرو اتومونه هم برخه ولري، هتروسکلیک ترکیبونه نومېږي. د کاربن پرته د بل هر عنصر اتوم په دې ترکیبونو کې د هېترو اتوم په نوم سره یادېږي. په هتروسکلیک ترکیبونو کې تر ټولو زیات آکسیجن لرونکي هتروسکلیک ترکیبونه بڼه او زیات څېرل شوي دي او په همدې ډول بیا سلفر او نایټروجن لرونکي هتروسکلیک ترکیبونه هم زیات تر کتنې او څیړنې لاندې نیول شوي او زیات شمېر اړوند ترکیبونه ئې پېرندل شوي دي. کېدای شي په کړیو کې هېترو اتومونه یو، دوه، درې او یا له هغه څخه هم زیات وي. د هتروسکلیک ترکیبونو په کړیو کې درې، څلور، پنځه، شپږ او یا له هغه هم زیات شمېر اتومونه ونډه لري، خو د هغوی له ډلې څخه پنځه او شپږ غړي لرونکي هتروسکلیک ترکیبونه د زیات ثبات لرونکي دي. دا ترکیبونه د ویتامینونو، الکالوئیدونو، پگمنتونو او داسې نورو په څېر په طبیعت کې زیات لیدل کېږي. د ژوندانه او بیالوژیکي پروسو او همدارنګه د رنګونو، درملې موادو، کرنیزو توکو او داسې نورو کې د زیات اهمیت وړ مواد ګڼل کېږي. هتروسکلیک ترکیبونه د هترو اتوم د طبیعت او په هتروسکلیک کړۍ کې د اتومونو د شمېر له مخې په ځانګړو ګروپونو وېشل کېږي. د دې لړۍ د ترکیبونو فورمولونه او نومونه د هترو اتوم په پام کې نیولو سره سرته رسېږي. همدارنګه د هغوی په نومولو کې د لاتیني الفبا څخه کار اخیستل کېږي چې په دې ډول هترو اتوم ته څنګ په څنګ کاربنی اتوم د ∞ - کاربنی اتوم او له هغه وروسته د β - په توري نومول کېږي چې بیا وروسته پسې د γ - توري کارول کېږي. همدارنګه باید په یاد ولرو چې که هترو اتوم آکسیجن لرونکی وي نو هلته بیا د اوکسا او که سلفر لرونکی وي د (تیا) او نایټروجن لرونکی ته ئې د (ازا) لفظ ورزیاتوي. په لاندې فورمولونو کې پورتنی مطلبونو په بڼه توګه روښانه کېدای شي.




اتلین ایمین (ازیریدین)




اتلین اوکساید (اکسیرین)




آزاستیدین




پیرول (آزول)




پیرولیدین (آزالیدین)




پیریدین (آزین)




کوانولین




اندول




پیران



فوران




تیوفن




تیوفان


د سره نښتو کریو هتروسکلیک ترکیبونو لپاره ځینې وخت د هغوی اړوند ځانگړي نومونه هم پکارول کېږي او په همدې ډول کری د بنزیني بهیر په څیر ساده (بیله کاربن او هایدروجن) څخه لیکل کېږي او په هغوی کې د بنزو، نفتو او داسې نورو څخه هم کار اخیستل کېږي.



کومارون یا بنزوفوران




اندول یا بنزوپیرول




کینولین یا بنزوپیریدین

پنځه غړي لرونکي هتروسکلیک ترکیبونه چې یو هترواټوم ولري

د دې لړۍ خورا مهم ترکیب پیرول دی چې بیا وروسته فوران او تیوفن د هغه غوره استازي ګڼل کېږي. دا ترکیبونه اروماتیک خاصیتونه لري. هغوی ټول سکسټېټ جوړوي چې له یو بل څخه توپیر لري. هر یو کاربني اټوم ور پورې اړوند یو الکترون لري، په داسې حال کې چې بیا هترو اټوم د الکترونونو دیوې جوړې لرونکي دي. د ساري په توګه پیرول چې په لاندې ډول ښودل کېږي.




د پیرول په مالیکول کې نایتروجن د یوه جوړه الکترونونو په لرلو سره څنګه چې مخکې مو هم وویل بیا په اروماتیکي خاصیت کې د زیات رول لرونکي دي، نه داچې د یوې جوړې آزادو الکترونونو خاصیت ولري، نو ځکه د امینونو او پیریدین خاصیت نلري او یوازې د سکسټېټ په جوړولو کې برخه لري نو له همدې امله وایو چې د پیرول نایتروجن قلوي خاصیت نلري. که پیرول د ځواکمنو غیر عضوي اسیدونو تر اغېزې لاندې راشي نو بیا خپل اروماتیک خاصیت له لاسه ورکوي او په غیر ثابت ترکیب ځکه بدلېږي چې د نایتروجن د یو جوړه الکترونونو څخه یو الکترون د پورتنیو اسیدونو تر اغېزې لاندې یو څه بېځایه کېږي او له دې امله ژر تر ژره پولیمرايز کېږي. فوران هم په همدې ډول دی خو تیوفن بیا دا شان ندی. د دې لړۍ د ترکیبونو د لاسته راوړلو ځانګړې لارې چارې شته خو د فوران، تیوفن، او پیرول لپاره د لاسته راوړلو عمومي میتودونه هم شته چې هغه د ۱، ۴- ډای او کسوترکیبونو او یا د هغوی د سلفري او یا نایتروجنی انالوګونو د هایډرېشن سکلایزیشن دی چې تعاملات یې په لاندې ډول ښودل کېږي.




د پنځه غړو هتروسکلیک ترکیبونو کیمیاوي خاصیتونه لږ څخه له ورايه څرگندېږي، چې هغوی الکتروفيلي تعویضي تعاملات لکه هلوجنیشن، نایتریشن، سلفونیشن، الکایلیشن او د فریدل کرافتس پر بنسټ اسایلیشن په بڼه توگه سرته رسوي.


دا تعاملات د نورو په پرتله د تیوفن سره بڼه تر سره کېږي، دا ځکه چې هغه د پورتنیو اسیدونو تر اغېزې لاندې نه بې ثباته کېږي.



دا هم څرگنده ده چې د غیر عضوي اسیدونو تر اغېزې لاندې (د ساري په توګه د سلفوریک انهایدرايد تر اغېزې لاندې) د هغه ماليکول ماتېږي او د سلفونېشن دا عمل د دای اوکسان د رامنځته کېدو سره سرته رسېږي، په داسې حال کې چې که له پیروول سره دا تعامل سرته ورسېږي نو بیا به پیریدین هم لاسته راځي.



فوران- α -سلفونیک اسید دای اوکسان سلفوترای اوکساید




پیریدین- α -سلفونیک اسید پیریدین سلفوترای اوکساید


له پورتنیو تعاملاتو څخه په ښه توګه څرګندېږي چې په پنځه غړي لرونکو هتروسکلیک ترکیبونو کې تعویضي له هر څه د مخه π -موقعیت ته ور ننوزي.

پیروول:


پیروول له فوران څخه هم لاسته راځي خو د امونیا سره د استلین کندنسپښن د هغه د لاسته راوړلو ښه لاره ګڼل کېږي، او هم هغه له ۱،۴-بوتاین دای اول څخه دکتلست تر اغېزې لاندې لاسته راتلای شي.




پیرول بېرنگه خوځېدونکې مایع ده چې په 130°C سره په اېشېدو پیل کوي. په هوا کې اوکسایډ او تیاره رنګه کېږي. په همدې ډول پیرول د ډېر کمزوري اسیدي خاصیت لرونکې دی چې هغه په هغه هایډروجنې اتوم پورې اړوند دی، کوم چې په نایتروجن پورې نښتې دی چې کېدای شي هغه همدارنګه په پوتاشیم یا سوډیم سره بدل شي.



عضوي مګنیزیمي ترکیبات هم دغه تعامل ته ورته عمل سرته رسوي.




N- پیرايل پوتاشيم او N- پیرايل مګنیزيم هلايد د الکايل هلايد تر اغېزې لاندې کولای شي د دغه مرکب N- الکايل مشتقات جوړ کړي چې هغوی بیا د تودوخې تر اغېزې لاندې بدلون مومي.




یو بل مشتق چې د دې ترکیبونو استازی ګڼل کېږي هغه اندول (Indol) دی چې داسې یو دوه کړیز ترکیب دی چې یوه کړۍ ئې بنزیني او بله ئې د پیرول کړۍ

ده. په اندول پورې اړوند یو شمېر د پام وړ ترکیبونه شته چې لا پخوا سنتیز شوي دي.




د دې ترکیبونو د سنتیز خورا مهمه لاره د فیشر د اندول سنتیز په نوم سره یادېږي، چې په هغه کې پیل کوونکي مواد په الډیهایډونو او کیتونونو پورې اړوند هغه فینایل هایډروزونونه دي چې د تودوخي تر اغېزې لاندې د $ZnCl_2$ او $CuCl_2$ سره ګډ ګري شوي دي.




د پروپینالډیهایډ فینایل هایډرازون

β- میتایل اندول (سکاتول)


د پیرول ار اندول ترکیبونه یو څه په طبیعت کې پیدا کېږي. دا چې د پیرول او اندول یو زیات شمېر سنتیتکي ترکیبونه فزیالوژیک فعال ترکیبونه ګڼل کېږي نو ځکه په درملې چارو کې له هغوی څخه کار اخیستل کېږي، همدارنګه د ساري په توګه د پیرول ګری د ډېرو مهمو ترکیبونو، لکه کلوروفیل او هیموګلوبین په جوړښت کې هم بنسټیز رول لري. د هغوی جوړښت په دې ډول دی.




دا چې دا شیمه د اړخ ځنځیر نه په ګوته کوي، فلزي اتوم په مرکزي برخه کې د پیرویل د نایټروجنی اتومونو یانې مګنیزیم په کلوروفیل او اوسپنه په هیموګلوبین کې بنسټیز ځای لري. همدارنګه په ټولیزه توګه مالیګول د پروټیني برخې سره تړاو لري او بې له دغه تړاو څخه هېڅکله هم هیموګلوبین یا کلوروفیل بایو کیمیاوي فنګشن نشي شمېرل کېدای. په اندول پورې اړوند یو بل مهم ترکیب هم اندولایل استیک اسید (هټروکسین) دی چې په بوټو کې په تیره بیا د پیوندولو په پروسه کې ښه رول لوبوي او فورمول ئې دا لاندې ډول دی.



په همدې ډول د انډیګورنګ (نیل) هم د اندول د خورا مهمو مشتقاتو څخه شمېرل کېږي. دا ماده د ډېرو پېړیو په اوږدو کې د بوټو څخه په لاس راتله، خو بایر وروسته له ډېرو کلونو وکولای شوای چې د هغې فورمول تثبیت کړي او بیا وروسته هغه په سنتیتیکي ډول لاسته راوړل شو. دا ترکیب د انلین او کلور استیک اسید په مرسته په لاندې ډول سنتیز کېږي.




د نیل په مرسته نېغ په نېغه توکران رنگ نشي اخیستی دا ځکه چې هغه په اوبو کې نه حلېږي نو ځکه بیا لازمه ده چې هغه ارجاع او په سپین انديگو بدل شي، دا عمل د کمزوري القلي په مرسته سرته رسېږي. کله چې توکر په دې ډول محلول سره لوند شي نو وروسته له هغه د وچولو په مهال بېرته د هوا د آکسیجن په مرسته اوکسیدایز او بیا هغه وخت نیلي رنگ ځانته غوره کوي.




هېر مو نشي چې په نولسمه پېړۍ کې د انديگوسنتیز د عضوي کيميا په صنايعو کې يو له لویو برياليتوبونو څخه شمېرل کېده، دا ځکه چې هغه يو ښکلی رنگ شمېرل شوی، خوبيا اوس هغه درنگونو سرد اړندی او دهغه اړوند سنتیز هم خپل نامتوالی ځکه له لاسه ورکړی چې اوس بیا د هغه په پرتله ډېر ښکلي رنگونه سنتیز شوي دي.

فوران:


د لومړي ځل لپاره فوران د پايروميسويک اسيد د وچ تقطير (دی کاربوکسایلیشن) څخه لاسته راغلی دی.




په اوسني وخت کې فوران د فورفورال څخه په لاندې ډول لاسته راځي.



فوران بېرنگه بنورېدونکې مايع ده چې د سانتي گراد په ۳۱ درجو سره په اېشېدو راځي. په هوا کې اوکسيډايز او تور رنګه کېږي. د فوران ماليکول د اسيدونو تر اغېزې لاندې وړانږېږي. د دې لپاره چې د وړانږېدو عمل سرته و نه رسېږي د هغه ځينې نور تعاملات په زړه پورې دي چې لاندې ډول بنودل کېږي.



فوران په همدې ډول د کتلسټ تر اغېزې لاندې هايډروجنېشن او په پايله کې له هغه څخه تتراهايډروفوران لاسته راځي.





دا هم ټولونه څرگنده ده چې تتراهايډروفوران د ۱،۴- بوتان ډای اول د هغه بين المايکولي ايټر گڼل کېږي چې د عضوي کيميا له ځواکمنو حل کوونکو څخه شمېرل کېږي.

د فوران د خورا نامتو مشتقاتو څخه يو هم فور فورال دی چې دا (فوراني الديهايد) په داسې حال کې لاسته راځي چې پنتوز د کوم رقيق غير عضوي اسيد په شتوالي کې د تودوخي تر اغېزې لاندې کيمياوي بدلون ومومي. پنتوزونه دهغو پوليسکرايدونو څخه چې پنتازونونه نومېږي او د غلو دانو د پوټکو د چنولو په مهال رامنځته کېږي په لاس راځي داترکيب د فوران د نورو مشتقاتو په لاسته راوړلو کې پکارېږي، همدارنگه هغه يو حل کوونکی دی چې په صنعتي اهميت برسېره په عضوي کيميا کې هم ډېر پکارېږي.


فور فورال بېرنگه مایه ده چې په ۱۶۱°C په اېشېدو راځي. د پخې وچې ډوډی بوی لږ څه ځکه فور فورال ته ورته دی چې د هغه د پخولو په مهال داړوندو اوږو د پنتوز څخه جوړېږي.

فور فورال په هوا کې اوکسايډ کېږي چې لومړی په نصواري رنگه مایع او بيا په تور ډوله ژاوله بدلېږي. دا خاصيت د الديهايډونو د پاره يو څه عام دی لکه لاندې تعاملات:






فور فورال په همدې ډول دکنیزارو په تعامل کې په لاندې ډول ګډون کوي.




د فوراني کړۍ اروماتيکي خاصیت لري څخه په ښه توګه څرګندېږي چې دا ترکیب په آساني سره په الکتروفيلي تعویضي تعاملاتو کې برخه اخلي. د ساري په توګه په لاندې تعاملاتو کې چې په دوو پړاوونو کې ډېر ګټور ترکیبونه ور څخه تر لاسه کېږي.



وروستی ترکیب چې فوراسیلین نومېږي، زېر رنګه کرسټلي درملې ترکیب دی چې د ویلي کېدو تودوخه یې د سانتي ګراد (۲۳۲ - ۲۲۷) درجې ده او د ډیزانټري ناروغۍ په درملنه کې ور څخه کار اخستل کېږي. د فور فورال یو بل


دپام وړ تعامل د کلورین او همدارنگه د مرکيوري کلوراید سره په لاندې ډول بنودل کېږي.




5- کلوروفورفورال

5- کلورومرکيوروفورفورال


په پورتنۍ ډول څرگنده شوه چې فور فورال د فوران یو ډېر د اهمیت وړ ترکیب دی چې زیات صنعتي اهمیت لري. د ۵- کلورو مرکيورو فور فورال او همدارنگه د ۵- کلوروفورفورال څخه څرگندېږي چې د هغه د ماليکولي کړۍ شمېره دا ډول ده:




فوران همدارنگه یو دي یني ترکیب دی نو ځکه د ملونیک انهایدرايد سره د دیلس او الډر په تعاملاتو کې گډون کوي او په پایله کې د عضوي کیمیا یو لږ مهم ترکیبونه جوړېږي. د دې ډول تعامل څخه لاسته راغلي ترکیب ته په عضوي کیمیا کې ادوکت هم ویل کېږي.



موږ دا هم وویل چې فوران د اسیدونو په غبرگون کې ډېر حساس دی. د ساري په توگه که هغه د گاته HCl سره یو ځای شي نو ډېر ژر منفجر کېږي، دلته فوراني کړۍ تخریب او داسې یوه گډوله منځته راځي چې پکې څو ډوله مواد برخه لري. د فوران د مشتقاتو له ډلې څخه یو بل هم Furoic acid دی چې کولای شي له هلوچنونو (د ساري په توگه برومین) سره تعامل وکړي چې بیا دلته برومین په میتا موقعیت کې ځای پر ځای کېږي.




فوران همدا ډول د اسیتایل نایتریت په مرسته نایترېشن او نیتروفوران جوړېږي.






مخکې مو هم وویل چې فوران که په غیر اسیدي چاپیریال کې هایډروجنېشن شي نو له هغه څخه یو نامتو او پیاوړی عضوي حل کوونکی چې تترا هایډروفوران (THF) نومېږي لاسته راځي.

تتراهایډروفوران () په اوبو کې ښه حلېږي او له اوبو سره یو ثابت مخلوط جوړوي، هغه یوه بېرنگه مایع او ځانګړی بوی لري. د هغه د زیات کیمیاوي اهمیت له امله په کیمیاوي صنایعو کې هم زیات تولیدېږي، هغه همدارنګه په لاندې ډول د ۱،۴- بوتان دی اول له دی هایډرېټېشن څخه هم په آساني سره په لاس راځي.



د تتراهایډرموفوران هتروسکلیک کړۍ په اسیدي چاپیریال کې وازېږي، له هغه څخه لومړی ادیپیک اسید او بیا وروسته هکزاملین دی امین لاسته راځي چې د نیلوني سپنسیو په جوړېدو کې ور څخه کار اخیستل کېږي.




Hexamethylenediamin


Adipic acid

تیوفن


د ډبرو سکارو د وچ تقطیر په مهال د مفرو غازاتو په لړ کې تیوفن هم لاسته راځي، د پنځه غړو لرونکو ترکیباتو په لړ کې تر ټولو پیاوړی او ثابت ترکیب بلل کېږي. په هوا کې خپل ثابت حالت په ښه توګه ساتي او اسیدونه هم په هغه کومه اغېزه نلري او ویلای شو چې هغه یو ټیپیک اروماتیک ترکیب دی، په دې مانا چې هغه لکه اروماتیک ترکیب کلورنېشن او نایتریشن کېدای شي او د فریدل کرفتنس په تعامل کې هم ګډون کولای شي. د تیوفن اېشېدو تودوخه 84°C چې بنزین (80°C) ته ډېره نږدې ده نو ځکه هم د تقطیر په عمل کې هغوی یو له بله څخه ښه نه جلا کېږي او یوازې د کیمیاوي لارو چارو په مرسته دا جلا والی صورت مومي.



د تیوفن ترکیبونه د زیات شمېر پترولي ډولونو په بهیر کې شته والی لري. په پترولیمو کې د سلفري ترکیبونو شته والی ډېر زیات نه خوښوونکی یا نا مطلوب ځکه ګڼل کېږي چې ډېرې وړانتیاوې رامنځته کوي، نو ځکه هغوی او همدارنګه خپله تیوفن باید ژر تر ژره له هغوی څخه جلا کړای شي او پدې ډول تیوفن د کتلست او فشار تر اغېزې لاندې په 250°C تودوخه د هایډروجنېشن عمل په مرسته دا ډول جلا کېږي.




د تیوفن په نوم اېښودنه کې هم نمره وهل دهترو اتوم څخه پیل او بیا د نوم اېښودنې د عمومي سیستم پر بنسټ شمېره وهل کېږي.




په تجارت کې تیوفن د تودوخي تر اغېزې لاندې د سلفر او نارمل بوتان څخه دا ډول


لاسته راځي.




خو په عمومي ډول تیوفیني کړۍ او په ځانګړې توګه د دې ډول کړۍ سیستم له ۱،۴- دای کاربونيلي ترکیبونو څخه له P_2S_5 سره منځته راتلای شي.




د تیوفن په کیمیاوي خاصیتونو کې خورا مهم ټکی دا دی چې په زیاتو تعویضي تعاملاتو کې ګډون کوي. دا تعاملات په معمولي ډول د α - په موقعیت کې په ښه توګه سرته رسېږي، خو کله کله هم د β - ایزومېرونه جوړېږي.




که وغواړو ځینې فلزات (یو ولانسه فلزات) د تیوفن په کړۍ کې دهایدروجن په اټوم تعویض کړو، نو دا عمل په ځانګړو شرایطو د α - په موقعیت کې سرته رسېږي د ساري په توګه په لاندې تعامل کې د تیوفن میتایلیشن دا ډول ترسره کېږي.



څرگنده شوه چې په ایتری چاپیریال کې د نارمل بوتایل او تیوفین له تعامل څخه په پورتنی ډول تیوفن لیتیم لاسته راځي او روښانه ده چې لیتیم بیا په ∞ - موقعیت کې ځای نیسي. په تیوفن پورې اړوند د پام وړ ترکیب بنزوتیوفن یا تیوفتن دی او دا ترکیب:




د ایتایل بنزین او سلفر له تعامل څخه د تودوخي تر اغېزې لاندې لاسته راځي.




پنځه غړي لرونکي هتروسکلیک ترکیبونه چې دوه هترو اتومونه ولري


دا ترکیبونه چې اروماتیک خاصیتونه لري یو یا څو نایتروجنی اتومونه لري چې په هتروسکلیک کړي کې سره ځای په ځای شوي دي. دا چې هرو مرو د نایتروجن اتومونه لري نو هغوی د آزولونو په نوم سره هم یادېږي. هغوی د اړوندو هترو اتومونو له مخې د اوکسازول، تیوزول، ایمیدازول، پیرازول، تراي ازول او تترازول په نوم سره یادېږي. که د فوران، تیوفن یا پیروول په فورمولونو کې د CH گروپ په آډت سره بدلون ومومي نو بیا د آزولونو خورا مهم استازي لاسته راځي او په دې ډول په فوران پورې اړوند اوکسازول او ایزوکسازول په تیوفن پورې تیوزول او ایزوتیازول او همدارنګه په پیروول پورې اړوند پیرازول او ایمیدازول منځته راځي.




از لونه دکیمیاوي صنایعو خورا مهم ترکیبونه گنل کېږي، هغوی په طبیعت کې پیدا کېږي او د رنگونو جوړولو، درملې موادو او داسې نورو او همدارنگه په عضوي سنتیز کې اوچت ځای لري. د دې لړۍ خورا مهم ترکیب پیرازول دی او څنگه چې په پورتنیو فورمولونو کې څرگندېږي چې د هترو اتوم د موقعیت پر بنسټ د ایمیدازول ایزومیر گنل کېږي، کرسټلي ترکیب او د ویلېکېدو تودوخه ئې د سانتي گراد ۷۰ درجې ده، کمزوری قلوي او اروماتیک خاصیت لري. دا ترکیب د اکسیدېشنې معروفونو په غبرگون کې ثابت ترکیب دی، په الکتروفیلیک تعاملاتو (لکه نایترېشن، سلفونېشن او برومینېشن) کې په ښه توګه ګډون کوي. هغه د دای ازومیتان او استلین څخه په دې ډول په لاس راځي.




د دې ترکیب هومولوگونه په همدې ډول د ۱،۳- دای کیتونونو څخه له هایدرآزین سره لاسته راځي. د ساري په توګه د اسیتایل اسیتون او هایدرآزین څخه ۳،۵- دای میتایل پیرازول دا ډول لاسته راځي.




په پيرازول پوري اړوند يو بل تركيب چي امينو پيرازول نومېږي د هغه لاسته راوړل او کيمياوي خواص دواړه له لاندني تعامل څخه ښه څرگندېږي.



که پيرازول ورو ورو ارجاع شي نو بيا دا ترکيبونه ور څخه لاسته راځي.




پيرازولين



پيرازولين



دا هم بايد په ياد ولرو چي پيرازولين د پيرازول په پرتله يو څه ځواکمن قلوي گڼل کېږي.

په همدې ډول د دې ډلې له ترکيبونو څخه پيرازولون هم د پام وړ تركيب دی.




د هغه اړوند مشتقات هم د زيات اهميت وړ گڼل کېږي، هغوی په آسانه توگه د تعويضي لرونکو هايډرازينونو له کاندنسيشن څخه د β - کيتو اسيدونو له ايسترونو او يا د جمعي تعامل پر بنسټ له هايډرازينونو او دای کټېنونو سره لاسته راځي.


د ساري په توگه د فينايل هايډرازين او استيک ايستر له کاندنسيشن او يا له دای کټونونو سره ۱- فينايل ۳- ميتايل پيرازولون - ۵ لاسته راځي.



۳- میتایل ۱- فینایل ۵- پیرازولون په درې ډوله لاندنیو توتومیري شکلونو سره څرگندېږي او دا چې هغه د پیرازولون له خورا مهمو ترکیبونو څخه شمېرل کېږي نو د هغه یو څه نا څه څېړنه کوو.




که ۱- فینایل ۳- میتایل ۵- پیرازولون (III) د میتایل آیوډاید په مرسته میتایلیشن شي نو بیا انتي پایرین (۱- فینایل ۲، ۳- ډای میتایل پیرازولون -۵) لاسته راځي.




انتی پایرین چې تریخ خوند لری د تبې د کمولو لپاره پکارېږي، دا چې هغه مالګې ته ورته خاصیت لري نو په اوبو کې ښه حلېږي. د انتي پایرین د پام وړ دوه نور ترکیبونه چې ډېر زیات پکارېږي او ځکه هم ډېر اهمیت لري د تبې د کمولو او اعصابو د آرامولو لپاره پکارېږي یو ئې امایدوپایرین چې (۱- فینایل ، ۲، ۳- ډای میتایل ۴- ډای میتایل امینو ۵-

انتی پایرین ۴-نیتروزو انتی پایرین ۴-امینو انتی پایرین پیرامیدون، امایدوپایرین


دا ترکیب هم په خپله پنځه غړي لرونکي کړی کې دوه نایتروجنې اتومونه لري. دا کړی د هستادین امینو اسیدونو او فزیولوژیک فعال ترکیب (histamin) یوه برخه جوړوي، هغه همدارنګه د هستادین د دی کاربوکسایلیشن محصول ګڼل کېږي. هستامین د بدن په ډېرو حجراتو کې د غیر فعال شکل په څېر پیدا کېږي او که هغه د وینې بهیر ته ور ننوزي نو بیا ناوړه تعاملات سرته رسوي، چې په پایله کې دحساسیت د منځته راتلو او په دې ډول دنورو ناوړو حالتونو لامل ګرزی.



155





یا داد ډول



ایمیدازول د خپل اړوند ایزومیر (پیرازول) په پرتله یو څه ځواکمن قلوي گڼل کېږي. د هغه د ویلېکېدو تودوخه (90°C) او د اېشېدو تودوخه 256°C ده.

تيازول


داسې یو هتروسکلیک ترکیب دی چې په خپله اړونده پنځه غړي لرونکي کړی کې دوه هترواتومونه (N او S) لري. د هغه ډېر د اهمیت وړ مشتق د هغه اړوند تیوامایډ دی، چې دا ډول لاسته راځي.



کلوراسیتون


تیواسیت امایډ

۴،۲ دای میتایل تيازول




۲- امینو ۴- میتایل تيازول


په پورتنیو ترکیبونو برسېره ۲- امینو تiazول چې د سلفاتiazول د لاسته راوړلو لپاره پکارېږي چې هغه هم په خپل وار سره بیا په درملې موادو کې د زیات اهمیت وړ گڼل کېږي. ډول ډول پنسلین هم د تiazول مهم ترکیبونه گڼل کېږي. د کلور اسیت الدیهاید او تیوفارم امید له تعامل څخه هم تiazول لاسته راځي.




تiazول په طبیعت کې نه پیدا کېږي خو په زیات شمېر طبیعي موادو کې د تiazول هسته وجود لري، د هغه د اېشېدو تودوخه 117°C ده او په یو شمېر درملې ترکیبونو کې د پام وړ ماده گڼله کېږي. تiazول په اوبو کې حل او کمزوری قلوې خاصیت لري. دا هم په یاد ولرو چې د تiazول کری-د B_1 ویتامین د مالیکول یوه برخه ده. د پنسلین سره یو ځای بل انتي بیوتیک چې سلفاتiazول نومېږي د سلفاماید (Sulphamide) په نوم په روغتيايي چارو کې ور څخه کار اخیستل کېږي.



Thiazole




Pyrimidine




Purine


هغه مشتقات چې په پیرامیدین او پورین پورې اړه لري، خورا د اهمیت وړ طبیعي مواد گڼل کېږي.




Cytosine




Uracil



Thymine



Adenine




Guanine


پورتنی ترکیبونه ځکه د اهمیت وړ گڼل کېږي چې د نولېټیک اسیدونو په جوړښت کې لوی رول لري.

هغه شپږ غړي لرونکي هتروسکلیک ترکیبونه چې یو هترو اتوم لري


د دې لړۍ خورا مهم ترکیب پیریدین دی چې هغه د بنزین غوندې داسې یوه کړۍ ده چې پکښې درې ولانسه (CH) د نایتروجن په اتوم بدل شوی دی.




پیریدین مایع او د اېشېدو تودوخه ئې 115°C ده. دا ترکیب ځانگړی بد بوی لري. چې په اوبو کې ښه حلېږي. د پیریدین او د هغه اړوند مشتقات د ډبرو سکارو په قیر ډوله ترکیب کې زیات پیدا کېږي چې هغه ئې یوه لویه صنعتي سرچینه بلل کېږي. پیریدین په همدې ډول د ترکیبي لارو په مرسته هم لاست راځي. د پیریدین د مالیکول جوړښت د لاندې تعامل له مخې په ښه توګه څرګندېدای شي.




د پیریدین د مالیکول د جوړښت په پام کې لرلو سره د هغه یو تعویضه ایزومرونه درې او دوه تعویضه (یو ډول یا دوه ډوله) ئې شپږ یا لس دی. مونوميټایل پیریدینونه د پیکولینونو او دوه میټایل پیریدینونه د لوتیدینونو په نومونو سره یادېږي او بیا درې میټایلي او یا ترای میټایل پیریدینونه کولیدینونه نومېږي. دا چې پیریدین ډېر زیات صنعتي اهمیت لري نو هغه نه یوازې دا چې د پخوانیو لارو چارو په مرسته (لکه د ډبرو سکارو له قیر، د هډوکو له غوړو او داسې نوروو څخه) لاسته راوړي، بلکه د سنټیټیکي میتودونو پر اساس هم هغه او د هغه هومولوگونه لاسته راوړي. هغه د کاربونيلي ترکیبونو او امونیا څخه دا ډول لاسته راځي.




دا تعامل یو صنعتي مهم کاندنسیشنی تعامل گڼل کېږي. ۲. که اکرولین له امونیا سره کاندنسیشن شي نو بیا β - پیکولین جوړېږي.




۳. که اسیت الډیهاید د امونیم اسیتات په شتوالی کې په 250°C تودوخه د امونیا سره کاندنسیشن شي نو بیا ۲- میټایل ۵- ایتایل پیریدین لاسته راځي.



په یاد ولرئ چې پیریدین ($\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$) د ډبرو سکارو په قیر کې په سلو کې نږدې دوه برخې د میتایل پیریدین او کینولین سره یو ځای پیدا کېږي. د پیریدین دوه میتایل لرونکي ترکیبونه چې یو ئې لټېډین او بل ئې اکولیدین نومېږي، د زیات اهمیت وړ هتروسکلیک ترکیبونه ګڼل شوي دي.




2,4,6- Collidine




2,4, -Lutidine

همدارنگه کېدای شي چې د پیریدین مشتقات د دوه مالیکوله کیتوایستر له تعامل څخه د یوه مالیکول الډهايد او امونیا سره لاسته راشي.



که کینولین آکسیدیشن شي په لاندې توګه ثابته کینولیني کړۍ لرونکې ترکیب لاسته راځي.




کینولین

کینولیک اسید


په ډېرو کیمیاوي خاصیتونو کې د اروماتیک سکستیت په لرلو سره پیریدین بنزین ته ورته دی.

پیریدین د بنزین په شان الکتروفيلي تعاملات سرته رسوي او په ښه توګه په هلوځني، نایترېشنې او سلفونېشنې تعاملاتو کې ګډون کوي. د پیریدین په کړۍ کې د نایتروجن اتوم داسې رول لوبوي چې تعویضي ګان بیا مېټا موقعیت ته مخه کوي.




دا چې په پیریدیني کړۍ کې د نایتروجن اتوم ډکاربن په پرتله زیات الکترونګتيف حالت لري، نو ځکه د کړۍ الکتروني ورېځ یو څه ځانته کشوي او تعویضي ګان هم اورنو او پارا موقعیت ته مخه کوي.


په همدې ډول د سودیم اماید تر اغېزې لاندې پیریدین اماینېشن کېږي. دا تعامل د خاورو د تیلو، کسایلین او داسې نورو هایډروکاربنونو سره د تودوخې تر اغېزې لاندې په ښه توګه سر ته رسېدای شي د سودیم اماید په بدلون سره د پوتاشیم اماید په شته والي کې هم دا تعامل سرته رسېدای شي.




پورتني تعامل ته ورته د نوکلیوفیلیک تعویضي تعامل پر اساس پیریدین د میتوکساید سره تعامل سرته رسوي.




د بنزیني کړۍ له مخې کېدای شي چې پیریدین هم یو تعویضي ډوله اړوند اورتو، میتا او پارا ترکیبونه جوړ کړي، لکه:




که د پیریدین هومولوگونه آکسیدیشن شي نو دا ډول آکسیدیشن د آکسیدانونو په مرسته په داسې ډول سرته رسېږي چې اروماتیک هایدروکاربني مشتقاتو ته ورته تعامل سرته رسېږي، په دې مانا چې د کړۍ د څنګ خنځیر اوکساید او اړوند ترکیبونه لاسته راځي.



پورتتي آكسيديشني تعامل دكروميك اسيد گډولي په مرسته سرته رسېږي، د كټلستي هايډروجنېشن پر اساس پيريدين په پېپريدين بدلېږي چې خاصيتونه ئي د دوهمي امين په شان دي.




د پيريدين د هومولوگونه له ډلې څخه خورا مهم او په زړه پورې تركيب ۲-ميتايل ۵- وينايل پيريدين دی چې په لاندې ډول د امونيا او كروتونيك الډهايد څخه لاسته راځي.



د پيريديني كړۍ نور داسې تعويضي مشتقات لكه هلوچني، نيترو، هايډروكسو، امينو هم د اهميت وړ تركيبونه گڼل كېږي. په دې تركيبونو كې دپام وړ خبره دا ده چې تعويضي گروپ په كړۍ كې كوم ځای نيولی نو ځكه ئي صنعتي اهميت هم په هغه پورې اړوند دی.

د پيريدين β - تعويضي تركيبونه اړوندو اروماتيک تركيبونو ته ډېر ورته والی لري. د ساري په توگه β - كلورپيريدين دكلوربنزين په شان په تعاملاتو كې كمه برخه اخلي.

د پيريدين يو لړ نور تركيبونه چې په پيريدين کاربوکسيليک اسيد پورې اړوند دي تر زياتو څيړنو لاندې نيول شوی چې د هغوی خورا د پام وړ تركيبونه دا دي:




۲ - پيريدين کاربوکسيليک اسيد β - پيريدين کاربوکسيليک اسيد α - پيريدين کاربوکسيليک اسيد
(ايژونيکوتينيک) (نيکوتينيک) (پيکولينیک)


ایزونیوتینیک اسید هایدرازید CONHNH_2 د ایزونیازید په نوم سره یاد او د نري رنځ د درملنې لپاره پکارول کېږي

په داسې حال کې چې نیکوتین امید CONH_2 یا ویتامین (PP) یو داسې ترکیب دی

چې د پلاګرا ناروغی د درملنې لپاره پکارول کېږي. داسې نور هتروسکلېک ترکیبونه شته چې اصلاً د دوه یا درې شپږ غړو لرونکو کړیو څخه جوړ شوي او یوازې په یوه کړۍ کې هترو اتوم لري. دا ترکیبونه مهم هترو سکلېک ترکیبونه دي چې ډېره برخه یې د ډېرو سکارو په قیر کې پیدا کېږي او دا قیر یې لویه طبیعي سرچینه ګڼل کېږي. د ساري په توګه:



کینولین یو مهم ترکیب دی چې په آسانی سره دا ډول لاسته راټلای شي.



داسې نور شپږ غړي لرونکي هتروسکلېک ترکیبونه شته چې د دوه نایټروجنی

اتومونو لرونکي دي، لکه پیریدازین (N) او کېډای شي چې یوازې د دوه اتومه آکسیجنونو لرونکي وي، لکه ډای اوکسان (O) او هم مختلط ډوله وي ، لکه اوکسازین (N) او یا تیاژین (S) او داسې نور ډېر چې باید تر

کتنی او څیرني لاندې ونيول شي.
خو د وخت د کموالی او د کیمیا ددې برخې د لنډ پروگرام په پام کې لر لوسره په
اوس وخت کې له هغه څخه مخ اړ وو.

الکالوئیدونه

الکالوئیدونه هغه عضوي هتروسکلېک نایټروجنی ترکیبونه دي چې زیات شمېر ئې په طبیعي ډول په بوټو کې پیدا کېږي، نو ځکه هم هغوی د طبیعي موادو په عضوي کیمیا کې تر کتنې او څېړنې لاندې نیول کېږي. الکالوئیدونه ډېر ځواکمن فزیولوژیک او فارماکولوژیک اغېزمن طبیعي ترکیبونه دي چې د انسانانو او نورو حیواناتو لپاره په همدې ډول ډېر ځواکمن زهر خو ډېره کمه اندازه ئې بیا درملې خاصیتونه لري. په عضوي کیمیا کې د هغوی د پېژندلو لپاره د هغوی اړوند رنګه تعاملات ډېر په زړه پورې ګڼل کېږي، د هغوی تر څنګ د هغوی ترسبي تعاملات هم نامتو تعاملات دي. د ساري په توګه زیات شمېر الکالوئیدونه د فوسفومولبدیک اسید، تنین او پکریک اسید سره رسوب کوي.


الکالوئیدونه چې نومونه ئې په هغو بوټو پورې چې دوی پکې پیدا کېږي اړوند دي. یو لږ شمېر ئې مایع یا اوبلن ترکیبونه دي چې اوکسیجن لرونکي ندي او په عام ډول الکالوئیدونه بېرنګه کرسټلي ترکیبونه شمېرل کېږي. رنګه الکالوئیدونه ډېر کم دي، زیات شمېر الکالوئیدونه کرسټلي مالګې جوړوي چې بیا دا مالګې د الکالوئیدونو په لاسته راوړلو او پاکولو کې پکارېږي.

په بوټو او و نو کې (نه په ټولو ونو او بوټو کې) یوازې له ۱۵ څخه تر ۲۰ ډوله الکالوئیدونه په ګډوله یا مخلوط ډول پیدا کېږي. زیات هغه شمېر الکالوئیدونه چې په ښه توګه څیړل شوي د پېچلي هتروسکلېک جوړښت لرونکي دي. هغوی د خپل طبیعت له مخې په لاندې ګروپونو ویشل کېږي.

۱. پیریډيني الکالوئیدونه (کونین، نیکوتین او انابازین)
۲. کینوليني الکالوئیدونه (کینین، سینکونین)
۳. ایزوکینوليني الکالوئیدونه (پاپاوارین، نرکوتین، کورارین)
۴. فینانترین ایزوکینوليني الکالوئیدونه (مورفین، کودېن، تېبائین)
۵. د پیرولېډین پیریډيني کړیو کاندنسیشنی الکالوئیدونه یا تروپيني الکالوئیدونه (اتروپین، کوکائین)
۶. پوريني الکالوئیدونه (کافېن، تیوبرومین)

ځینې ډېر ساده الکالوئیدونه په لاندې ډول تر کتنې لاندې نیسو.
کونین (Coniine) ساده الکالوئید او ∞ - پروپایل پیپیریډین په نوم سره یادېږي هغه همدارنګه د 2- پروپایل پیپیریډین په نوم سره یادېږي ټولیز فورمول ئې $(C_8H_{17}N)$ دی د نورو الکالوئیدونو په څېر کونین چې د یو سیمټریک کاربنی اټوم $(C-2)$ لرونکی او قلوي ترکیب دی په آساني داسیدونو سره مالګې جوړوي. د هغه مالیکول فعال اوپټیکي ترکیب دی، مایع او په $166^\circ C$ سره

په اېشېدو راځي. هغه په طبيعت کې پيدا کېږي، سوزونکې خوند او دموړکو بوی ته ورته بوی لري او ډېر پياوړی زهرجن ترکیب دی چې د تنفسي سیستم د شندولو لامل ګرزي په کيمياوي سنتيز کې په لاندې ډول لاسته راځي.




پیکولين

کونیرین

کونین

نیکوتین

په کیمیا کې د 3-[2-(N- میتایل پیرولیدیل)] پیریدین په نوم سره یادېږي د تنباکو په شان بوی لري په هوا کې ئې رنگ ژر تر ژره نښواري کېږي، په داسې حال کې چې هغه د تنباکو په پانو او ولو کې په بېرنگه مایع توګه پيدا کېږي، او د اوبو سره په ښه توګه ګډېدای شي. د بیلابیلو اکسیدانونو تر اغېزې لاندې په نیکوتینیک (β - پیریدین کاربونیک) اسید سره تجزیه کېږي.




نیکوتین

نیکوتینیک اسید

هېر مو نشي چې په تنباکو کې دا الکالوئید د سیتريک يا ماليئیک اسید داروندو مالګو په شان پيدا کېږي په کمه اندازه سره نیکوتین دا عصابو ځواکمن تحریک کوونکی بلل کېږي، خو زیاته اندازه ئې د تنفسي مرکزونو د فلج کېدو لامل ګرزي، دا یو زهري الکالوئید دی چې 40 ملي ګرامه ئې د مړینې لامل ګرزي او دا الکالوئید په کرنیزو چارو کې د حشره وژونکي په توګه ډېر زیات پکارول کېږي.

انابازين


دا الكالوئيد يو پيريدينې مشتق گڼل كېږي. دا تركيب په يو ډول بوټي كې چې د اناباسس افيلانو په نوم ياد او منځنۍ اسيا كې پيداكېږي په صنعت كې د يوه حشره وژونكي په توگه لاسته راوړل كېږي. دا هم بايد وويل شي چې اناباسين د نيكوتين ايزومير دی چې د كيميا له مخې ئې نوم 2- (3- پيريديل) پيپريدين او جوړښت يې له دې تعامل څخه چې هغه د آكسيديشنې عمليې لاندې په نيكوتينيک اسيد او د دې هايډروجنېشن عمليې په پايله كې په β, α - باي پيريديل سره بدلېږي.



لكه چې مخكې مو هم وويل انابازين دنيكوتين د ايزومير په څېر يو ډېر ځواكمن زهر او حشره وژونكى دى.

Quinine (كيونين)

يو بل الكالوئيد دى چې په سهيليزه امريكا كې د كيونينو ونې په پوستكې كې پيدا كېږي، د كينولينو له مشتقاتو څخه شمېرل كېږي. كيونين هغه وخت يو نامتو تركيب وگڼل شو چې د ملاريا ضد درملو په توگه ور څخه كارواخيستل شو. په اوسني وخت كې acrichin هم د كيونين په څېر د پورته يادې ناروغۍ په ضد پكارول كېږي. دا الكالوئيد هم د ساده الكالوئيدونو په بهير كې ور گډېږي.




پورته ټول ياد شوي الكالوئيډونه ساده الكالوئيډونه گڼل کېږي او که څه هم دعضوي کيميا د نورو ترکيبونو په پرتله دا ترکيبونه ډېر لږ او هغوی يوازې له زرو څخه يو څه زيات دي خو بيا هم د زيات اهميت له امله ئې پېږندنه هرومرو گڼل شوې ده، نو ځکه دلته يوازې دهغوی د حياتي اهميت يادونه کېږي. دا هم بايد وويل شي چې دا لاندي الكالوئيډونه ساده ندي او پېچلي جوړښتونه او فورمولونه لري، نو ځکه د هغوی د ټولو خاصيتونو او کيمياوي لاسته راوړلو څخه ډډه کوو.


زيات شمېر نوي الكالوئيډونه هم له بوټو څخه لاسته راغلي او ماليکولي جوړښتونه يې ټاکل شوي دي، څرگنده شوې چې هغوی هم دکيمياوي جوړښت او اړوندو فنګشنې گروپونو په پام کې لرلو سره دا نده تعين شوي چې هغوی به يوازې په بوټو کې وي خو بيا هم د کيمياوي نظره پوره پېږندل شوي دي. ځينې د اهميت وړ پورتنې ډول الكالوئيډونه دا دي.

اتروپين: د سترگې دکسي د لويوونکي په توگه د سترگو په معايناتو کې ور څخه کار اخيستل کېږي.

سترايشينين: د يو وژوونکي يا خوله اچوونکي زهر نوم ئې گتلی، ډېر ځواکمن زهر چې مرکزي عصبي سيستم شنډوي.



Strychnine



Atropine


مورفين

يو پياوړی انلجېزیک او درد آرامونکی دی د مخدره موادو معتادين ئې ډېر پکاروي او پکارول ئې ډېر ژر اعتياد رامنځته کوي.


ارگوتامين

يوانلجېزیک دی چې د سر دخوړو په تېره بيا د نيم سري د درملني لپاره پکارول کېږي.


ريزپين: د يوه آرامونکي درمل او همدارنگه د وينې فشار د کمولو لپاره هم پکارېږي.



Reserpine



Ergotamine



Morphine

که څه هم په یوه ډېره کمه اندازه ځینې الکالوئیدونه په روغتیایي چارو کې د درملو په توګه پکارېږي. خو هغوی په ټولیز ډول زیات زیانمن ترکیبونه دي چې معتادین ئې همدا اوس په نړۍ کې یوه ستره ستونزه بلل شوي او ځکه نو د مخدره موادو قاچاق، کرل، ساتل او وړل راورل په ټوله نړۍ کې منع ګرزېدلی دي.

اخذ ليكونه

ا. الف، الف- پتروف، خ، و- بليان؛ الف، ت- تروشنكو عضوي كيميا (د دكتور
حكيمي پښتو ژباړه) سانكت پتربورك (ايوان فيودورف) 2003 (وروستی
روسي چاپ)

2. Student study guide and solutions Manual for Organic
Chemistry

Third edition Brown & Foote

Brent Iverson & Sheila Iverson

University of Texas at Austin (2001)

3. General Chemistry (Seventh Edition) Kenneth W. Whitten
Raymond E. Davis. M. Larvy Peckl, George G. Stanley U.S.A,
UK and ... (2002)

4. Organic Chemistry (Fourth Edition) K. Peter, C. Vollhardt,
Neil E. Schore; New York (2003)

5. Organic Chemistry

Third edition

William H. Brown

Beliot College

Christopher S. Foote

University of California Los Angeles (2002)

Publishing Textbooks

Honorable lecturers and dear students!

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To tackle this issue we have initiated the process of providing textbooks to the students of medicine. For this reason, we have published 176 different medical textbooks (95 books funded by DAAD, 80 books funded by kinderhilfe-Afghanistan) from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh and Kapisa medical colleges and Kabul Medical University. It should be mentioned that all these books have been distributed among the medical colleges of the country free of cost. Currently we are working to publish 20 more non-medical textbooks for Nangarhar University. All published medical & non-medical textbooks can be downloaded from www.ecampus-afghanistan.org

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-1014) states:

"Funds will be made available to encourage the writing and publication of textbooks in Dari and Pashtu. Especially in priority areas, to improve the quality of teaching and learning and give students access to state – of – the – art information. In the meantime, translation of English language textbooks and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum reform. Without this facility it would not be possible for university students and faculty to access modern developments as knowledge in all disciplines accumulates at a rapid and exponential pace, in particular this is a huge obstacle for establishing a research culture. The Ministry of Higher Education together with the universities will examine strategies to overcome this deficit."

The book you are holding in your hands is a sample of a printed textbook. We would like to continue this project and to end the method of manual notes and papers. Based on the request of Higher Education Institutions, there is the need to publish about 100 different textbooks each year.

As requested by the Ministry of Higher Education, the Afghan universities, lecturers and students, we extended this project to the non-medical subjects e.g. Science, Engineering, Agriculture and Economics.

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate or revise their lecture notes or written books and share them with us to be published. We will ensure quality composition, printing and distribution to the Afghan Universities free of charge. I would like the students to

encourage and assist their lecturers in this regard. We welcome any recommendations and suggestions for improvement.

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the books according to the international standards but if there is any problem in the book, we kindly request the readers to send their comments to us or the authors in order to be corrected for future revised editions.

We are very thankful to **Kinderhilfe-Afghanistan** (German Aid for Afghan Children) and its director Dr Eroes, who has provided fund for this book. We would also like to mention that he has provided funds for 80 other medical textbooks in the past three years which are being used by the students of Nangarhar and other medical colleges of the country. Dr Eroes has made funds available for 20 additional books which are being printed now.

I am especially grateful to **GIZ** (German Society for International Cooperation) and **CIM** (Centre for International Migration & Development) for providing working opportunities for me during the past five years in Afghanistan.

In our ministry, I would like to cordially thank Minister of Higher Education Prof Dr Farida Momand, Academic Deputy Minister, Prof M Osman Babury and Deputy Minister for Administrative & Financial Affairs Prof Dr Gul Hassan Walizai, Acting Chancellor of Nangarhar University Prof Dr M Taher Enayat and lecturers for their continuous cooperation and support for this project.

I am also thankful to all those lecturers that encouraged us and gave us all these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues Hekmatullah Aziz, Ahmad Fahim Habibi and Fazal Rahim in the office for publishing books.

Dr Yahya Wardak
CIM-Expert & Advisor at the Ministry of Higher Education
Kabul/Afghanistan, June, 2015
Office: 0756014640
Email: textbooks@afghanic.org

Message from the Ministry of Higher Education



In history, books have played a very important role in gaining, keeping and spreading knowledge and science; and they are the fundamental units of educational curriculum which can also play an effective role in improving the quality of Higher Education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and today's requirements and based on educational standards, new learning materials and textbooks should be provided and published for the students.

I appreciate the efforts of the lecturers and authors and I am very thankful to those who have worked for many years and have written or translated textbooks in their fields. They have offered their national duty and they have motivated the motor of improvement.

I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish textbooks in their respective fields so that, after publication, they should be distributed among the students to take full advantage of them. This will be a good step in the improvement of the quality of higher education and educational process.

The Ministry of Higher Education has the responsibility to make available new and standard learning materials in different fields in order to better educate our students.

Finally I am very grateful to the chief of German Committee for Afghan Children, Dr. Eroes, and our colleague Dr. Yahya Wardak who have provided opportunities for publishing textbooks of our lecturers and authors.

I am hopeful that this project should be continued and increased in order to have at least one standard textbook for each subject, in the near future.

Sincerely,

Prof. Dr. Farida Momand

Minister of Higher Education

Kabul, 2015

Book Name Organic Chemistry
 Cyclic Compounds
Author Prof Dr M Ghaus Hakimi
Publisher Nangarhar Science Faculty
Website www.nu.edu.af
No of Copies 1000
Published 2015, First Edition
Download www.ecampus-afghanistan.org
Printed at Afghanistan Times Printing Press



This Publication was financed by German Aid for Afghan Children, a private initiative of the Eroes family in Germany.

Administrative and Technical support by Afghanic.

The contents and textual structure of this book have been developed by concerning author and relevant faculty and being responsible for it. Funding and supporting agencies are not holding any responsibilities.

If you want to publish your textbooks please contact us:
Dr. Yahya Wardak, Ministry of Higher Education, Kabul
Office 0756014640
Email textbooks@afghanic.org

All rights reserved with the author.

Printed in Afghanistan 2015

ISBN 817525766 – 0